

Oppgavesett dag 1

Avansert kurs ved Folkeuniversitetet

I denne seksjonen finner du oppgaver som hører til dag 1 av Folkeuniversitetet og Simula Learnings kurs Programmering i Python - Avansert. Tema for første dag er funksjoner, arrays og plotting. Dersom du står fast er det bare å spørre. God koding!

Funksjoner

Oppgave 1 *Absoluttverdifunksjon*

Absoluttverdien til et tall, a , er gitt ved:

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{hvis } a \geq 0 \\ -a, & \text{hvis } a < 0 \end{cases}$$

Lag en funksjon som tar inn ett tall, a og returnerer absoluttverdien til tallet.

Oppgave 2 *Midtpunktfunksjon*

Midtpunktet mellom to tall, a og b er gitt ved:

$$\frac{a + b}{2}$$

- a) Lag en funksjon som tar inn to tall, a og b og returnerer midtpunktet mellom dem
- b) Bruk funksjonen til å finne midtpunktet mellom 0 og 2
- c) Bruk funksjonen til å finne midtpunktet mellom 34 og 86

Oppgave 3 *Kanonkule*

Året er 1384 i en fiktiv borg i Sør-England. Franskmennene har omringet borgen og kanonene er rullet frem. Dette har åpenbart gjort Lorden som eier borgen nervøs, og han spør deg, hans fremste lærdmann om kanonkulene vil nå borgen med den avstanden de har.

Heldigvis har spionene til kongen klart å stjele en av kanonene, og etter mye om og men, har du funnet ut at kulene forlater kanonen med en fart på ca 50 meter i sekundet. Kanonene er låst i en 30 graders vinkel, så posisjonen til en kanonkule kan beskrives med disse funksjonene

$$\begin{aligned}x(t) &= 25\frac{m}{s}t \\ y(t) &= 45\frac{m}{s}t - 5\frac{m}{s^2}t^2,\end{aligned}$$

hvor $x(t)$ er hvor langt kanonkula har bevegde seg bortover (i meter) t sekund etter at den ble skutt og $y(t)$ er høyden til kanonkula (i meter) t sekund etter at den ble skutt.


- a) Definer en funksjon `kanonkule_x(t)` som returnerer hvor langt kanonkula har bevegde seg bortover etter t sekund.
- b) Definer en funksjon `kanonkule_y(t)` som returnerer høyden til kanonkula etter t sekund.
- c) Definer en funksjon `kanonkule_posisjon(t)` som returnerer både hvor langt kula har bevegde seg bortover og høyden til den etter t sekund.
- d) Kanonene er plassert 200 meter unna borgen (i x retning), og er i samme høyde som borgen. Bruk funksjonen vi akkurat lagde og prøv ut forskjellige verdier for t . Treffer kanonkula borgen?

- e) (Bonusoppgave) Lag et program som bruker `input` funksjonen til å be om et antall sekunder og printer ut posisjonen til kanonkula så lang tid etter at den ble skutt.
- f) (Bonusoppgave) Bruk en løkke til å printe ut posisjonen til kanonkula de ti første sekundene kanonkula er i lufta.

Array og plotting

Oppgave 4 *Plotting*

I denne oppgaven skal vi ende opp med et plot som ser slik ut:



- a) Opprett en array med tallrekken som starter på 0 og slutter på 1. Lagre den arrayen i en variabel du kaller `x`.
- b) Opprett en array som inneholder e^x for alle verdier i `x` variabelen din (hint: husk `exp`-funksjonen i `pylab`) og lagre dette arrayet i en array med navnet `y1`.
- c) Lag et plot som viser `x` på førsteaksen og e^x på andreaksen for `x`-verdier mellom 0 og 1.

- d) Pynt på plottet ved å sette grenser for x -aksen og y -aksen med `xlim`- og `ylim`-funksjonene. Sjekk at aksene dine har endret seg siden oppgave b).
- e) Gi aksene dine merkelapper (f.eks x og y) med `xlabel`- og `ylabel`-funksjonene.
- f) Gi plottet ditt en tittel (f.eks $y = \exp(x)$) med `title`-funksjonen.
- g) Opprett en ny variabel, `y2` og som inneholder e^{-x} for alle verdier i `x`-arrayet ditt.
- h) Plot $y1$ og $y2$ i samme plot.
- i) (Bonusoppgave) Gi kurvene dine merkelapper som forteller hva de representerer og vis frem disse merkelappene med `legend`-funksjonen.

Oppgave 5 Grafisk løsning av likning

I denne oppgaven skal vi løse en likning *grafisk*, dvs. ved å lage og lese av en graf.

- a) Definer en funksjon som returnerer $f(x) = \sin(x^2)$.
- b) Definer en funksjon som returnerer $g(x) = x^2 + x/5 - \exp(-x)$.
- c) Opprett arrays for å lagre x -verdier mellom 0 og 1.7, samt verdier man får ved å kalle på f og g med disse x -verdiene.
- d) Tegn grafen til $f(x)$ for x -verdier mellom 0 og 1.7.
- e) Tegn grafen til $g(x)$ for x -verdier mellom 0 og 1.7 i samme plot som $f(x)$.
- f) For hvilken x er $f(x)$ og $g(x)$ like (ca)?
- g) (Bonusoppgave) Marker punktet hvor $f(x)$ og $g(x)$ er like med en rød sirkel.

Oppgave 6 *Fortsettelse kanonkule*

Fortsettelse fra kanonkuleoppgaven. Vi har akkurat fortalt lorden i borgen vår at kanonene kan treffe og han tror ikke på oss. Derfor bestemmer vi oss for å lage en tegning hvor vi viser kulas bane. Om du ikke fikk til forrige kanonkuleoppgave kan du bruke denne funksjonen:

```
1 def kanonkule_posisjon(t):
2     x = 25*t                # kanonkule_x(t)
3     y = 45*t - 5*t**2      # kanonkule_y(t)
4
5     return x, y
```

- a) Lag en array, t som inneholder en tallrekke som starter på 0, slutter på 9 og har en steglengde på 0.1 (Tips: hvis du vil at tallrekka skal slutte på 9 er det lurt å sette sluttposisjonen til $\text{slutt} + \text{steglengde}$, som i dette tilfellet er 9.1).
- b) Bruk `kanonkule_posisjon(t)` til å regne ut kanonkulas x -koordinater og y -koordinater for hvert tidspunkt i t array-et vårt.
- c) Lag et plot som viser x -posisjon på førsteaksen og y -posisjon på andreaksen.
- d) (Bonsuoppgave) Ved å løse likningen $x(t) = 200$ ser vi at kanonkula treffer borgen etter åtte sekund. Marker punktet $(x(8), y(8))$ med et rødt punkt.