



مستشفى رويال حياة
ROYALE HAYAT HOSPITAL

The Power of Pink

LOVE,
HOPE,
FAITH

كتيب حملة التوعية بسرطان الثدي



محتوى الكتيب

كتيب حملة التوعية بسرطان الثدي – “The Power of Pink Journey”

1. طب العائلة
2. فحوصات سرطان الثدي المخبرية
3. قسم جراحة الأورام
 - أ. دليل المريض لسرطان الثدي
 - ب. الفحص الذاتي للثدي
 - ت. الكشف المبكر عن سرطان الثدي
 - ث. طرق العلاجات الجراحية في سرطان الثدي
 - ج. تمارين ما بعد جراحات الثدي والإبطيين
 - ح. خزعات الثدي
 - خ. العلاج الكيميائي
 - د. العلاج الإشعاعي
 - ذ. العلاج الهرموني
4. مركز الأشعة والتصوير
5. قسم التغذية
6. رويال حياة دنتل
7. قسم التجميل
8. برنامج رويال هوم هيلث للرعاية المنزلية بسرطان الثدي





طب العائلة

1



عيادة طب العائلة

لدى الوصول إلى عيادة العائلة، يتم بداية الترحيب بالمريض من قبل موظفي الاستقبال لدينا، الذين يتواصلون مع ممرضة العيادة لإبلاغهم بوصول المريض. تدعو ممرضة العيادة المريض لإجراء فحص الأساسيات الحيوية. وهذا يشمل ضغط الدم والنبض ودرجة الحرارة وتشبع الأكسجين والوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم. وهكذا يصبح المرضى جاهزون الآن لكي يقوم الطبيب بفحصهم.

تتضمن الاستشارة الأولية مع طبيب العائلة تقييماً تفصيلياً لخلفية المريض وتاريخه الطبي السابق، بالإضافة إلى شكواه الحالية وتاريخه العائلي والأدوية التي تناولها وأمراض الحساسية والتاريخ الاجتماعي.

بعد التاريخ والتقييم، سيشرح الطبيب في إجراء فحص عام كامل يشمل القلب والرئتين والبطن / الحوض والثدي والتركيز على مناطق شكاوى المريض.

يركز أطباء العائلة على المريض ككل ويكونون قادرين على تقييم العديد من الأمراض المصاحبة، ويعتبر تثقيف المريض وفحصه أمراً بالغ الأهمية في طب العائلة، ونحن نشجع ونعلم مرضانا كيفية إجراء الفحوصات الذاتية بما في ذلك فحوصات الثدي الذاتية. ثم تتوج الاستشارة الطبية بخطة إدارة للوضع وترتيبات متابعة متفق عليها بشكل متبادل.





فحوصات سرطان
الثدي المخبرية

2

فحوصات سرطان الثدي المخبرية

يمكن إجراء اختبارات سرطان الثدي بدءاً من الاختبارات البسيطة إلى اختبار علامات الورم البيوكيميائية، ويمكن إجراء الكشف على المرضى المعرضين أكثر لخطر الإصابة بسرطان الثدي عن طريق الاختبارات الجينية لأولئك الذين لديهم تاريخ عائلي واسع الانتشار من الإصابة بسرطان الثدي. يتم الفحص باستخدام التصوير الشعاعي للثدي واختبار التشريح النسجي المرضي في حالة وجود الورم. وللسوء الحظ، لا يمكن الاعتماد على علامات الورم في تشخيص سرطان الثدي. غير أنه يمكن إجراء الاختبارات التالية لسرطان الثدي:

- فحص تعداد كامل عناصر الدم CBC
- فحص مستضد السرطان CA 15.3
- اختبار قياس نسبة بروتين المستضد السرطاني في الدم CEA
- اختبار جين سرطان الثدي BRCA 1 و BRCA 2
- تحليل الرشف بالإبر لتحديد نوع الأورام FNAC
- اختبار التشريح النسجي المرضي

فحص تعداد كامل عناصر الدم CBC: يمكن أن يكشف تعداد الدم الكامل CBC عن فقر الدم الذي يمكن رؤيته في الورم الخبيث.

اختبار قياس نسبة بروتين المستضد السرطاني في الدم CEA وفحص مستضد السرطان CA 15.3: هي علامات الورم التي يمكن أن ترتفع في سرطان الثدي.

الفحص الجيني: هو الأكثر فائدة في السرطانات العائلية يتم إجراء تسلسل الجينين **BRCA 1** و **BRCA 2** لتحديد خطر الإصابة بسرطان الثدي. تشير الطفرات في هذين الجينين إلى ارتفاع خطر الإصابة بالأورام الخبيثة لدى الفرد. كما يستلزم ذلك فحص جميع أفراد الأسرة.

تحليل الرشف بالإبر لتحديد نوع الأورام FNAC: للمساعدة في التشخيص التفريقي. أثناء الشفط بإبرة دقيقة (**FNA**)، تزال كمية صغيرة من أنسجة أو سوائل الثدي من المنطقة المشتبه بها بإبرة رفيعة مجوفة للتحقق من وجود خلايا سرطانية. يكون هذا النوع من الخزعة في بعض الأحيان خياراً لا بد منه إذا كانت الاختبارات الأخرى تثير الاشتباه في الإصابة بسرطان الثدي (على الرغم أنه من الأفضل غالباً الخزعة الأساسية بالإبرة)

- **اختبار علم الأمراض:** نحن نستخدم أحدث التقنيات تطوراً على النحو الموصى به من قبل كلية علماء الأمراض الأمريكية، CAP - College of American Pathologists للمساعدة في تشخيص وتحليل مستقبلات سرطان الثدي الإيجابي والسلبي (ER و PR و HER-2)

الأساليب المذكورة سابقاً متوفرة في مختبرنا لتشخيص سرطان الثدي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر اختبارنا معلومات قيمة للتنبؤ وتصنيف المراحل ويساعد الفريق الطبي في العلاج. الفريق المشارك في تشخيص فحوصات الدم وخزعات الأنسجة هم استشاريون مخبريون معتمدون يتمتعون بخبرة واسعة في هذا المجال.





قسم جراحة الأورام

3



أ. دليل المريض لسرطان الثدي

الأغلبية العظمى لكتل الثدي ليست سرطان

إحصائيات:

- ١ من كل ٨ نساء تصاب بسرطان الثدي.
- ٢٣% من نساء الكويت مصابات بسرطان الثدي.
- ١٠% هي نسبة خطورة إصابة الرجال بسرطان الثدي.
- سرطان الثدي هو رقم ١ من بين جميع أنواع السرطانات التي تصيب النساء.
- الكشف المبكر لسرطان الثدي يحد/يقلل من عدد الوفيات.
- معدل الشفاء من سرطان الثدي مرحلته الأولى تتعدى ال ٩٥%
- مستشفى رويال حياة هي أول مستشفى خاص توفر عيادة للثدي بجميع مرافقها.
- ٩٥% من حالات الإصابة بسرطان الثدي سببها غير معروف، و ٥% من الحالات يعود سببها إلى طفرة جينية (BRCA 1 or BRCA 2).
- سرطان الثدي هو ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعاً لدى النساء.

عيادة أمراض الثدي في مستشفى رويال حياة

الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يزورون عيادة أمراض الثدي غير مصابين بسرطان الثدي. مع ذلك، لا يزال من الضروري عليك زيارة عيادة أمراض الثدي ليتم فحصك بشكل كامل.

ماذا سيحدث في عيادة أمراض الثدي؟

تحويلك إلى عيادة أمراض الثدي قد يشعرك بالقلق، لذلك قد ترغب في اصطحاب شريك، صديق أو قريب لك لدعمك.

قد يستغرق موعدك في عيادة أمراض الثدي بضع ساعات حتى يتسنى لك إجراء جميع الفحوصات اللازمة. تتوفر جميع الاختبارات اللازمة في مستشفى رويال حياة. يتم فحصك من قبل طبيب مختص في عيادة أمراض الثدي، ثم يلي الفحص، واحد أو أكثر من الاختبارات التالية:

- الأشعة السينية (أشعة الماموجرام)
- أشعة الموجات فوق الصوتية
- الخزعات النسيجية أو الخلوية
- الرنين المغناطيسي للثدي

عند زيارة عيادة إستشاري جراحة الأورام:

يتم أخذ تاريخ المريض: يشمل هذا سؤال حول التاريخ العائلي لأمراض وأورام الثدي، أي أدوية علاجية يأخذها المريض (يتضمن ذلك العلاج بالهرمونات البديلة (HRT) أو حبوب منع الحمل (OCP) أو أي جراحة سابقة للثدي (يتضمن ذلك تكبير الصدر أو تصغير الثدي).

يتبعه فحص الثدي: حيث يتم فحص الثديين من قبل جراح أورام الثدي وذلك أثناء جلوسك وأثناء استلقائك. كجزء من الفحص، يتم فحص الغدد الليمفاوية أسفل الذراعين و حول الرقبة.

قد يتم الكشف والفحص في عيادة واحدة. وهي العيادة التي يتم فيها الفحص والكشف الثلاثي (فحص الثدي، تصوير الثدي، وخزعة الأنسجة) أثناء زيارتك، مع إمكانية الحصول على النتائج في وقت لاحق من نفس اليوم أو في اليوم التالي.

الرنين المغناطيسي للثدي متاح أيضاً في مستشفى رويال حياة ويقرر الطبيب المعالج على أدائه عند الحاجة.

ب. الفحص الذاتي للثدي

الفحص الذاتي للثدي

كثير من النساء يجدن سرطان الثدي بأنفسهن و على الرغم من أن الفحص الذاتي للثدي لم يغير من معدل انخفاض الوفيات، النساء اللاتي يخترن القيام بذلك ينبغي أن يعلمن كيف يفعلن ذلك على نحو فعال. خمس خطوات بسيطة لتعلم كيفية القيام بذلك:

الخطوة (١):

ابدئي بالنظر إلى ثدييك في المرأة مع استقامة كتفيك و ذراعيك على الوركين.

هنا ما يجب أن تبحثي عنه:

- الثديين و حجمهما المعتاد، و الشكل، و اللون.
- تساوي الثديين بالحجم بدون تشوه مرئي أو انتفاخ.
- إذا كنتي ترين أي من التغيرات التالية، أخبريهم للطبيب الخاص بك:
- تجوف، تجعد أو انتفاخ في الجلد
- تغير وضع الحلمة أو انقلاب الحلمة (دفعت إلى الداخل بدلا من أن تخرج).
- إمرار، ألم أو طفح جلدي، الاحساس بورم في الثدي.

الخطوة (٢):

الآن، ارفعي ذراعيك و انظري إلى نفس التغيرات المذكورة سابقا.



ت. الكشف المبكر عن سرطان الثدي

يركز هذا الكتيب على توفير كل المعلومات اللازمة فيما يتعلق بالكشف المبكر لسرطان الثدي. تعتبر معدلات الوفاة من سرطان الثدي في الكويت من بين أعلى المعدلات في العالم ويرجع ذلك جزئياً إلى التأخر في الكشف عن المرض ونقص الوعي.

مستشفى رويال حياة يعمل على توفير التقييم السريع والتشخيص الدقيق للمرضى الذين يعانون من تغيرات غير طبيعية على الماموجرام (الأشعة السينية) والموجات فوق صوتية (السونار) أو الفحص الإكلينيكي الذي هو مشتبه للغاية بسرطان الثدي.

الأعراض التي يجب أخذ الحذر منها ومراجعة الطبيب المختص لتقييمها بصورة جيدة:

- ورم بالثدي.
- الإفرازات من الحلمة (دموية وغير دموية)
- تغيرات في شكل الثدي مثل الإنطعاج لجلد الثدي أو ارتداد الحلمة للداخل.
- تغيرات الثدي من (احمرار - تورم - زيادة الدفء في الثدي).
- تقرحات الحلمة وتقشرها.

ما هي الخطوات المتبعة للكشف المبكر عن أورام الثدي؟

١. الفحص الإكلينيكي عن طريق الطبيب المختص.
٢. عمل فحص أشعة الماموجرام من عمر ٤٠ كل ١-٢ سنة دورياً وذلك بهدف إكتشاف الورم في وقت مبكر حيث انه من الممكن الحصول على شفاء للمرضى بنسبة كبيرة تصل ٩٥% لو تم اكتشافه مبكراً وعلاجه، والفحص سنوياً لعمر ما فوق ال ٥٠ سنة.
٣. عمل سونار لكشف الأورام الحميدة للمرضى أقل من ٤٠ من العمر.
٤. فحص الرنين المغناطيسي غالباً يستخدم لبعض حالات المشكوك فيها أو المرضى الذين لهم تاريخ عائلي بسرطان الثدي وهم أقل من ٤٠ وعادة يقرر الطبيب المعالج فحص الرنين المغناطيسي ولا يستخدم دورياً في الكشف عن أورام الثدي.

كيفية تشخيص سرطان الثدي؟

يتم تشخيص أورام الثدي عن طريق أخذ أنسجة من الورم بواسطة جهاز الخزعة ويتم وضع مخدر موضعي في مكان الورم مع استخدام السونار. ويتم أخذ الخزعة وإرسال العينة إلى مختبر الأنسجة ويتم فحصها وبالتالي تشخيص الورم.

الخزعات أساسية لأنها تساعد الطبيب المعالج لعمل خطة علاجية متكاملة ونهائية لحالة المريض.

الخطوة (٣):

أثناء وجودك أمام المرأة، ابحثي عن أي علامات لسوائل تخرج من حلمة واحدة أو كليهما (وهذا يمكن أن يكون سائل أصفر مائي أو حليبي أو دم) بدون الضغط الشديد على الحلمة.

الخطوة (٤):

ثم إمسي الثدي أثناء الاستلقاء، استخدمي يدك اليمنى للمس الثدي الأيسر ومن ثم يدك اليسرى للمس الثدي الأيمن. استخدمي لمسة ثابتة ناعمة براحة اصبع يدك، مع مراعاة الأصابع مسطحة و معاً. استخدمي حركة دائرية.

غطي كامل الثدي من الأعلى إلى الأسفل، جنباً إلى جنب - من الترقوة إلى الجزء العلوي من البطن، ومن إبطك إلى الثدي.

تتبعي نمطاً للتأكد من أنك تغطي الثدي كله. يمكنك البدء في الحلمة، تحركي في دوائر أكبر و أكبر حتى تصلي إلى الحافة الخارجية للثدي.

يمكنك أيضاً تحريك أصابعك للأعلى والأسفل عمودياً كما هو موضح بالصورة.

يبدو منهم الصعود و النزول يعمل بشكل أفضل لمعظم النساء. وتأكدي بأنك تشعري بجميع الأنسجة من الأمام إلى الخلف للجلد و الأنسجة السطحية استخدمي الضغط الخفيف. استخدمي الضغط المتوسط للأنسجة في وسط الثدي. استخدمي الضغط الثابت للأنسجة العميقة في الخلف. عند الوصول للأنسجة العميقة عليكي أن تكوني قادرة على الشعور وصولاً إلى القفص الصدري.

الخطوة (٥):

وأخيراً، قومي بالاحساس بثدييك عند وقوفك أو جلوسك. تجد العديد من النساء أن أسهل طريقة للاحساس بصدورهن هي عندما يكون الجلد رطب، فترغب بأن تفعل هذه الخطوة في الحمام أثناء السباحة. افحصي الثدي بأكمله وذلك باستخدام حركات اليد نفسها كما موضح في الخطوة (٤).



ث. طرق العلاجات الجراحية في سرطان الثدي

طرق العلاجات الجراحية في سرطان الثدي

عمليات اليوم هي أقل إتساعاً بكثير مما كانت عليه في الماضي. عندما يتعلق الأمر لعملية جراحية، «أكثر» هو ليس بالضرورة «أفضل». علاج سرطان الثدي عادة ما يكون مزيجاً من الجراحة والإشعاع والعلاج الكيميائي والعلاج الهرموني.

لماذا الجراحة؟

قد تكون بعض النساء شفيين تماماً عن طريق الجراحة وحدها. الجراحة ممكن أن تقدم أفضل سيطرة على السرطان. وبالإضافة إلى ذلك، فحص إزالة الأنسجة أثناء الجراحة يوفر معلومات هامة حول نوع و حجم السرطان، وتتضمن ومدى الإنتشار للعقدة الليمفاوية ومستوى مستقبلات هرمون الاستروجين. تسمح هذه المعلومات لطبيب الأورام بتحديد مرحلة السرطان وتفصيل أي علاج إضافي لحالة معينة.

وبالنسبة لبعض أنواع السرطان، الجراحة ليست هي أفضل علاج. إذا الورم كبير أو لديه الغدد الليمفاوية كبيرة جداً أو هو نوع التهابات، يجب أن تعطى العلاج الكيميائي لأول مرة لتقليل حجم الورم. بعد ذلك، استئصال الثدي قد يكون الموصى به لزيادة خفض خطر تكرار السرطان في الثدي. في حالات سرطان الثدي المنتشر يمكن أن يشمل العلاج الأولي الهرمونات والعلاج الكيميائي، أو العلاج الإشعاعي بدلاً من الجراحة.

أنواع جراحة الثدي

إستئصال الثدي الجزئي: إزالة الورم السرطاني مع إزالة بعض أنسجة الثدي الطبيعية المحيطة بالسرطان. وقد وجدت الدراسات أن استئصال الثدي الجزئي يليها العلاج الإشعاعي يعطي المرأة نفس الفرصة للبقاء على قيد الحياة والسيطرة على السرطان وكذلك عملية استئصال الثدي بالكامل.

إستئصال الثدي (البسيط) بالكامل: إزالة الثدي بأكمله والحلمة دون إزالة أي عضلات جدار الصدر.

إستئصال الثدي الجذري المعدل: إستئصال كامل للثدي مع الغدد الليمفاوية الإبطية. ما يسمى «المعدل» لأنه لا يزال عضلات جدار الصدر.

إستئصال الثدي الجذري: إزالة الثدي، وعضلات جدار الصدر الرئيسية والثانوية وجميع الغدد الليمفاوية من تحت الإبط وصولاً إلى الترقوة.

تفريغ الثدي بالمحافظة على الجلد: إستئصال نسيج الثدي وهو «إخراج» من خلال شق صغير مع إزالة الحلمة - الهالة في حين الحفاظ على الجلد.

مراحل الإبطين في جراحة سرطان الثدي

إذا اثبتت العقدة الليمفاوية الإبطية انها إيجابية بخلايا سرطانية من قبل العينة بالسحب بالإبرة الرفيعة في مختبر الخلايا، فإن المريضة تحتاج إلى إزالة الغدد الليمفاوية تحت لإبط من خلال شق منفصل في استئصال الثدي الجزئي أو نفس الشق في حالة استئصال الثدي الكامل.

فحص الغدة الليمفاوية جراحياً

تقنية جديدة وضعت للقضاء على الحاجة لإزالة الغدد الليمفاوية التي لا تحتوي على السرطان. يتم حقن مادة مشعة في قسم الطب النووي حول الهالة (حول الحلمة) و/أو صبغة زرقاء أثناء الجراحة.

يتم امتصاص الصبغة ودخولها إلى القنوات الليمفاوية وترحل إلى أول غدة لمفاوية متأثرة بالخلايا السرطانية من الورم في الثدي. واحدة أو اثنين من الغدد يتم إزالتها وفحصها بداخل العمليات حيث ترسل إلى المختبر لإجراء الفحص النسيجي السريع عن طريق طبيب الأنسجة باستخدام تقنية «القسم المجمدة». وينبغي أن يكون المعدل السلبي أقل من ١٠٪.

ج. تمارين ما بعد جراحات الثدي والإبطين

١. تمرين تمشيط الشعر

ضعي كوعك على الطاولة وابدئي بتمشيط جهة واحدة من الشعر ثم الشعر كله. حاولي بالاستمرار.

٢. تمرين فتح وإغلاق كف اليد

يتم ذلك باستخدام كرة لينة إسفنجية.

٣. تمرين تأرجع الذراع

ضعي يدك السليمة على خلفية مقعد وضعي جبهتك عليها. حركي يدك الأخرى حركة دائرية مع تحريك مفصل الكتف معه ومن ثم إلى الأمام والخلف وإلى اليمين واليسار، وقومي بتكبير الحركات تدريجياً.

٤. تمرين إغلاق حمالة الثدي

مدي ذراعيك ثم اثنيهما من مفصل الكوع ومن ثم أدبريهما لخلف الظهر كحركة إغلاق حمالة الثدي.

٥. تمرين الوصول إلى الحائط

إفتحي قدميك للتوازن. قفي أمام الحائط. ابدئي التمرين وذراعك على مستوى الكتف وتدرجياً قومي برفع اليدين عالياً على الحائط. وكرري التمرين عدة مرات باليوم. حددي موقع رفعك لليد وقومي برفعها أكثر وأكثر كل يوم.



٦. تمرين حذف المجسم

إستخدومي مجسم صغير أو حقيبة صغيرة لهذا التمرين، بحيث تقومي بحذف المجسم من خلف الكتف بيدك اليمنى وتلقينه من خلف الظهر باليد اليسرى ومن ثم اعيدي التمرين بتغيير اليد اليمنى إلى اليسرى.

٧. تمرين الحبل (١)

ضعي حبل أو حزام الملايس فوق الباب وامسكي طرفه باليد الضعيفة واجعلي الطرف الآخر باليد الأخرى تسحبه وبذلك ترفع اليد المصابة تدريجياً إلى الأعلى.

٨. تمرين الحبل (٢)

علقي الحبل بمقبض الباب وقومي بعمل حركات دائرية صغيرة مع الحبل المعلق مع تحريك الذراع جهة الكتف. اعلمي الحركة مرات عديدة من جهة واحدة ثم غيري إلى الجهة المعاكسة واعلمي بجهد على تكبير الدائرة تدريجياً.

٩. تمرين المنشفة

باستخدام منشفة، امسكي طرفيها من خلف الظهر وقومي بحركة تنشيف الظهر بالمنشفة.

م. خزعات الثدي

ما هي الخزعة ومتى تطلب؟

إذا كان التشخيص غير مؤكد بعد إجراء تصوير الثدي بالموجات فوق صوتية (السونار) وأشعة الثدي، الخطوة التالية هي إزالة جزء من أنسجة الثدي من المنطقة والنظر إليها تحت المجهر. وتسمى عملية إزالة الأنسجة «أخذ خزعة».

السحب بإبرة رفيعة :

وهي عبارة عن استخدام إبرة رفيعة لسحب بعض (الخلايا) من الكتلة، ويمكن أن يتم ذلك بدقة تحت جهاز الموجات فوق صوتية (السونار) وعادة تستخدم للكشف عن الغدد اللمفاوية.

الخزعة:

يتم استخدام إبرة صغيرة للحصول على نوى متعددة من الأنسجة قطرها تقريبا 2mm وطولها 1-3cm الإبرة تكون أوسع قليلا من الإبرة الرفيعة.

تعمل باستخدام جهاز يدفع الإبرة إلى المنطقة الغير طبيعية لقطع شظايا صغيرة من الأنسجة. بعد حقن المخدر الموضعي، يتم إجراء «فتحة» صغيرة في الجلد وإدخال الإبرة في الثدي. عند الحصول على العينة، يعمل الجهاز على إصدار صوت عالي. وبعد الإنتهاء من أخذ العينة يقوم طبيب الأشعة بإدخال علامة صغيرة جداً لتسهيل على طبيب الجراحة معرفة مكان الورم. وتجرى عادة الخزعات الأساسية باستخدام الموجات فوق صوتية (السونار) أو الماموجرام.

خ. العلاج الكيميائي

أدوية لعلاج مرض السرطان. على سبيل المثال المضادات الحيوية هي نوع من العلاج الكيميائي. الأدوية تنتقل من خلال مجرى الدم لتصل إلى الخلايا السرطانية التي قد تكون في أعضاء بعيدة. ما يطلق عليها العلاج الجهازى لأنه يهاجم السرطان من خلال جهاز الدم. في المقابل، الجراحة والإشعاع هي علاجات محلية وإقليمية لأن الهدف هو جزء واحد من الجسم.

يستخدم العلاج الكيميائي في ثلاث طرق لعلاج سرطان الثدي:


1. علاج مساعد في وقت مبكر من السرطان لمنع تكرار المرض (بعد الجراحة).
2. علاج رئيسي للحالات المتقدمة ولتصغير الورم من الثدي وإحاطته بالثدي (سرطان الثدي عالي الخطورة).
3. لتخفيف الأعراض، وربما تحسين البقاء على قيد الحياة من السرطان الذي انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

وكم يستغرق العلاج الكيميائي؟

عادة يوصف لفترة ٦ أشهر يتم إعطاء الأدوية عن طريق الوريد في يوم واحد تليها ٢١ يوما خالية من العلاج «فترة راحة» ثم يكرر كل ٣ أسابيع جرعة.

«لكنني سمعت «قصص الرعب» عن العلاج الكيميائي»

العلاج الكيميائي لديه سمعة سيئة ويرجع ذلك إلى الآثار الجانبية الشديدة التي صاحبت هذه الأدوية عند استخدامها لأول مرة لكن مع استخدام عدد من الأدوية الجديدة الآن تم القضاء على كثير من هذه الآثار الجانبية. بمجرد فهم السبب وراء إختيار أطباء الأورام العلاج الكيميائي، ومعرفة ما يمكن توقعه، فمن الأسهل قبول بعض الآثار الجانبية مع العلم أن العلاج هو أفضل خيار ممكن لموقفك.



الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي

جميع الأدوية لها آثار جانبية محتملة. ما يهم هو أن الآثار المفيدة للدواء تفوق المشاكل أو الانزعاج من الآثار الجانبية. من المهم أن تكون على وعي بالآثار الجانبية المحتملة قبل البدء في العلاج ومناقشتها مع طبيبك. وهذا سيجعل عملية العلاج الكيميائي أقل غموض وخوف.

تعمل أدوية العلاج الكيميائي بطرق مختلفة. للاستفادة القصوى من هذه، غالبا ما تعطى هذه الأدوية في تركيبة مزوجة للهجوم على كل الجبهات.

تساقط الشعر

فقدان شعرك غالبا ما يكون أصعب جزء من العلاج الكيميائي. يحدث فقدان الشعر بسبب العلاج الكيميائي حيث أن العلاج يبطئ سرعة إنقسام الخلايا من جذور الشعر. الترقق يبدأ عادة بعد حوالي أسبوعين من الجرعة الأولى للعلاج الكيميائي. ستلاحظ أنه يذرف في الحمام، على الفرشاة وعلى وسادتك. ينمو الشعر مرة أخرى بعد الانتهاء من الأدوية بحلول الشهر الثالث.

فقدان الشعر هو الحدث الأكثر مزعج لكل من النساء والرجال كما هو الرمز العام من السرطان. في معظم الحالات لا يمكن تجنبها، ولكن لحسن الحظ أنه مؤقت. إشتري شعر مستعار قبل وقوعه إذا كان لديك شعر طويل، قومي بخلاقة الشعر تدريجيا حيث يجعل التغيير أقل مذهل لنفسك وعائلتك. القبعات والأوشحة يمكن أن تكون مفيدة جدا.

الالتهابات

خلايا الدم البيضاء في مجرى الدم تحمي الجسم من العدوى. العديد من أدوية العلاج الكيميائي تقلل من عدد خلايا الدم البيضاء. إذا انخفضت كثيرا، آليات الدفاع في الجسم تنخفض، ويزيد معدل إرتفاع الإصابة بالعدوى.

يجب أن تتبني الاحتياطات الخاصة بك:

تجنب الحشود والأمراض المعدية، وغسل اليدين بشكل متكرر، والممارسة الجيدة للعناية بالبشرة، واستخدام فرشاة أسنان ناعمة، واستخدام ماكينة حلاقة كهربائية بدلا من الحلاقة بالشفرة. إذا كان لديك حمى، تعرق، قشعريرة، سعال، وحرق البول، يجب استدعاء الطبيب فورا حتى يمكن أن توصف المضادات الحيوية. عدد الخلايا البيضاء عادة ما يسترد بعد حوالي 21 يوم من العلاج الكيميائي. وهناك هرمون يسمى «عامل تحفيز مستعمرة الكريات البيضاء» (Neupogyn, CSF-G) يمكن وصفه إذا كان لديك عدوى وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، أنها تساعد نخاع العظم على التعافي ويزيد من عدد خلايا الدم البيضاء الخاصة بك.

الأنيميا (فقر الدم)

عادة خلايا الدم الحمراء لا تنخفض كثيرا. فقر الدم قد يجعلك تشعر بالتعب والدوار وضيق في التنفس إذا كانت شديدة، فإن الطبيب يوصي بنقل الدم أو الحقن «الإريثروبويتين» (EPO، الإبوجين) الذي قد يحفز نخاع العظم لإنتاج خلايا الدم الحمراء أكثر. مكملات الحديد لا تنفع.



نزيف غير طبيعي وكدمات

الغثيان والقيء

قد يبدأ 6-8 ساعات بعد الحقن الكيماوي أو في اليوم التالي. توصف الأدوية مضاد للقيء قبل وبعد العلاج الكيماوي.

الإسهال والإمساك

شرب الكثير من السوائل الصافية. تجنب الأطعمة مثل الملفوف والفاصوليا والطعام الحار المبهز. منتجات الألبان قد تسهم في الإسهال.

التهاب الفم (التهاب الغشاء المخاطي)

يمكن أن تظهره أيام بعد العلاج. تجنب الطعام المهيج: الحمضي، الطعام الحار أو الخشن. شطف الفم مع الصودا أو الماء. إسأل طبيبك للحصول على إستشارة.

الدورة الشهرية والجنس

قد يسبب العلاج الكيماوي عدم إنتظام بالدورة الشهرية، أو توقف دائم أثناء العلاج الكيماوي ومن ثم العودة أوالتوقف الدائم.

أدوية العلاج الكيماوي عموما لا تؤثر على القدرة على ممارسة الجنس، قد تكون لاحظت بعض التغييرات:

جفاف المهبل، والإصابة بالفطريات. قد تتأثر الرغبة الجنسية الخاصة بك عن طريق القلق من المرض، والتعب، والثقة بالنفس وصورة الجسم. **ومن المهم عدم حدوث حمل أثناء العلاج الكيماوي.** قد تسبب هذه الأدوية تشوه الجنين في الأشهر الثلاثة الأولى. وعموما لا ينصح حبوب منع الحمل عن طريق الفم إذا كان لديك سرطان الثدي بسبب أن هرمون الاستروجين يحفز بعض أنواع السرطان. يمكنك المناقشة مع طبيب الأورام فيما يتعلق بأفضل وقت للحصول على الحمل بعد الانتهاء من العلاج الخاص بك. إذا كنت حامل عند تشخيصك بسرطان الثدي، ممكن أن تعطي العلاج الكيماوي في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.

الأعراض العامة

- التغيرات الجلدية مثل الجفاف، البقع والطفح الجلدي.
- جفاف العين، عيون رملية.
- شعور يشبه الانفلونزا.
- في حالة استخدام أدرياميسين (الأحمر) قد يتغير البول.
- آلام المفاصل والعضلات.
- وخز في أصابع اليدين والقدمين.
- فقدان في الذاكرة قصيرة المدى (مؤقت).
- أثناء العلاج الكيماوي، يمكنك أن تأكل ما تريد.
- أدوية العلاج الكيماوي ليست خطرا على أي شخص آخر.



د. العلاج الإشعاعي

كيف يعمل الإشعاع؟

«العلاج الإشعاعي» هو استخدام أشعة عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية. الإشعاع يعمل عن طريق إتلاف الخلايا بحيث تموت في نهاية المطاف. الإشعاع سيتلف أي نوع من الخلايا، طبيعية أو سرطانية التي تقع في مسار الإشعاع، لحسن الحظ، الخلايا الطبيعية تصلح نفسها من أضرار الإشعاع، وذلك عن طريق إعطاء الإشعاع في سلسلة من المعالجات الصغيرة، وعادة مرة واحدة يوميا لمدة شهر في حالة سرطان الثدي والخلايا الطبيعية لديها فرصة للرجوع بين العلاج بينما تموت الخلايا السرطانية.

إجراءات الحصول على العلاج الإشعاعي

- قرار العلاج – عادة يقرر في اجتماع الثدي مع إستشاريين الأورام والإشعاع.
- جلسة التخطيط – يتم فيها تخطيط المنطقة المراد علاجها مع وضع علامة عن طريق استخدام جهاز الأشعة المقطعية. ثم يتم تسجيل معلومات محددة خلال دورة التخطيط بحيث يتم وضع آلة العلاج بدقة كل يوم. ويستخدم جهاز CT scan في الوقت الحاضر. ووضع وشم على المنطقة المراد علاجها كنقاط مرجعية للعلاجات اليومية. كمية الإشعاع تدون ويعتمد عدد الزيارات اليومية على كمية الأنسجة المراد علاجها.

ما يحدث أثناء العلاج الإشعاعي؟

العلاج الإشعاعي غير مؤلم. سوف تكون في غرفة العلاج حوالي 10 دقائق. خلال جلسة العلاج الإشعاعي النموذجية يتم تشغيل الجهاز على المنطقة المعالجة 3 دقائق فقط كل يوم وتعطى يوميا لمدة شهر (باستثناء عطلة نهاية الأسبوع).

هل يمكن تكرار الإشعاع في وقت ما في المستقبل؟

لا، إذا تلقى المريض الجرعة القصوى للإشعاع بالثدي، يجب ان لا يتكرر الإشعاع.

من الذي يستفيد من العلاج الإشعاعي؟

- بعد إستئصال الثدي الجزئي.
- بعد استئصال الثدي الجذري (بالكامل) عندما يكون هناك فرصة عالية للتكرار على جدار الصدر أو في العقد الليمفاوية.
- لعلاج السرطان المتقدم موضعيا بعد الاستجابة للعلاج الكيميائي وانتهاء الجراحة.
- لتخفيف الأعراض نتيجة لتكرار السرطان على جدار الصدر أو الإنتشار لمناطق أخرى كالعظم، العقد الليمفاوية أو الدماغ.

الآثار الجانبية للعلاج الإشعاعي

العلاج الإشعاعي وعادة ما يكون غير مؤلم. لن تفقدي شعرك. أنت غير مشعة ولا يشكل تهديدا لعائلتك أو الأطفال.

الإشعاع لا يجعلك تشعرين بالدوار. يجب أن تشعرين جيدا بما فيه الكفاية لدفع نفسك ذهابا وإيابا إلى العيادة للعلاج. بعض النساء تستمر عملها بدوام كامل خلال العلاج الإشعاعي.

الآثار الجانبية تشمل:

- قد تشعرين بالتعب.
- قد تشعرين بالبكاء، والاكتئاب والغضب أو الإحباط.

علاج الآثار الجانبية في الثدي:

- يصبح الجلد تدريجيا وردي، أحمر أو يشبه حرق الشمس والقشور تظهر عليه في بعض الأحيان. هذا عادة ما يختفي ببطء. نحو نهاية الدورة، يصبح الجلد جاف. اسأل طبيبك عن الكريمات التي يمكنك وضعها على الثدي مثل كريمات الترطيب، كريم الهيدروكورتيزون أو كريم مضاد حيوي.
- ثبات الثدي: ممكن أن يسبب الإشعاع تضخم بالثدي، وثقل، وألم مع سوائل أثناء العلاج وهذه قد تستمر لمدة 6-18 شهر بعد ذلك.
- «صدمة كهربائية»، بروز الأوعية الدموية والندب. هذه ليست علامة على السرطان.

الآثار الجانبية من الأعضاء المعالجة داخل الحلقة:

- الرئة (إشعاع الالتهاب الرئوي).
- القلب (للجهة اليسار من سرطان الثدي).
- الندب تحت الذراع.
- الندب على جدار الصدر.



ذ. العلاج الهرموني

ما هي العلاقة بين الهرمونات وسرطان الثدي؟

هرمون الاستروجين يحفز ليس فقط على نمو الثديين ولكن يقوم أيضا بتشجيع نمو بعض أورام الثدي.

هل تقوم العلاجات الهرمونية للعمل على جميع سرطانات الثدي؟

العلاج الهرموني فعال فقط في الأورام التي لديها مستقبلات الهرمون.

مستقبلات هرمون الاستروجين (ER) أو مستقبلات هرمون البروجيستيرون (PR) وتوجد على ما يقرب من 75 - 70% من سرطانات الثدي. يتم قياسها على الورم من قبل أخصائي علم الأنسجة والتنبؤ إذا كان الورم سوف يستجيب للعلاج بالهرمونات. وارتفاع مستوى الاستروجين في مستقبلات الورم، تؤدي إلى استجابة الورم بشكل أكبر للعلاجات الهرمونية.

قد يكون كلا المستقبلات إيجابية (ER+/PR+)، أو سلبية (ER-/PR-) أو جزء فقط إيجابي (ER+/PR-).

ما هو العلاج الهرموني؟

العلاج الهرموني لسرطان الثدي (وتسمى أيضا «مضاد الاستروجين») يستخدم كعلاج أساسي للورم أو وقائي. وتشمل هذه استخدام العقاقير في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو بعد إنقطاع الطمث.

ويستخدم العلاج الهرموني للوقاية أو علاج مساعد للسرطان المنتشر وقد تبين أن العلاج الهرموني يقلل فرصة الإصابة بالسرطان مرة أخرى سواء في الثدي المتضررة أو في بقية الجسم، ولقد ثبت انخفاض خطر الإصابة بسرطان جديد في الثدي الآخر.

العلاج الهرموني لدى النساء قبل انقطاع الطمث:

قبل انقطاع الطمث، يتكون هرمون الاستروجين في المقام الأول من قبل المبايض. دورات الطمث العادية هي علامة على وظيفة المبايض الطبيعية. الهدف من العلاج الهرموني في سرطان الثدي هو إما وقف إنتاج هرمون الاستروجين من المبايض أو إيقاف تأثير هرمون الاستروجين في خلايا سرطان الثدي.

تاموكسيفين:

(نوفالدكس، تاموفين، إلخ) هو فعال في وقف تأثير الاستروجين على خلايا سرطان الثدي.

قمع المبايض:

علاجات مختلفة قد توضع للمرأة في سن اليأس إما بشكل دائم أو مؤقت:

١. المبيض - الإستئصال الجراحي للمبايض والذي يمكن القيام به مع الحد الأدنى من الجراحة (المنظار).
٢. الإشعاع - باستخدام الإشعاع (عادة يوميا لمدة خمسة أيام) يؤدي إلى تلف دائم للمبايض حتى تتوقف عن إنتاج هرمون الاستروجين. يستغرق عادة حوالي 3 أشهر بعد الإشعاع إلى المبايض لخفض مستويات الاستروجين إلى مستوى ما بعد انقطاع الطمث.
٣. قمع النخامية - الأدوية تسمى (LHRH agonist) كما تعطى الحقن العضلية كل شهر إلى ثلاثة أشهر لمدة 2-5 سنوات. وتشمل هذه الأدوية غوسيريلين (زولادكس) أو بوسيريلين (سوبرفاكت).

العلاج الهرموني لدى النساء بعد انقطاع الطمث:

يتم تعريف المرأة في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث عندما لا يأتي لها الطمث لمدة عام. يمكن تأكيد انقطاع الطمث من قبل فحص الدم لمستويات الهرمون. لا تزال المرأة تنتج هرمون الاستروجين بعد إنقطاع الطمث ولكن مستويات الاستروجين هي أقل مما كانت عليه قبل انقطاع الطمث بشكل ملحوظ.

في النساء بعد انقطاع الطمث، هرمون سرطان الثدي الحساس يمكن علاجه إما عن طريق منع مستقبلات هرمون الاستروجين على الخلايا (تاموكسيفين) أو عن طريق التداخل مع انزيم الاروماتاز لوقف إنتاج هرمون الاستروجين مع مجموعة من الأدوية المعروفة باسم مثبطات الهرمونات: اناستروزول (أرمدكس) ليتروزول (فمارا) واكسيمستان (أروماسين).

الآثار الجانبية للعلاج الهرموني

بعض النساء ليس لديها آثار جانبية بينما يعاني الآخرون من ذلك. هذه عادة لا يمكن التنبؤ بها.

أعراض سن اليأس:

- الهبات الساخنة - تقرير لمعظم النساء أنها تتحسن مع مرور الوقت.
- جفاف المهبل وتهيجه - يمكن أن يجعل الجماع مؤلما وصعبا. ممكن استخدام مرطبات المهبل (الجيل) للمساعدة.
- هشاشة العظام وزيادة خطر الكسور: جميع النساء قبل انقطاع الطمث يجب أن تأخذ 1000mg من الكالسيوم و 400 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميا والنساء بعد سن اليأس يأخذن 1500mg من الكالسيوم و 800 وحدة دولية من فيتامين (د) يوميا. للنساء اللواتي على مثبطات الهرمونات، يجب عمل كثافة العظام الأساسية وتكرر كل 18-24 شهر.
- زيادة الوزن.



تاموكسيفين

- مضاد الاستروجين، جرعة 20 mg يوميا لمدة خمس سنوات، وتشمل الآثار الجانبية:
- الهبات الساخنة.
 - الإفرازات المهبلية؛ واضحة أو بيضاء.
 - الإلتهاب الوريدي أو الجلطة: خطر تخثر الأوردة العميقة أو الانسداد الرئوي (خطر 1%).
 - استمرار الحيض: يجب عمل الإحتياطات لتحديد النسل لأن التاموكسيفين ممكن أن يضر بالجنين.
 - سرطان بطانة الرحم: امرأتين لكل 1000 سنويا.
 - الآثار الجانبية النادرة جدا تتضمن: الغثيان والقيء وفقدان الشهية، وآلام في المفاصل والعضلات، والطفح الجلدي، وجفاف الجلد، والصداع، والدوخة، وشعر الوجه وتغيرات الرؤية.

مثبطات الهرمونات

- فعالة فقط في النساء بعد انقطاع الطمث، مثل أريميدكس، أو فيمارا. معظم الآثار الجانبية هي تلك المصاحبة لانقطاع الطمث بما في ذلك الهبات الساخنة، جفاف المهبل وزيادة مخاطر الإصابة بهشاشة العظام.
- آلام العضلات وآلام المفاصل – الحبوب المضادة للإلتهاب مثل ايبوبروفين قد تكون مفيدة.
 - زيادة في مستويات الدهون والدهون الثلاثية.
 - فقدان الرغبة الجنسية.
 - وتشمل الآثار الجانبية الأقل شيوعا: الغثيان، والصداع، وتورم في اليدين والقدمين، والتعب، وترقق الشعر، والطفح الجلدي، والاكنتاب، وزيادة الوزن.





مركز الأشعة والتصوير

4

التصوير الإشعاعي للثدي في مستشفى رويال حياة

تصوير الثدي هو فحص الثدي لوصف أي تغييرات غير طبيعية باستخدام التصوير الإشعاعي أو/و الموجات فوق الصوتية.

التصوير الإشعاعي (الماموجرام) هو اختبار الأشعة السينية لأنسجة الثدي. يمكنها توفير معلومات عن الكتل، التكلسات وغيرها من الأوضاع / الأجسام غير الطبيعية التي قد تظهر في الثدي. كما أن هذا الفحص متوفر أيضا للنساء فوق الأربعين من العمر لتصوير الثدي (الكشف المبكر لسرطان الثدي) حتى مع عدم وجود أي مشكلة في الثدي.

التصوير الشعاعي للثدي هو إجراء آمن. من الضروري إخبار المصور إذا:

- قمت بعملية تكبير للصدر.
- إن كنتي حامل.
- إن كنتي تعتقدين أنك حامل.

يحتاج كل ثدي بأن يتم ضغطه بين جهاز الأشعة السينية (جهاز أشعة الماموجرام) و لوحة الأشعة السينية المسطحة. هذا الضغط ضروري للحصول على نتائج جيدة. إنها ليست مؤلمة ولكن قد تكون غير مريحة. يتم أخذ رؤيتين/معاينتين بزوايا مختلفة لكل ثدي.

يستغرق التصوير الإشعاعي لكل معاينة للثدي بضع ثوان فقط. سيتم تواجذك في غرفة الأشعة السينية لمدة 20 دقيقة تقريبا.

الموجات فوق الصوتية للثدي: تستخدم الموجات الصوتية – بدون إشعاع – لإظهار أنسجة الثدي. يمكنها توفير مزيد من المعلومات. يتم وضع جل (مادة هلامية) على الثدي وسيتم نقل جهاز استشعار صغير، يستخدم باليد، على الجلد لفحص/لكشف الثدي من زوايا مختلفة.

الخزعة النسيجية أو الخلوية: إذا كان لديك كتلة صلبة، سيحتاج الطبيب لأخذ خزعة نسيجية، ويتم ذلك عن طريق إبرة صغيرة يتم إدخالها في كتلة الثدي للحصول على عينة (قطعة من الأنسجة) منه. يتم وضع مخدر موضعي قبل إدخال الإبرة لتخدير المنطقة.

من الناحية الأخرى، يتم استخدام الخزعة الخلوية (FNA) عند إزالة عدد قليل من الخلايا من تكيس في الثدي أو خلايا من العقدة الليمفاوية في الإبطين عن طريق إبرة أصغر. يتم إرسال الأنسجة أو الخلايا إلى المختبر ليتم فحصها تحت المجهر. تظهر النتائج بعد يومين أو ثلاثة أيام عمل.





قسم التغذية

5



الوقاية من سرطان الثدي من خلال اتباع نظام غذائي صحي

التغذية الصحية هي جزء من طرق الوقاية من سرطان الثدي

تناول طعام متوازن

تناول الطعام الصحي المتوازن يقلل من خطورة الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 10-20%.

الحفاظ على وزن مثالي صحي

قد تؤدي زيادة الخلايا الدهنية (السمنة) إلى زيادة فرص الإصابة بسرطان الثدي عن طريق رفع مستويات هرمون الاستروجين، الإنسولين وغيرها من الهرمونات.

الرضاعة الطبيعية

تقلل من نسبة الإصابة بسرطان الثدي، وكلما زادت مدة الرضاعة قلت فرص الإصابة.

الامتناع عن التدخين

احتمالية الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء أعلى بنسبة 24% لدى المدخنين مقارنة بغير المدخنين.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

ممارسة الرياضة تساعد في المحافظة على وزن مثالي، وبالتالي تساعد في الوقاية من سرطان الثدي. ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميا، تقلل نسبة الخطورة بمعدل 18%.



ماهي نسبة الوقاية من سرطان الثدي؟

30-50% من حالات سرطان الثدي يمكن تجنبها من خلال اتباع نمط حياة صحي.

ما مدى انتشار سرطان الثدي؟

سرطان الثدي هو أكثر أنواع الأورام شيوعا بين النساء حول العالم، حيث انه يصيب 1 من كل 8 نساء.

العوامل المرتبطة بسرطان الثدي

بعض عوامل الخطورة تعمل على ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الثدي. ولكن وجود واحد أو أكثر من هذه العوامل لا تعني أنك سوف تتعرضين لسرطان الثدي. بعض الأحيان النساء يتعرضون لسرطان الثدي بدون وجود أي عامل خطورة.

العمر

يشكل أقوى عامل خطورة لسرطان الثدي، حيث أن خطر الإصابة يزيد مع تقدم العمر.

قلة النشاط البدني

الخمول وقلة الحركة يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

التاريخ العائلي

وراثة الجينات السرطانية يزيد خطر الإصابة بنسبة (5-10%).

الكحول

كثرة تناول الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.

استخدام الهرمونات البديلة

وموانع الحمل الهرمونية يزيد الإصابة بسرطان الثدي.



التغذية الصحية هي جزء من طرق الوقاية من سرطان الثدي

التقليل من تناول الملح والأطعمة المملحة

تناول الأطعمة القليلة بالصوديوم واختر المنتجات التي لا تزيد عن ١٤٠ ملغ للحصة الواحدة من خلال قراءة الملصق الغذائي.

الحد من تناول اللحوم الحمراء وتجنب اللحوم المصنعة

تناول ما لا يزيد عن ٥٠٠ جرام (وزن مطبوخ) في الأسبوع من اللحوم الحمراء مثل (لحم البقر، العجل والماعز)، وتجنب اللحوم المصنعة مثل اللحم المقدد، السلامي، الهوت دوغ والنقانق.

التقليل من تناول الأطعمة والمشروبات الدسمة والعالية بالسكر

الحد من الأطعمة العالية بالسعرات الحرارية مثل الوجبات السريعة، رقائق البطاطس والصلصات الدسمة. قلل من المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والعصائر المعلبة.

استبدال البروتينات الحيوانية بالبروتينات النباتية

أمثلة على البروتينات النباتية مثل: العدس، الفاصوليا السوداء والخضراء، الكينوا، الحمص والبازلاء الخضراء، اللوز، الخرشوف، السبانخ، البروكلي والهيلون.

الحصول على مضادات الأكسدة من مصادر طبيعية

من خلال تناول الخضار والفواكه، وتجنب الاعتماد على المكملات الغذائية كمصدر أساسي لمضادات الأكسدة.

الإكثار من تناول الألياف

زيادة تناول الألياف، يقلل الإصابة بسرطان الثدي بنسبة ٧٠٪

تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د

الحصول على فيتامين د والمحافظة على معدله الطبيعي في الدم، يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي. المصادر الغذائية الغنية بفيتامين د هي السالمون، التونا، الحليب والحبوب المدعمة.



هل تناول بذور الكتان يزيد من خطر عودة سرطان الثدي؟

- لا توجد دراسات تثبت أن بذور الكتان قد تزيد من تكرار الإصابة بسرطان الثدي.
- فهو آمن عند الاستهلاك باعتدال.
- 1-3 ملاعق طعام يوميا من الممكن أن تحمي وتقلل من الإصابة بسرطان الثدي
- يعتبر مصدر ممتاز للمغنيسيوم، المنغنيز، فيتامين الثيامين، النحاس، البروتين، الأوميغا3 والألياف.



هل تناول مأكولات الصويا يعتبر آمناً للمرضى المتعافين من سرطان الثدي؟

- تناول أطعمة الصويا باعتدال يعتبر آمناً للمرضى المتعافين من سرطان الثدي.
- الاستهلاك باعتدال يعادل 1-2 حصة باليوم من مأكولات الصويا مثل التوفو، حليب الصويا، الإدامامي، وفول الصويا).
- الحصة الواحدة من الصويا تعادل ١ كوب من حليب الصويا – 1/2 كوب من فول الصويا المطبوخة – 1/3 كوب أو 28 غرام من مكسرات الصويا.
- أطعمة الصويا من الممكن أن تقلل تكرار الإصابة بسرطان الثدي.



هل السكر يغذي الخلايا السرطانية؟

- لا توجد علاقة مباشرة بين تناول السكر والخلايا السرطانية.
- يفضل الحد من تناول الأطعمة العالية بالسكر كجزء من نظام غذائي صحي لتجنب زيادة الوزن.
- كثرة تناول السكر يساهم في زيادة الوزن والسمنة، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي.



هل تناول منتجات الألبان والأجبان يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي؟

- لا يوجد أدلة كافية تثبت ارتباط تناول منتجات الحليب والألبان بسرطان الثدي.
- تعتبر منتجات الألبان مصدراً جيداً للكالسيوم والبروتين، المهم في بناء العظام والأسنان و ترميم العضلات.
- اختيار منتجات الألبان قليلة الدسم والسكر، تساعد في الحفاظ على وزن صحي، مما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.





رويال حياة دنتل

6

هل تعلم أن هنالك علاقة وثيقة بين سرطان الثدي و صحة الفم؟

نعم أمراض اللثة و مشاكل الفم تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 14%.

كيف احمي نفسي من أمراض اللثة؟

- تفريش الأسنان مرتين باليوم بمعجون يحتوي على الفلورايد.
- استخدام الخيط الأسنان لتنظيف بين الأسنان.
- استبدال الفرشاة الأسنان كل ثلاث شهور.
- الزيارة الدورية لطبيب الأسنان كل ستة شهور.
- اذا كنت من المدخين، اوقف التدخين فوراً.

لو تم تشخيصك بسرطان الثدي أنتي قوية

اتبع التعليمات التالية لصحة الفم قبل وأثناء علاج سرطان الثدي:

تحدث إلى طبيب أسنانك حول تشخيصك في أقرب وقت ممكن. تحتاج إلى تحديد موعد لعلاج الأسنان قبل بدء العلاج سرطان الثدي، خاصة إذا لم تكن قد خضعت للفحص مؤخرًا.

قم بمعالجة أسنانك و اللثة قبل البدء بعلاج السرطان، حيث ان علاج السرطان يضعف قدرة الجهاز المناعي و الجسم على شفاء نفسه.

امنح وقتًا للشفاء بعد علاج للأسنان قبل البدء في علاج السرطان، إن أمكن.

يمكن لطبيب أسنانك أن يوصي بمدة التعافي التي تحتاجها بين إجراءات الأسنان وتلقي علاج السرطان.

علاج سرطان الثدي يمكن ان يسبب الآثار الجانبية التالية للفم:

١. جفاف الفم أو اللعاب.
٢. تغير في حاسة التذوق و طعم الأكل ممكن ان يكون طعم معدي، مالح او كرهه.
٣. تقرحات الفم وتقرحاته – التهاب الغشاء المخاطي للفم.
٤. التهاب وتقرحات اللثة واللسان.
٥. عسر البلع، أو صعوبة البلع.
٦. زيادة نسبة تسوس لأسنان.
٧. صعوبة في فتح الفم Trismus.
٨. فطريات الفم.
٩. التهاب عصب الفم الذي قد يؤدي الى أحساس مزعج و ألم غير حقيقي.
١٠. القلاع الفموي أو عدوى الخميرة – تنخر عظم الفك.

من المهم مراجعة طبيب أسنانك أثناء علاج السرطان، وتحديث حالتك المرضية، حيث يمكن الطبيب الأسنان وصف أدوية و علاجات تزيد من راحة المريضة أثناء علاج السرطان، و بالنهاية لا تنسي أنك قوية و مميزة.





قسم التجميل

7



جراحة ترميم الثدي في (مركز التجميل) La Cosmetique Royale

قد تختار النساء اللواتي خضعن للجراحة كجزء من علاج سرطان الثدي اللجوء إلى جراحة إعادة بناء الثدي لإعادة بناء شكل ومظهر الثدي. وهناك أنواع مختلفة من عمليات إعادة بناء الثدي. تعرفي على جميع الخيارات المتاحة أمامك وما يمكنك توقعه قبل الجراحة وبعدها.

خيارات إعادة بناء الثدي

يمكن للنساء اللواتي خضعن لجراحة لعلاج سرطان الثدي الاختيار من بين عدة أنواع من إعادة بناء الثدي. عند تحديد النوع الأفضل لك، يجب أن تناقشي أنت وأطبائك كافة العوامل بما في ذلك صحتك وتفضيلاتك الشخصية. خذي الوقت الكافي لمعرفة الخيارات المتاحة لك وفكري في التحدث إلى الاختيارات اللواتي أجريين مثل هذا الإجراء الجراحي قبل اتخاذ القرار.

أنواع الإجراءات الجراحية لإعادة بناء الثدي

تتوفر عدة أنواع من الجراحات الترميمية، وغالباً ما تعني الجراحة إجراء أكثر من عملية واحدة. امنحي نفسك متسعاً من الوقت لاتخاذ أفضل قرار يناسبك. يجب أن تتخذي قرارك بشأن إعادة بناء الثدي فقط بعد أن تكوني على علم كامل بحديثاته.

النوعان الرئيسيان لإعادة بناء الثدي هما ترميم الغرسة وإعادة بناء الأنسجة (السديلة). وفي بعض الأحيان يتم استخدام إجراءات الغرسة والسديلة معاً لإعادة بناء الثدي.

وبالنسبة لجميع أنواع عمليات إعادة بناء الثدي، غالباً ما تكون هناك فرصة لإجراءات "تحسين" جراحية في المستقبل، مثل حقن الدهون وتنقيح الندبات. ويمكن لعمليات إعادة بناء الثدي أيضاً إعادة إنشاء منطقة الحلمة والهالة التي يمكن إجراؤها من خلال إجراء جراحي صغير أو الوشم أو مزيج من الاثنين معاً. ويتم ذلك للمساعدة في جعل الثدي المعاد بناؤه يبدو أشبه بالثدي الأصلي.

لمزيد من التفاصيل والاستفسار اتصل بنا على 00965 2536 0555





برنامج رويال هوم هيلث
للعناية المنزلية بسرطان الثدي

8

يعتبر التعرض لسرطان الثدي وقتاً صعباً ومرهقاً للمرأة وعائلتها. سيساعدك ضمان حصولك على الدعم النفسي والطبي المناسب طوال رحلة الرعاية على إدارة نتائجك بشكل أفضل وربما التعافي بشكل أسرع. وقد تم إعداد برنامج رويال الرعاية المنزلية لسرطان الثدي خصيصاً لهذا الغرض. وسوف تتلقين رعاية سريرية مبنية على الأدلة والممارسات الدولية.

نحن نقدم الرعاية بناءً على متطلباتك وتفضيلاتك المحددة بما في ذلك زيارة الطبيب المنزلية، واستشارة الطبيب عبر الفيديو، وزيارات ممرضات الرعاية التلطيفية ودعم إعادة التأهيل. وسوف يتم تنسيق جميع جوانب الرعاية من قبل الدكتورة أمينة محمد الأنصاري، استشاري طب الأسرة والطب التلطيفي.

نسق عمل الطبيب

سيقوم طبيبنا المتخصص في الطب التلطيفي بزيارة منزلك لإجراء تقييم شامل للثدي، كما سيقوم بتعليم العميل كيفية إجراء الفحص الذاتي للثدي، وتقديم المشورة النفسية، وإعداد خطة علاج وفق متطلباتك وإدارة متابعة الخطة بما في ذلك التوصية بإجراء فحص الموجات فوق الصوتية للثدي.

نسق عمل التمريض

تشمل زيارات فريق التمريض المتخصص تقييماً معمقاً للمريض مع خطة رعاية وجلسات تثقيفية والرعاية الخاصة بتغييرات الملابس والارتشاحات بالإضافة إلى الدعم العاطفي من جانب الممرضة طوال هذه الرحلة. وسوف تقوم الممرضة بزيارتك قبل الجراحة وبعدها وأنت مرتاحة في منزلك.

نسق عمل إعادة التأهيل

سيوفر أخصائي العلاج الطبيعي تمارين معدة خصيصاً لمرضى سرطان الثدي قبل وبعد الجراحة بما في ذلك التوجيه والمساعدة فيما يخص التورم اللمفاوي اعتماداً على الجراحة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون هناك، وتحت إشراف أخصائي العلاج الطبيعي، تدليك علاجي يقدمه معالج تدليك متمرس.

يقدم لك فريقنا متعدد التخصصات رعاية شاملة ومعدة خصيصاً وفق متطلباتك واحتياجاتك طوال رحلتك.



