



رويال حياة دنتل
ROYALE HAYAT DENTAL

POST-PROCEDURE CARE GUIDE



مستشفى رويال حياة
ROYALE HAYAT HOSPITAL



royalehayat

royale_hayat



/royalehayathospital

2536 0000
www.royalehayat.com

1. SURGICAL EXTRACTION CARE:

- Keep the gauze in place for 30 - 45 minutes to stop bleeding.
- Avoid touching the extraction site with your tongue or fingers.
- Do not rinse or spit for the first 24 hours.
- Avoid smoking and drinking with straw for a week.
- Avoid physical activity for at least 3 - 5 days.



2. IMPLANT CARE:

- Avoid touching the implant area with your tongue or fingers.
- Follow post-op instructions provided by your dentist.
- Rest and avoid physical activity for 48 hours.
- When lying down, use pillows to keep your head elevated.



3. ROOT CANAL TREATMENT CARE:

- Avoid chewing on the treated tooth until a permanent restoration is placed.
- If you have a temporary filling, take extra care to avoid chewing on the side of the treated tooth until the permanent crown is placed.
- It's common to experience mild discomfort or sensitivity for a few days after the procedure
- Delaying your permanent restoration can lead to reinfection or breakage of the tooth.

4. POST-BRIDGE CARE:

- Clean under and around your bridge with floss (use water floss) or a special interdental brush.
- Schedule regular checkups to ensure your bridge is in good condition.

5. POST CROWN CARE:

- Numbness: After the procedure, your mouth may still be numb. Avoid eating or drinking until the numbness subsides to prevent injury.
- Sensitivity: Some sensitivity to hot or cold is normal for the first few days. This should diminish as your tooth adjusts to the new crown.
- Avoid chewing on the side where the crown was placed.
- Use a soft-bristled toothbrush to prevent irritation.
- Floss Carefully: When flossing, slide the floss out instead of lifting it up to avoid loosening the crown

- إذا كنت تضغط أسنانك ليلاً، فكر في استخدام قوالب الحماية لحماية التاج والأسنان الأخرى من التآكل الزائد.



التعليمات العامة:

– النظام الغذائي:

- تناول الأطعمة اللينة (مثل الزبادي، البطاطا المهروسة، الحساء) بعد زوال تأثير المخدر.
- تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة والحارة.
- التزم بالأطعمة اللينة خلال فترة النقاهة.
- تجنب الأطعمة اللاصقة، الصلبة والمقرمشة مثل العلكة، الكراميل، والمكسرات لأنها قد تؤدي إلى فك أو تلف التاج/الجسر.
- اشرب الكثير من الماء للبقاء رطباً، لكن تجنب المشروبات الساخنة التي قد تسبب الإزعاج.

– إدارة الألم:

- تناول مسكنات الألم الموصوفة وفقاً للتعليمات.
- ضع كيس ثلج أو كمادة باردة على المنطقة المصابة (خارج الوجه) بفترات تتراوح بين 1-10 دقيقة خلال الـ 24 ساعة الأولى لتقليل التورم وتخدير المنطقة.

– العناية الفموية:

- نظف أسنانك بلطف مع تجنب منطقة الجراحة.
- بعد 24 ساعة، قم بالمضمضة بماء دافئ وملح (1 ملعقة صغيرة ملح في كوب ماء) 2-3 مرات يومياً.



3. العناية بعد علاج عصب الأسنان:

- تجنب المضغ على السن المعالج حتى يتم وضع الحشوة الدائم.
- إذا كان لديك حشوة مؤقتة، احرص على تجنب المضغ على الجانب الذي تم علاجه حتى يتم تركيب التاج الدائم.
- من الطبيعي أن تشعر ببعض الانزعاج أو الحساسية لبضعة أيام بعد العلاج.
- تأخير وضع الحشوة الدائم يمكن أن يؤدي إلى إعادة العدوى أو كسر السن.

4. العناية بعد تركيب جسر الأسنان:

- نظف أسفل وحول الجسر باستخدام الخيط (استخدم غسول الماء) أو الفرشاة الخاصة بين الأسنان.
- حدد مواعيد فحص منتظمة للتأكد من أن الجسر في حالة جيدة.

5. العناية بعد تركيب التاج:

- التخدير: بعد الإجراء، قد يبقى فمك مخدراً. تجنب الأكل أو الشرب حتى يزول تأثير البنج لتجنب الإصابة.
- الحساسية: قد تشعر ببعض الحساسية تجاه الحرارة أو البرودة لبضعة أيام.
- يجب أن تتلاشى مع تأقلم السن مع التاج الجديد.
- تجنب المضغ على الجانب الذي تم تركيب التاج عليه.
- استخدم فرشاة أسنان ناعمة لتجنب التهيج.
- احرص عند استخدام الخيط: قم بسحب الخيط للخارج بدلاً من رفعه لتجنب فك التاج.
- من الطبيعي الشعور بعدم الارتياح أو الألم حول التاج، والذي يجب أن يختفي خلال بضعة أيام.



رويال حياة دنتل
ROYALE HAYAT DENTAL

دليل العناية بعد الإجراءات الطبية



مستشفى رويال حياة
ROYALE HAYAT HOSPITAL



royalehayat



royale_hayat



/royalehayathospital

2536 0000
www.royalehayat.com

- Mild discomfort or soreness around the crown is normal and should subside within a few days.
- If you grind your teeth at night, consider getting a night guard to protect your crown and other teeth from excessive wear



COMMON INSTRUCTIONS:

- DIET:

- Eat soft foods (yogurt, mashed potatoes, soup) after the effect of local anesthetic agents.
- Avoid hot and spicy foods and drinks.
- Stick to soft foods during the adjustment period.
- Avoid sticky, hard and crunchy foods such as chewing gum, caramel, and nuts, as they could dislodge or damage the crown / bridge.
- Drink plenty of water to stay hydrated, but avoid hot drinks that can cause discomfort.

- PAIN MANAGEMENT:

- Take prescribed pain medications as directed.
- Apply an ice pack or a cold compress to the affected area (outside of the face) in 10 - 15 minutes intervals during the first 24 hours to reduce swelling and numb the area.

- ORAL HYGIENE:

- Brush gently, avoiding the surgical site.
- After 24 hours, rinse with warm salt water (1 tsp salt in a glass of water) 2 - 3 times a day.

1. العناية بعد خلع الأسنان الجراحي:

- احتفظ بالشاش في مكانه لمدة 30-45 دقيقة لوقف النزيف.
- تجنب لمس منطقة الخلع بلسانك أو بأصابعك.
- لا تقم بالمضمضة أو البصق خلال أول 24 ساعة.
- تجنب التدخين، والشرب باستخدام الماصة لمدة أسبوع.
- تجنب الأنشطة البدنية لمدة 3-5 أيام على الأقل.



2. العناية بعد زراعة الأسنان:

- تجنب لمس منطقة الزراعة بلسانك أو بأصابعك.
- اتبع تعليمات ما بعد العملية المقدمة من طبيب الأسنان.
- استرح وتجنب الأنشطة البدنية لمدة 48 ساعة.
- عند الاستلقاء، استخدم الوسائد لرفع رأسك.

