

تعليمات للمريض

إختبار وخز الجلد للحساسية

ما هو الاختبار؟

هو اختبار بسيط وسريع يتم فيه وضع قطرات صغيرة من مواد مُسبِّبة للحساسية على الجلد (عادةً على الساعد أو أعلى الظهر). ثم يتم وخز الجلد بلطف باستخدام أداة صغيرة، وتظهر النتائج خلال 15 - 20 دقيقة.



قبل الاختبار

- أوقف تناول مضادات الهيستامين قبل 5 - 7 أيام من موعد الإختبار (أو حسب تعليمات الطبيب)
- لا توقف أي أدوية موصوفة لك إلا إذا طلب منك الطبيب ذلك

• يرجى إبلاغ الطبيب إذا كنت تتناول:

- أدوية الحساسية
- الكورتيزون عن طريق الفم
- أدوية الربو
- مضادات الاكتئاب أو أي أدوية أخرى قد تؤثر في نتائج الاختبار
- لا تضع كريمات أو مرطبات على منطقة الاختبار في يوم الموعد
- يرجى إبلاغنا إذا كنت حاملاً أو إذا كان الربو لديك غير مُسيطر عليه بشكل جيد



أثناء الاختبار

- قد تشعر بحكة خفيفة أو انزعاج بسيط في موضع الاختبار
- أخبر الطاقم الطبي فوراً إذا شعرت بدوخة أو بتوسع

بعد الاختبار

- من الطبيعي حدوث احمرار أو تورم خفيف في أماكن الاختبار، وعادةً ما يختفي خلال بضع ساعات
- يمكن وضع كريم مُهدئ عند الحاجة حسب إرشادات الطبيب
- تجنب حك أو فرك منطقة الاختبار



ملاحظة

- قد تختلف هذه التعليمات حسب حالتك الصحية والأدوية التي تتناولها
- إذا كانت تعليمات طبيبك تختلف عما هو مذكور في هذه النشرة، يُرجى اتباع تعليمات طبيبك



Patient Instructions for Allergy Skin Prick Test

What is the test?

A simple and quick test where small drops of allergens are placed on your skin (usually the forearm or upper back). The skin is gently pricked, and results appear within 15 – 20 minutes.



Before the Test

- Stop antihistamines 5 – 7 days before the test (or as instructed by your clinician)
- Do not stop any prescribed medications unless your clinician tells you to
- **Inform your clinician if you are taking:**
 - Allergy medications
 - Oral steroids
 - Asthma medications
 - Antidepressants or other medicines that may affect results
 - Do not apply creams or lotions on the test area on the day of the appointment
 - Inform us if you are pregnant or have poorly controlled asthma



During the Test

- You may feel mild itching or slight discomfort
- Tell the staff immediately if you feel dizzy or unwell

After the Test

- Mild redness or swelling at the test sites is normal and usually fades within a few hours
- A soothing cream may be applied if needed, as advised by your clinician
- Avoid scratching the test area



Note:

- Instructions may vary depending on your medical condition and medications
- If your clinician's instructions differ from this handout, follow your clinician's directions

