

تعليمات للأمهات لما
بعد الولادة

Discharge Instructions
For Postpartum Patients



تعليمات الخروج من المستشفى لمرضى ما بعد الولادة

١. المقدمة

- ستساعد هذه النشرة على التأكد من أنك في حالة مستقرة. تعتبر فترة النفاس مرحلة حرجة لك ولطفلك، مما يستدعي أهمية العناية بنفسك.
- أنت بحاجة لمزيد من الدعم والاهتمام لبضعة أسابيع بعد الولادة مباشرة.
- سيستغرق الشفاء التام بعد العملية القيصرية للمزيد من الوقت.
- إسمحي للآخرين بفعل الأشياء من أجلك ولا تترددي في طلب المساعدة.

٢. متى تتصلين بطبيبك؟

- إتصلي بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كان لديك أي مما يلي:
- حمى تصل إلى ٣٨ درجة مئوية أو أعلى.
- إحممرار أو ألم أو نزيف في موضع الجرح.
- نزيف الذي يتطلب فوطه صحية جديدة كل ساعة.
- ألم شديد في البطن.
- ألم أو إحاح مع التبول.
- رائحة كريهة من الإفرازات المهبلية.
- صعوبة التبول أو إفراغ المثانة.
- عدم وجود حركة للأمعاء خلال أسبوع واحد بعد ولادة طفلك.
- منطقة منتفخة وحمراء ومؤلمة في الساق.
- ظهور طفح جلدي أو بثور.
- منطقة مؤلمة وحمراء على الثدي قد تصاحبها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.
- مشاعر القلق والذعر / أو الاكتئاب.

٣. حان الوقت للتعافي

- ستحتاجين لفترات متكررة من الراحة وحاولي أخذ قيلولة كلما استطعت. في الأيام العشرة الأولى نوصيك بالتركيز على احتياجاتك الجسدية وإطعام طفلك. دعي أقاربك وأصدقائك يهتمون بشأن وجبات عائلتك. إذا كانت عائلتك وأصدقائك يريدون حقاً المساعدة، فسوف يقدمونها. لا ينبغي أن يتوقع منك ترفيه أي شخص أثناء تعافيك من ولادتك. هذه بعض الاقتراحات:
- لا تحاولي رعاية أي شخص آخر غير نفسك وطفلك.
- خذي الكثير من الراحة وقيلولة في فترة ما بعد الظهر.
- إستعيدي نشاطك رويداً رويداً.
- قومي بإجراء تمارين التنفس العميق والسعال بعد الجراحة، إستفسري عن التعليمات من مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.
- لا تحملي أي شيء أثقل من وزن طفلك لمدة ٤ أسابيع. ولمدة ٦ أسابيع للأمهات بعد الولادة القيصرية.
- تجنب القيادة لمدة أسبوعين على الأقل.
- قد تعود الأم إلى العمل في غضون ٤-٦ أسابيع بعد موعد المتابعة مع طبيب التوليد.

٤. العناية بالعجان

- بعد الولادة الطبيعية المهبلية، قد يكون لديك غرز عند بضع الفرج.
- فيما يلي خطوات يمكنك إتباعها لمنع العدوى ولزيادة راحتك:
- نظفي منطقة العجان من الأمام إلى الخلف في كل مرة تتبولين فيها أو تتبرزين. ضعي ضمادة نظيفة في كل مرة تستخدمين فيها الحمام.
- ضعي الدواء على منطقة العجان حسب طلب الطبيب.
- إستمتعي بحمام المقعدة الدافئ عدة مرات في اليوم للراحة وتعزيز الشفاء وسوف يمنحك شعوراً رائعاً.
- ستذوب الخيوط الجراحية في غضون ٢-٣ أسابيع.



٥. العناية بالشق الجراحي

- فيما يلي كيفية العناية بالشق الجراحي بعد الولادة القيصرية:
- الاستحمام عند الحاجة. جففي الشق بالتربيت.
- راقبي شقك بحثاً عن علامات للعدوى، مثل المزيد من الاحمرار أو التصريف.
- ضعي وسادة على الجرح عندما تضحكين أو تسعين وعند النهوض من وضعية الاستلقاء أو الجلوس.
- تذكر، قد يستغرق شفاء شقك ٦ أسابيع.

٦. رعاية الثدي والحلمة للأمهات المرضعات

- الامتلاء والثقل هي عملية طبيعية تبدأ عادة بعد ٤٨ ساعة تقريباً من الولادة.
- نقدم لك فيما يلي بعضاً من تدابير الراحة يمكنك استخدامها:
- إرتدي حمالة صدر مناسبة وداعمة ٢٤ ساعة في اليوم.
- عرضي حلمتي ثديك للهواء كلما استطعت.
- أطعمي طفلك بشكل متكرر باستخدام كلا الثديين في كل رضة.
- إذا كان لديك إحتقان في ثديك إستحمي بماء دافئ أو ضعي مناشف دافئة ورطبة على ثديك قبل الرضاعة مباشرة.
- إسحبي بعض اللبن أو الحليب من ثديك يدوياً قبل وضع الطفل على ثديك.
- تأكدي من دخول الحلمة والهالة في فم طفلك بالكامل.
- إنهي الشفط من فم طفلك على الحلمة بإصبعك الصغير قبل سحب الطفل عن الثدي.
- لا تستخدم الصابون على الحلمتين!
- إن كنت تستخدمين شفاط الحليب، يجب عليك ضخ ما لا يقل عن ٦ مرات في اليوم / ١٥ دقيقة على كل ثدي. عليك المتابعة مع إستشاري الرضاعة وطبيب الأطفال.

٧. رعاية الثدي للأمهات غير المرضعات

- من الممكن إحتقان ثدي الأمهات غير المرضعات أيضاً. سيساعدك ما يلي على تخفيف أي ألم قد تشعرين به:
- تجنبي أي تدليك أو مساج للثدي غير ضروري.
- لتخفيف ألم إحتقان الثديين، ضعي أكياس الثلج على ثديك لمدة عشرين دقيقة. الثلج المجروش أو المتشقق في الأكياس البلاستيكية فعال جداً.

٨. التبول

- ستلاحظين كثرة التبول في اليومين الثاني والثالث بعد الولادة، هذا أمر طبيعي! من المهم شرب الكثير من السوائل.
- يوصى باستخدام ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يومياً.

٩. وظيفة الأمعاء

- تعود حركة الأمعاء الطبيعية في اليوم الثالث أو الرابع بعد الولادة.
- للمساعدة في العودة إلى النمط الطبيعي لنشاط الأمعاء، نوصي بما يلي:
- إشربي عصير البرقوق مرة واحدة يومياً، تناولي الفواكه والخضروات والنخالة وخبز الحبوب الكاملة والحبوب في نظامك الغذائي.
- تناولي مليات البراز حسب توجيهات الطبيب.
- يمكن تناول ملعقتين كبيرتين من حليب المغنيسيا إذا لم يكن لديك حركة أمعاء بحلول اليوم الثالث أو الرابع بعد الولادة.



١. النزيف المهبلي

سيكون تدفق الدم غزيرًا في أول يومين. من الطبيعي أن تري عدة جلطات صغيرة. عادة ما يكون اللون أحمر غامق خلال أول ٤٨ ساعة؛ ثم أحمر فاتح من ٣-٧ أيام بعد الولادة. لونها أبيض بحلول اليوم الثاني عشر بعد الولادة. إذا كنت مستلقية لعدة ساعات، قد تعاني من تدفق الدم عند الوقوف لأول مرة. هذا أمر متوقع ولا يدعو للقلق! إذا حدث بعد ٣-٤ أيام وتحول تدفق الدم إلى اللون الأحمر الفاتح مرة أخرى وازدادت الكمية، ذلك يعني أنك بذلتي مجهودا. عليك بالراحة أكثر!

٢. التغذية

تزداد أهمية المواد الغذائية لجميع الأمهات بعد الولادة، خاصة إن كن يرضعن. تأكدي من شرب الكثير من السوائل وتناول الأطعمة المتنوعة من المجموعات الغذائية الأساسية الأربعة. إستمري في تناول الفيتامينات الشخصية وأقراص الحديد حسب إرشادات الطبيب.

٣. الاحتياجات الإجتماعية والجسدية

تعتبر "كآبة ما بعد الولادة" أمرًا طبيعيًا في فترة الأسابيع الأولى للولادة. مما يستدعي حاجتك لمزيد من الراحة. من طرق مكافحة "الكآبة" أن تطلب من شخص ما أن يعتني بطفلك بينما تعالجين نفسياتك حتى تشعري بالرضا والراحة. قد تحتاجين لمغطس هادئ في حوض الإستحمام أو الخروج من المنزل في نزهة قصيرة سيرًا على الأقدام بمفردك أو في رحلة قصيرة إلى المتجر. جسمك غير مستعد لإستئناف الجماع وذلك الى أن يتعافى جسدك. لا يُقترح الجماع الجنسي لمدة ٤-٦ أسابيع. يكتمل التعافي عادة عندما تختفي الإفرازات المهبلية. يشير هذا إلى أن موقع المشيمة في الرحم قد تعافى. إذا توقفت إفرازاتك المهبلية وتعافى بضع الفرج، فليس هناك سبب يمنعك من إستئناف الجماع، إذا كانت لديك الرغبة في ذلك (في غضون ٣ أسابيع تقريبًا).

٤. خطة خالية من التدخين

يجب الالتزام ببيئة خالية من التدخين من أجل مولودك الجديد كما تعلمين الأطفال الذين يعيشون مع من يدخنون يعانون من التهابات الأذن والربو والالتهاب الرئوي.



Discharge Instructions For Postpartum Patients

1. Introduction

- This handout will help to ensure that you are in a stable condition. Immediate postpartum is a critical stage for both you and your baby. Hence, it is important that you take care of yourself.
- You require additional support for a few weeks immediately after birth.
- Full recovery after a Cesarean Section will take more time.
- Allow others to do things for you and don't hesitate to ask for help.

2. When to call your Doctor

Call your healthcare provider right away if you have any of the following:

- Fever of 38°C or higher.
- Redness, pain, or drainage at your incision site.
- Bleeding that requires a new sanitary pad every hour.
- Severe pain in the abdomen.
- Pain or urgency with urination.
- Foul odor from vaginal discharge.
- Trouble urinating or emptying your bladder.
- No bowel movement within 1 week after the birth of your baby.
- Swollen, red, painful area in the leg.
- Appearance of rash or hives.
- Sore, red, painful area on the breasts that may come with flu-like symptoms.
- Feelings of anxiety, panic, and/or depression.

3. Time for Recovery

You need frequent rest periods and you should try to take naps whenever you can. For the first 10 days we recommend that you concentrate on your own physical needs and the feeding of your infant. Let your relatives and friends worry about getting your family's meals. If your family and friends really want to help, they will provide the help. You should not be expected to entertain anyone while you are recovering from your delivery.

Here are some suggestions:

- Do not try to take care of anyone other than your baby and yourself.
- Get lots of rest. Take naps in the afternoon.
- Increase your activities bit by bit.
- Do post-surgical deep breathing and coughing exercises. Ask your healthcare provider for instructions.
- Do not lift anything heavier than your baby for 4 weeks. For Cesarean Section mothers: No lifting for 6 weeks.
- Avoid driving at least for 2 weeks.
- Mothers may go back to work in 4-6 weeks after their follow-up appointment with their obstetrician.

4. Perineal Care

After a normal vaginal delivery, you may or may not have stitches from an episiotomy.

Listed below are steps you can take to prevent infection and to increase your comfort:

- Cleanse the perineal area from front to back each time you urinate or have a bowel movement. Apply a clean peri-pad each time you use the bathroom.
- Apply medication to your perineal area as ordered by your doctor.
- Enjoy a warm sitz bath several times a day for comfort and to promote healing. It feels great.
- Sutures will dissolve in 2-3 weeks.



5. Incision Care

Here is how to take care of your incision after a Cesarean Section:

- Shower as needed. Pat your incision dry.
- Watch your incision for signs of infection, like more redness or drainage.
- Hold a pillow against the incision when you laugh or cough and when you get up from a lying or sitting position.
- Remember, it can take as long as 6 weeks for your incision to heal.

6. Breast and Nipple care for nursing mothers

Breast fullness, tenderness, and heaviness, is a normal process that usually begins approximately 48 hours after delivery. Listed below are some comfort measures that you can take:

- Wear a firm, supportive bra 24 hours a day.
- Expose your nipples to the air whenever you can.
- Feed your baby frequently using both breasts at each feeding.
- If you are engorged, take a warm shower or apply warm, moist towels to your breasts just before feeding.
- Manually express some colostrum or milk from your breasts before putting the baby to your breast.
- Be sure the baby takes the whole nipple and areolar areas into his/her mouth.
- Be sure to break the suction of the baby's mouth on your nipple with your little finger before pulling the baby off your breast.
- Do not use soap on your nipples!
- If you are given and using contact nipple shields, you must pump at least 6 times a day/ 15 minutes on each breast. Seek follow-up with a lactation consultant and your pediatrician.

7. Breast care for non-nursing mothers

Non-nursing mothers' breasts may also become engorged.

The following will help to decrease any discomfort that you may feel:

- Avoid any unnecessary handling or massaging of the breasts.
- If your breasts become full and painful, apply ice bags to your breasts for twenty minutes intervals. Crushed or cracked ice in plastic bags works well.

8. Urination

You may urinate more than usual on the second and third days after birth. This is normal! It is important to drink a lot of fluids. Six to eight glasses of fluid a day is recommended.

9. Bowel Function

Expect a normal bowel movement by 3rd or 4th day after delivery.

To help your return to a normal pattern of bowel movements, we recommend:

- Drink prune juice once daily and include foods in your diet such as fruits and vegetables, bran, and whole grain breads and cereals.
- Take stool softeners as directed by your doctor.
- Two tablespoons of Milk of Magnesia may be taken if you have no bowel movement by your 3rd or 4th day after delivery.



10. Vaginal Bleeding

The color will usually be dark red for the first 48 hours; then light red from days 3-7 after birth. It is white colored by the 12th day after birth.

Your flow will be heavy for the first 2 days. It is normal to see several small clots.

If you have been lying down for several hours, you may experience a gush of blood when you first stand up. This is to be expected, and is no cause for alarm!

If, after 3 – 4 days, your flow becomes bright red again and increases in amount, it usually means that you have been doing too much. REST MORE!

11. Nutrition

All mothers have increase nutritional needs after delivery, especially if they are breastfeeding. Be sure to drink plenty of fluids and to eat foods from all four of the Basic Food Groups. Continue to take your personal vitamins and iron tablets as ordered by your doctor.

12. Social & Physical Needs

The “Postpartum Blues” are a normal occurrence during the first few weeks after delivery. It may be a sign that you need more rest.

- One way to combat the “blues” is to request that someone care for your baby while you treat yourself to something that makes you feel good about yourself.
- You may just need a quiet soak in the tub or to get out of the house for a short walk alone or brief trip to the store.
- Your body is not ready to resume sexual intercourse again until you have physically recovered from your delivery. No sexual intercourse for 4-6 weeks is suggested.
- Recovery is usually complete when your vaginal discharge disappears. This indicates the placental site in your uterus has healed.
- If your vaginal discharge has ceased, and your episiotomy has healed, there is no reason you cannot resume sexual intercourse, if you have the desire to do so, in about 3 weeks.

13. Smoke-Free-Plan

You have committed to a smoke-free environment for your newborn because you understand that children who live with those who smoke have ear infections, asthma and pneumonia.

