


إختبار الحساسية باللصقات


دليل مختصر

ماذا تتوقع؟

- اليوم: يتم تثبيت لوحات المسببة للحساسية على الجزء العلوي من الظهر باستخدام لاصق طبي
- بعد 48 ساعة: يتم إزالة اللصقات وإجراء القراءة الأولى للنتيجة
- بعد 72 - 96 ساعة: إجراء القراءة الثانية (وأحياناً قراءة إضافية إذا لزم الأمر)
- يجب إبقاء الظهر جافاً، وتجنب التعرق الشديد / ممارسة الرياضة والسباحة حتى الانتهاء من جميع القراءات



Patches with potential allergens left on for two days.



Areas checked two days after removal.

ما يجب تجنبه (ولمدة كم)

- الكريمات أو المراهم المحتوية على الكورتيزون الموضعي أو مثبطات الكالسينيورين الموضعية (تاكروليموس / بيميكروليموس) على الجزء العلوي من الظهر: تجنب استخدامها لمدة 7 أيام قبل وضع اللصقات
- التعرض للشمس / أجهزة التسمير / العلاج الضوئي على منطقة الاختبار: تجنب لمدة أسبوعين على الأقل قبل الاختبار
- اللوشن أو الزيوت على الظهر: تجنب استخدامها في يوم وضع اللصقات (ويُفضل أيضاً قبلها بيوم إلى يومين لضمان ثبات اللاصق)
- إذا طلب منك الطبيب إيقاف مضادات الهيستامين: أوقفها قبل الاختبار بـ 7 أيام. لا توقف أي أدوية موصوفة لك إلا إذا طلب منك الطبيب ذلك.
- إذا كنت بحاجة إلى حلاقة الجزء العلوي من الظهر، يرجى القيام بذلك قبل الاختبار بـ 48 ساعة (وليس في نفس يوم الاختبار)
- في حال استخدامك الكورتيزون عن طريق الفم أو أدوية مثبطة للمناعة، يرجى إبلاغنا مسبقاً لأنها (قد تؤثر على النتائج)



إتصل بنا بشكل عاجل إذا ظهرت لديك فقاعات شديدة، طفح جلدي منتشر.

ملاحظة من العيادة:

- قد تختلف التعليمات حسب نوع لوحة الاختبار والأدوية التي تتناولها
- إذا اختلفت تعليمات طبيبك عن هذه النشرة، يرجى اتباع تعليمات طبيبك




Allergy Patch Testing


Quick Guide

What to expect?

- Day 0: Allergen panels are taped to your upper back
- 48 hours: Patches are removed + first reading
- 72 – 96 hours: Second reading (sometimes later if needed)
- Keep your back dry; avoid heavy sweating / exercise and swimming until readings are finished




Patches with potential allergens left on for two days.



Areas checked two days after removal.

What to avoid (how long)?

- Topical steroid creams/ointments or topical calcineurin inhibitors (tacrolimus / pimecrolimus) on the upper back: avoid for 7 days before placement
- Sun / tanning beds / phototherapy to the test area: avoid for at least 2 weeks before
- Lotions / oils on the back: avoid the day of placement (and ideally the 1 – 2 days before so tape sticks)
- If your clinician instructs you to stop antihistamines: stop 7 days before the test. Do not stop prescribed medicines unless we tell you to
- If you need to shave your upper back, do it 48 hours before (not the day of)
- Systemic steroids or other immunosuppressing medicines: tell us ahead of time (may affect results)



Call us urgently if you develop severe blistering, a widespread rash.

Clinic note:

- Instructions vary by panel and your medications
- If your clinician's directions differ from this handout, follow your clinician's directions

