



تعرف / إسأل عن التجلطات

قد يصاب أي شخص
بالتجلطة



الجلطة هي انسداد في الوعاء الدموي

قد تنتقل الجلطة من مكان إلى أماكن أخرى في الجسم

هناك أسماء مختلفة
للتجلطات

1 تخثر عميق في الوريد

2 جلطة رئوية



النساء الحوامل

لديهن نسبة
أكبر للإصابة بالجلطة



1% من كبار السن
الذين تتجاوز
أعمارهم 80 سنة
يصابون بالتجلطات



25% من الأشخاص
الذين قاموا
بعمليات
جراحية كبيرة / معقدة
هم أكثر عرضة للإصابة بالتجلطات



الأشخاص المصابين بالسرطان
و لديهم ضعف في المناعة،
أو في العناية المركزة،
نسبة إصابتهم
بالتجلطات كبيرة




66% من التجلطات تحدث أثناء التواجد في
المستشفى أو خلال 90 يوما من وقت
دخول المستشفى.

66%

بعض الحالات الصحية
تزيد من خطر
الإصابة بالتجلط



فرصة إصابة الأشخاص
الذين يعانون من
زيادة الوزن
بالتجلط أعلى ب



200%

أكبر من فرصة
الإصابة بها

في الطائرة



فرصة الإصابة
بجلطة

في المستشفى



يمكنك تجنب الإصابة
بالتجلطات،
إسأل لمعرفة احتمال
إصابتك بالتجلطات.



على الجميع السؤال
عن التجلطات

إسأل طبيبك،
الطاقم التمريضي
أو المختص
عن التجلطات





ASK ABOUT CLOTS

A **CLOT** is a blockage in a blood vessel
It can travel to other places in the body.


ANYONE CAN
GET A **CLOT**

There are different
names for **CLOTS**



**1 DEEP VEIN
THROMBOSIS**

**2 A PULMONARY
EMBOLISM**



PREGNANT WOMEN

have a higher risk
of developing a **CLOT**



25% of people
who have
SERIOUS SURGERY
can get **CLOTS**




66% of **CLOTS** happen
in Hospital or in the
90 Days following
admission.



Some ongoing medical conditions
increase the risk of developing a **CLOT**.

1% of people
who have
aged **+80**
develop **CLOTS**



People who have
Cancer – illness
and poor health
Increase the risk
of a **CLOT**



OVERWEIGHT
people have a

200%

higher chance than
other people of
developing a **CLOT** a little
or very overweight people.



You have **Higher Chance**
of getting a **CLOT**

in
Hospital



Than on an
Airplane

CLOTS can be
Avoided.
Ask to be
Assessed for
Your risk.



EVERYONE SHOULD
ASK ABOUT **CLOTS**

Ask Your **Doctor**
Nurse Or **Health**
Professional
About **CLOTS**





كيفية إستخدام حقنة (LMWH) الهيبارين بجزئيات منخفضة الوزن

كيف تحقن نفسك بواسطة
حقنة LMWH معدة مسبقا؟

يعد أسفل البطن المكان الأنسب
للحقن علما بأنه يمكن الإستعاضة
بجوانب الفخذين مع مراعاة عدم
حقن أنسجة العضل.

* إحرص على تبديل مكان الحقن
من فترة لأخرى.





أنزع الغطاء الواقي للحقنة وقيم
بحملها كالقلم بواسطة اليد
المستخدمة للكتابة وذلك
ما بين الإبهام والإصبع الأوسط.

لا تقم بإزالة الفقاعات الهوائية
التي قد تكون في الحقنة.

إدفع الحقنة إلى الجلد بشكل أفقي
مع مراعاة عدم تحريكها، واضغط
على المكبس ببطء لحقن الجرعة.

* قم بسحب الحقنة عند إفراغ
المحتوى بالكامل.

تخلص من الحقن المستخدمة
في حاويات ذات غطاء واحفظها
بعيدا عن متناول يد الأطفال.



تأكد من غسل يديك أولا.

إمسح المنطقة جيدا بواسطة
الكحول وأتركها حتى تجف.

إقبض بيدك الأخرى بين السبابة
والإبهام على ثنية من الجلد
وحافظ على هذه الوضعية
طوال فترة الحقن.

إضغط بواسطة مسحة الكحول
على مكان الحقن لمدة 5 إلى 10
ثواني و أحرص على عدم القيام
بفرك المنطقة.



Low Molecular Weight Heparin Injection Techniques (LMWH)

How to give yourself a LMWH injection using Prefilled Syringes?

Wash your hands.




Wipe the area you've chosen with an alcohol swab and allow it to dry




Gently pinch a fold of skin between your thumb and index finger and keep it pinched during the injection.




Press an alcohol swab on the injection site for about 5-10 seconds. Do not rub the injection site.



The preferred injection site is the lower abdomen. The sides of the thighs may also be used if muscle is avoided. Rotate injection sites.



Remove the needle cover. Hold the syringe like a pencil with your writing hand. Do not remove any small air bubbles.



Pinch the skin between your thumb and index finger. Insert the needle straight in and keep it still. Slowly push the plunger to inject the dose, then withdraw the needle once the syringe is empty.



Dispose of the syringe in a safe container, such as a plastic jar with a lid (i.e., Sharps container), and store away from children.

إحذر من مشاركة أقلام الأنسولين

قلم إنسولين واحد
مخصص لمريض واحد



إن أقلام الأنسولين التي تحتوي على أكثر من جرعة
واحدة هي مخصصة لمريض واحد فقط.

لا ينبغي أبدا أن تستخدم أقلام الأنسولين لأكثر من
شخص واحد.

إن أقلام الإنسولين مصممة وموافق عليها لكي
يستخدمها كل مريض على حدة، حتى عندما يتم
تغيير الإبرة أو عندما يكون هناك بقايا من الدواء.

لا إستثناءات...



مستشفى رويال حياة
ROYALE HAYAT HOSPITAL

2536 0000
www.royalehayat.com


Instagram royalehayat

X royale_hayat

YouTube /royalehayathospital

BE AWARE, DON'T SHARE

One Insulin Pen,
Only One Person



Insulin pens that contain more than one dose of insulin are only meant for one person.

Insulin pens should never be used for more than one person.

They are only approved for use on individual patients, even when the needle is changed or when there is leftover medicine.

No exceptions...



مستشفى رويال حياة
ROYALE HAYAT HOSPITAL

2536 0000
www.royalehayat.com

Instagram royalehayat

X royale_hayat

YouTube /royalehayathospital