



رويال حياة دنتل
ROYALE HAYAT DENTAL

دليل العناية بعد الإجراءات الطبية



مستشفى رويال حياة
ROYALE HAYAT HOSPITAL



royalehayat



royale_hayat



/royalehayathospital

2536 0000
www.royalehayat.com

1. العناية بعد خلع الأسنان الجراحي:

- احتفظ بالشاش في مكانه لمدة 30-45 دقيقة لوقف النزيف.
- تجنب لمس منطقة الخلع بلسانك أو بأصابعك.
- لا تقم بالمضمضة أو البصق خلال أول 24 ساعة.
- تجنب التدخين، والشرب باستخدام الماصة لمدة أسبوع.
- تجنب الأنشطة البدنية لمدة 3-5 أيام على الأقل.



2. العناية بعد زراعة الأسنان:

- تجنب لمس منطقة الزراعة بلسانك أو بأصابعك.
- اتبع تعليمات ما بعد العملية المقدمة من طبيب الأسنان.
- استرح وتجنب الأنشطة البدنية لمدة 48 ساعة.
- عند الاستلقاء، استخدم الوسائد لرفع رأسك.





3. العناية بعد علاج عصب الأسنان:

- تجنب المضغ على السن المعالج حتى يتم وضع الحشوة الدائم.
- إذا كان لديك حشوة مؤقتة، احرص على تجنب المضغ على الجانب الذي تم علاجه حتى يتم تركيب التاج الدائم.
- من الطبيعي أن تشعر ببعض الانزعاج أو الحساسية لبضعة أيام بعد العلاج.
- تأخير وضع الحشوة الدائم يمكن أن يؤدي إلى إعادة العدوى أو كسر السن.

4. العناية بعد تركيب جسر الأسنان:

- نظف أسفل وحول الجسر باستخدام الخيط (استخدم غسول الماء) أو الفرشاة الخاصة بين الأسنان.
- حدد مواعيد فحص منتظمة للتأكد من أن الجسر في حالة جيدة.

5. العناية بعد تركيب التاج:

- التخدير: بعد الإجراء، قد يبقى فمك مخدراً. تجنب الأكل أو الشرب حتى يزول تأثير البنج لتجنب الإصابة.
- الحساسية: قد تشعر ببعض الحساسية تجاه الحرارة أو البرودة لبضعة أيام.
- يجب أن تتلاشى مع تأقلم السن مع التاج الجديد.
- تجنب المضغ على الجانب الذي تم تركيب التاج عليه.
- استخدم فرشاة أسنان ناعمة لتجنب التهيج.
- احرص عند استخدام الخيط: قم بسحب الخيط للخارج بدلاً من رفعه لتجنب فك التاج.
- من الطبيعي الشعور بعدم الارتياح أو الألم حول التاج، والذي يجب أن يختفي خلال بضعة أيام.

- إذا كنت تضغط أسنانك ليلاً، فكر في استخدام قوالب الحماية لحماية التاج والأسنان الأخرى من التآكل الزائد.



التعليمات العامة:

– النظام الغذائي:

- تناول الأطعمة اللينة (مثل الزبادي، البطاطا المهروسة، الحساء) بعد زوال تأثير المخدر.
- تجنب الأطعمة والمشروبات الساخنة والحارة.
- التزم بالأطعمة اللينة خلال فترة النقاهة.
- تجنب الأطعمة اللاصقة، الصلبة والمقرمشة مثل العلكة، الكراميل، والمكسرات لأنها قد تؤدي إلى فك أو تلف التاج/الجسر.
- اشرب الكثير من الماء للبقاء رطباً، لكن تجنب المشروبات الساخنة التي قد تسبب الإزعاج.

– إدارة الألم:

- تناول مسكنات الألم الموصوفة وفقاً للتعليمات.
- ضع كيس ثلج أو كمادة باردة على المنطقة المصابة (خارج الوجه) بفترات تتراوح بين 1-10 دقيقة خلال الـ 24 ساعة الأولى لتقليل التورم وتخدير المنطقة.

– العناية الفموية:

- نظف أسنانك بلطف مع تجنب منطقة الجراحة.
- بعد 24 ساعة، قم بالمضمضة بماء دافئ وملح (1 ملعقة صغيرة ملح في كوب ماء) 2-3 مرات يومياً.