

PATIENT INFORMATION LEAFLET FOR INTRAVENOUS IRON THERAPY

This leaflet answers some common questions about IV iron infusions. Read the leaflet completely and discuss it with your physician for any clarification before signing the informed consent for iron infusion.

What is an IV iron infusion?

“Intravenous” or “IV” means giving something directly into the blood stream of the body through a vein. When the amount of iron in the body gets too low, the hemoglobin level falls below normal. This is known as “iron deficiency anaemia”. Haemoglobin is very important as it carries oxygen from the lungs to the rest of the body. If your haemoglobin or iron levels are low, this may make you feel tired and not able to carry out your normal routine.

Why you need IV iron?

The most common way to treat iron deficiency anaemia is to take iron by mouth as a tablet or liquid. This works well for most people and is usually tried first.

IV iron might be needed if you are:

- Unable to tolerate iron tablet or liquid (Oral Iron)
- Not responding to iron tablets/liquid (such as due to chronic health problems)
- Unable to absorb iron through the gut
- Unable to absorb enough iron due to the amount of blood the body is losing
- In need of a rapid increase in iron levels to help avoid serious complications or blood transfusion (such as, before or after major surgery, significant anaemia late in pregnancy or after delivery)
- Have chronic kidney disease or heart failure

What dose will I take?

You will need to be weighed and have a blood test before taking IV Iron injection. Your weight and the hemoglobin level will be used to calculate the dose of Iron infusion. To get the correct dose you might need to come for more than one infusion based on the physicians' order.

You will be rechecked by the physician approximately four to six weeks after the full dose has been given.

How will iron be given?

It is usually given by inserting a small cannula or tube in the vein (arm or hand) as a slow drip for 15 - 30 mins.

Are there any side effects with IV iron?

Generally, like all medicines IV iron may cause side effects although these are not common. When side effects do occur, they are mild and settle down on their own.

Common side effects:

- Headache, feeling sick or vomiting, muscle or joint pain.
- Changes in taste (e.g. Metallic), which disappears within 15 minutes of taking injection.
- Changes in blood pressure or pulse. These are normally self-limiting, the nurse may stop the infusion for several minutes and restart it more slowly over 30 minutes.



Uncommon side effects

- Although very uncommon, some people may have a serious allergic reaction. If you experience a rash (e.g. raised red, itchy bumps), itching, breathing difficulty, wheezing, swelling of (lips, tongue, throat or body), inform the nurse or doctor immediately. In rare cases this can be life threatening. You will be closely monitored while IV iron is given, and for 30 minutes after.
- Post infusion side effects (e.g. headache, muscle or joint pain) can start 1 to 2 days later. Mostly they will settle down by themselves over the next couple of days. If they worry you or interfere with your daily activities contact your physician.
- Skin staining (brown discoloration) may occur due to leakage of iron into the tissues around the needle (drip) site. This is not common but the stain can be long lasting or permanent. Inform the doctor or nurse straight away of any discomfort, burning, redness or swelling at the needle (drip) site.

What to tell your Doctor?

Inform the Doctor if you:

- Are pregnant / trying to get pregnant. IV iron should be avoided in the first trimester.
- Have a history of asthma, eczema or other allergies.
- Have had a reaction to any type of iron injection or infusion in the past.
- Have a history of high iron levels, haemochromatosis or liver problems.
- Are on any medications (including herbal and over the counter medicines).
- Have any acute or chronic infection at the moment.

What to ask your Doctor

- Why do I need IV iron?
- What are the other options?
- About how long will the iron infusion take?
- How many iron infusions will I need to get enough iron?
- (If you are taking iron tablets at the moment), When do I stop taking iron tablets and will I need to use them again?
- How long will it take for the iron to work?
- Any questions about any side effects that may worry you?



What happens on the day?

There is nothing special that you need to do to get ready for the day of iron infusion (e.g. no need to fast). Unless you have an unexpected reaction, you will be able to drive home and do your normal activities. Before leaving the hospital, ensure that you have:

- The number to contact if you have any worries or question (2536 0000).
- The dates for any follow up tests and/or appointments.

Iron tablets should be stopped for a week after an iron infusion because the iron in them will not be absorbed by the body. If you are having more than one iron infusion then stop the iron tablets during the course of treatment as well. They are often not needed after IV iron infusions (especially after a 'total dose' is given): Check with your doctor if & when iron tablets need to be started.



معلومات للمريض حول حقن الحديد الوريدي

نموذج إجابات على بعض الأسئلة الشائعة حول حقن الحديد الوريدي. تأكد من قراءة المعلومات أدناه ومناقشتها مع طبيبك قبل التوقيع على الموافقة لأخذ حقن الحديد الوريدي.

ما هو حقن الحديد الوريدي؟

"وريدي" يعني إعطاء شيء ما مباشرة في مجرى الدم في الجسم عن طريق الوريد. عندما تنخفض كمية الحديد في الجسم بشكل كبير، ينخفض مستوى الهيموجلوبين عن المعدل الطبيعي. يُعرف هذا باسم "فقر الدم بسبب نقص الحديد". يعتبر الهيموجلوبين مهمًا جدًا لأنه يحمل الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم. إذا كانت مستويات الهيموجلوبين أو الحديد لديك منخفضة، فقد يجعلك ذلك تشعر بالتعب وعدم القدرة على أداء نشاطك المعتاد.

لماذا تحتاج للحديد الوريدي؟

الطريقة الأكثر شيوعًا لعلاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد هي تناول الحديد عن طريق الفم على شكل أقراص أو سائل. يعمل هذا بشكل جيد مع معظم الأشخاص وعادة ما يتم تجربته أولاً.

قد تكون هناك حاجة إلى الحديد الوريدي إذا كنت:

- غير قادر على تحمل أقراص الحديد أو السائل (الحديد عبر الفم).
- عدم الاستجابة لأقراص / سائل الحديد (بسبب مشاكل صحية مزمنة مثلاً).
- عدم القدرة على امتصاص الحديد من خلال الجهاز الهضمي.
- عدم القدرة على امتصاص ما يكفي من الحديد بسبب كمية الدم التي يفقدها الجسم.
- الحاجة إلى زيادة سريعة في مستويات الحديد للمساعدة في تجنب المضاعفات الخطيرة أو نقل الدم (مثل، قبل أو بعد الجراحة الكبرى، فقر الدم شديد في أواخر الحمل أو بعد الولادة).
- مرض مزمن في الكلى أو قصور في القلب

ما هي الجرعة التي سأحصل عليها؟

سيتم قياس وزنك وإجراء فحص دم قبل أخذ حقن الحديد الوريدي. سيتم حساب وزنك ومستوى الهيموجلوبين لحساب الجرعة الصحيحة لحقن الحديد. للحصول على الجرعة الصحيحة، قد تحتاج إلى الحصول على أكثر من حقنة واحدة بناءً على طلب الطبيب. سيتم إعادة فحصك من قبل الطبيب بعد حوالي أربعة إلى ستة أسابيع من إعطاء الجرعة الكاملة.

كيف يعطى الحديد؟

يُعطى عادةً عن طريق مصل وريدي بطيء في (الذراع أو اليد) لمدة ٣٠-١٥ دقيقة

هل هناك أي آثار جانبية للحديد الوريدي؟

بشكل عام، كمثّل جميع الأدوية على الرغم من أنها ليست شائعة، قد يسبب الحديد الوريدي آثارًا جانبية طفيفة وتستقر من تلقاء نفسها.

الأعراض الجانبية الشائعة:

- صداع، الشعور بالغثيان أو القيء، آلام في العضلات أو المفاصل.
- تغيرات في المذاق (مثل المعدن)، والتي تختفي خلال ١٥ دقيقة من أخذ الحقنة.
- تغيرات في ضغط الدم أو النبض. هذه عادة ما تكون ذاتية التحديد، فقد توقف الممرضة المحلول الوريدي لعدة دقائق وتعيد تشغيله ببطء أكثر خلال ٣٠ دقيقة.



أعراض جانبية غير شائعة

- بالرغم من أنه نادر الحدوث ، قد يعاني بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي خطير. إذا كنت تعاني من طفح جلدي (على سبيل المثال ، نتوءات حمراء بارزة ، مثيرة للحكة) ، حكة ، صعوبة في التنفس ، صفير ، إنتفاخ (الشفيتين ، اللسان ، الحلق أو الجسم) ، يجب إبلاغ الممرضة أو الطبيب على الفور. في حالات نادرة ، قد يكون هذا مهددًا للحياة. ستتم مراقبتك عن كثب أثناء إعطاء الحديد الوريدي ولمدة ٣٠ دقيقة بعد ذلك.
- يمكن أن تبدأ الآثار الجانبية بعد المحلول الوريدي (مثل الصداع أو آلام العضلات أو المفاصل) بعد يوم إلى يومين. في الغالب تستقر هذه الآثار تلقائيًا خلال اليومين المقبلين. اتصل بطبيبك إن كانت الآثار تسبب لك القلق أو تؤثر على أنشطتك اليومية.
- قد يحدث تلون للجلد (تلون بني) بسبب المحلول الحديد الوريدي إلى الأنسجة حول موقع الإبرة أو أماكن أخرى من الجسم. هذا ليس شائعًا ولكن البقعة يمكن أن تكون طويلة الأمد أو دائمة. أخبر الطبيب أو الممرضة على الفور بأي إزعاج أو حرق أو احمرار أو تورم في موقع الإبرة.

ماذا يجب أن تخبر به طبيبك؟

يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت:

- حامل / تحاولين الحمل. يجب تجنب الحديد الوريدي في الأشهر الثلاثة الأولى.
- إذا كان لديك تاريخ من الإصابة بالربو أو الأكزيما أو الحساسية الأخرى.
- إذا كنت عانيت سابقا من رد فعل تجاه أي نوع من حقن الحديد أو الحقن الوريدية.
- إذا كان لديك تاريخ من ارتفاع مستويات الحديد ، داء ترسب الأصبغة الدموية أو مشاكل في الكبد.
- إذا كنت تتناول أي أدوية (بما في ذلك الأدوية العشبية والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية).
- إذا كنت مصابا بعدوى حادة أو مزمنة في الوقت الحالي.

ماذا تسأل طبيبك

- لماذا أحتاج للحديد الوريدي؟
- ما هي الخيارات الأخرى؟
- كم من الوقت سيستغرق العلاج؟
- ماهي عدد جرعات الحديد التي سأحتاجها؟
- متى أتوقف عن تناول أقراص الحديد وهل سأحتاج إلى استخدامها مرة أخرى؟
- ما هي المدة التي يستغرقها العلاج كي أرى نتيجة ايجابية؟
- أي أسئلة حول أي آثار جانبية قد تقلقك.

يوم العلاج

لا إجراءات خاصة (على سبيل المثال يفضل عدم الصيام). إذا لم يحدث رد فعل غير متوقع بعد العلاج، ستتمكن من القيادة إلى المنزل والقيام بأنشطتك العادية.

بعد مغادرة المستشفى، تأكد من أن لديك:

- الرقم 2536 0000 الذي يجب الاتصال به إذا كان لديك أي مخاوف أو أسئلة.
- موعد مراجعة الطبيب والفحص القادم.

إذا كنت تتعالج بأكثر من علاج للحديد وبدأت العلاج بحقن الحديد الوريدي يجب إيقاف أقراص الحديد لمدة أسبوع، لن يكون لها حاجة بعد الحقن وغالبًا لن يكون الجسم قادرًا على امتصاص الحديد الموجود بها خلال هذه الفترة. استشر طبيبك إذا ومتى تحتاج للبدء بتناول أقراص الحديد

