




Umbilical Cord Care

Dos and Don'ts for Parents

A newborn's umbilical cord stump typically falls off within two weeks after birth. In the meantime, treat your baby's umbilical cord stump gently.

Why your baby has an umbilical cord stump?

During pregnancy, the umbilical cord supplies nutrients and oxygen to your developing baby. After birth, the umbilical cord is no longer needed - so it's clamped and snipped. This leaves behind a short stump.



Taking care of the stump

Keep the stump dry. Clean the umbilical stump when it becomes sticky or dirty with a swab using plain water after every diaper change. Expose the stump to air to help dry out the base.



Promote proper healing. Make sure the diaper is folded down properly to keep the stump exposed. Do not cover the umbilical cord stump with bandages or cloth that will restrict airflow.



Let the stump fall off on its own. Allow the stump to fall by itself. Never pull on the stump in an attempt to remove it.



Signs of a problem

- During the healing process, it's normal to see a little blood near the stump.
- Contact your Pediatrician / Neonatologist if the umbilical area oozes pus, the surrounding skin becomes red and swollen, or the area develops a pink moist bump. These could be signs of an infection. A prompt treatment is needed to stop the infection from spreading.
- Talk to your Pediatrician / Neonatologist if the stump still hasn't separated after three weeks.



دليل الوالدين حول رعاية الحبل السري للمولود



يسقط الحبل السري لحديثي الولادة عادةً في غضون أسبوعين بعد الولادة. في هذه الأثناء،
عالج الحبل السري لطفلك بلطف.



لماذا يوجد عند طفلك الحبل السري؟ خلال فترة الحمل، يزود الحبل السري
طفلك بالمغذيات والأكسجين. بعد الولادة، لاتعود هناك حاجة إلى الحبل
السري - لذلك يتم تثبيته وقصه مما يترك خلفه حبل قصير.

رعاية الحبل السري للمولود



حافظ على جفاف الحبل. قم بتنظيف الحبل السري عندما يصبح لزجًا أو
متسخًا بالماء بعد كل تغيير للحفاض. قم بتعريض الحبل السري للهواء
للمساعدة على تجفيف القاعدة.



يجب أن يتعرض الحبل السري للهواء الطلق قدر الإمكان.
تأكد من طي الحفاض إلى الأسفل ليكون الحبل السري
مكشوفًا. لا تغط الحبل السري بالضمادات أو أي شيء
يمنع تعرضه للهواء.



إسمح للحبل السري أن يسقط من تلقاء نفسه. لا تسحبه أبدًا لمحاولة إزالته.

علامات المضاعفات

- أثناء عملية إلتئام الحبل السري، من الطبيعي رؤية القليل من الدم بالقرب من قاعدة الحبل السري.
- إتصل بطبيب طفلك إذا كانت المنطقة السرية تفرز صديدًا، أو إن أصبح الجلد المحيط أحمر ومنتفخًا، أو إن
ظهر في المنطقة نتوء رطب ووردي. يمكن أن تكون هذه علامات لإلتهاب الحبل السري والتي بحاجة إلى
علاج سريع لوقف إنتشار الإلتهاب.
- تحدث مع طبيب طفلك إذا لم ينفصل الحبل السري بعد مرور ثلاثة أسابيع.

