

# Discharge Instructions For Postpartum Patients

## 1. What to Expect At Home

Full recovery after a Cesarean or a normal delivery can take time. It is important to take care of yourself for your own sake and for your newborn. Do not hesitate to ask for help from others during the first few weeks. Here are some guidelines to follow at home:

- You may have vaginal bleeding for up to 6 weeks. The color will usually be dark red for the first 48 hours; then light red from days 3-7 after birth. It is white colored by the 12th day after birth. Your flow will be heavy for the first 2 days. It is normal to see several small clots.
- You may urinate more than usual on the second and third days after birth. This is normal and it's important to drink a lots of fluid.
- Expect a normal bowel movement by 3rd or 4th day after delivery. Take stool softeners as directed by your doctor. Two tablespoons of milk of Magnesia may be taken if you have no bowel movement by your 3rd or 4th day after delivery.
- Any pain should decrease after 2 to 3 days but the incision after a cesarean will remain tender for up to 3 weeks or more. You will need a checkup in 4 to 6 weeks.
- Your body is not ready to resume sexual intercourse again until you have physically recovered from your delivery. Recovery is usually complete when your vaginal discharge disappears. Do not have sexual intercourse until after you have had a checkup.

## 2. Activity

- Get lots of rest. Take naps in the afternoon.
- Increase your activities bit by bit.
- Plan your activities so that you do not have to go up and down stairs more than needed.
- Do postsurgical deep breathing and coughing exercises. Ask your healthcare provider for instructions.
- Do not lift anything heavier than your baby or drive until your healthcare provider approves.
- Ensure a smoke free environment for you and for the newborn as it has far reaching consequences.

## 3. Nutrition

- All mothers have increase nutritional needs after delivery, especially if they are breastfeeding.
- Be sure to drink plenty of fluids and to eat foods with high in protein, vitamin C, and iron. Right food plays an important role in healing and preventing infection. Include foods in your diet such as fruits and vegetables, bran, and whole grain breads and cereals.
- Continue to take your personal vitamins and iron tablets as ordered by your doctor.



## 4. Breast and Nipple Care

### For Nursing Mothers:

Breast fullness and tenderness is a normal process that usually begins approximately 48 hours after delivery. Listed below are some comfort measures that you can take:

- Wear a firm, supportive bra 24 hours a day.
- Expose your nipples to the air whenever you can.
- Feed your baby frequently using both breasts at each feeding.
- If you are engorged, take a warm shower or apply warm, moist towels to your breasts just before feeding.
- Manually express some colostrum or milk from your breasts before putting the baby to your breast.
- Be sure the baby takes the whole nipple and areolar areas into his/her mouth.
- Be sure to break the suction of the baby's mouth on your nipple with your little finger before pulling the baby off your breast.
- Don't use soap on your nipples!
- If you are given and using contact nipple shields, you must pump at least 6 times a day/ 15 minutes on each breast. Seek follow-up with your lactation consultant.

### For Non-nursing Mothers:

Non-nursing mothers may also become engorged. The following will help to decrease any discomfort that you may feel:

- Avoid any unnecessary handling or massaging of the breasts.
- If your breasts become full and painful, apply ice bags to your breasts for twenty minutes intervals. Crushed or cracked ice in plastic bags works well.

## 5. Perineal Care

After a normal delivery, you may or may not have stitches from an episiotomy. Listed below are steps you can take to prevent infection and to increase your comfort after a vaginal delivery.

- Cleanse the perineal area from front to back each time you urinate or have a bowel movement. You may continue to use the peri-bottle that you used in the hospital. Apply a clean peri-pad each time you use the bathroom.
- Apply medication to your perineal area as ordered by your doctor.
- Enjoy a warm sitz bath several times a day for comfort and to promote healing. It feels great.
- Sutures will dissolve in 2-3 weeks.

## 6. Incision Care for Cesarean Cases

- Keep the wound area clean by washing it with mild soap and water. Shower as needed but do not scrub the area. Pat your incision dry.
- Watch your incision for signs of infection, like more redness or drainage.
- Hold a pillow against the incision when you laugh or cough and when you get up from a lying or sitting position.
- Remember, it can take as long as 6 weeks for your incision to heal.

## 7. Postpartum Blues

The transition to motherhood can trigger a mixture of powerful emotions, from excitement and joy to stress and anxiety. Many new moms experience postpartum blues after childbirth, which may include:

- Fatigue.
- Sleep disturbances.
- Stress.
- Anxiety.
- Mood swings.

These emotions usually subside after about two weeks as mother and baby adjust to each other. As many as one in 10 women experience a more severe form of emotional distress known as postpartum depression.



## 8. Postpartum Depression

Postpartum depression isn't a character flaw or a weakness, and women who experience it are not alone. Highly effective treatments are readily available. If you ever have thoughts of harming yourself or your baby, please contact your doctor immediately. If you have postpartum depression, prompt treatment can help you manage your symptoms and enjoy your life. Some of the symptoms include:

- Marked changes in sleep.
- Lack of appetite.
- Reduced energy levels.
- Feeling of sadness.
- Hopelessness.
- Isolation.
- Anxiety.

## 9. When to Call Your Doctor

Call your healthcare provider right away if you experience any of these:

- Fever of 38°C or higher.
- Redness, pain, or drainage at your incision site.
- Bleeding that requires a new sanitary pad every hour.
- Severe pain in the abdomen.
- Pain or urgency with urination.
- Foul odor from vaginal discharge.
- Trouble urinating or emptying your bladder.
- No bowel movement within 1 week after the birth of your baby.
- Swollen, red, painful area in the leg.
- Appearance of rash or hives.
- Sore, red, painful area on the breasts that may come with flu-like symptoms.
- Feelings of anxiety, panic, and/or depression.



# تعليمات للأمهات لما بعد الولادة

## ١. ما يمكن توقعه بعد خروجك من المستشفى

قد يستغرق الشفاء وقتاً بعد الولادة القيصرية أو الولادة الطبيعية. من المهم أن تعتني بنفسك لمصلحتك ولصالح مولودك الجديد. لا تترددي في طلب المساعدة من الآخرين خلال الأسابيع القليلة الأولى. إليك بعض الإرشادات التي يجب إتباعها في المنزل:

• قد تعانيين من نزيف مهبطي لمدة تصل إلى ستة أسابيع. عادة ما يكون اللون أحمر داكن خلال الـ ٤٨ ساعة الأولى؛ ثم أحمر فاتح من ثلاثة إلى سبعة أيام بعد الولادة وأبيض بحلول اليوم الثاني عشر بعد الولادة. سيكون تدفق الدم غزيراً في أول يومين. من الطبيعي رؤية عدة جلطات صغيرة.

• من الطبيعي التبول أكثر من المعتاد في اليومين الثاني والثالث بعد الولادة. من المهم شرب الكثير من السوائل.

• من المتوقع بأن حركة أمعاء تصبح طبيعية في اليومين الثالث أو الرابع بعد الولادة. تناولي مليناً الأمعاء حسب توجيهات الطبيب. إذا لم تتحرك أمعاءك بحلول اليوم الثالث أو الرابع بعد الولادة يمكنك تناول ملعقتين كبيرتين من حليب المغنيسيا.

• يجب أن يقل أي ألم بعد يومين إلى ثلاثة أيام، يظل شق العملية القيصرية طرياً لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع أو أكثر. يجب مراجعة طبيبك النسائي خلال أربعة إلى ستة أسابيع.

• يمكن إستئناف الجماع عند تعافي جسمك كلياً عادة عند إختفاء الإفرازات المهبلية وبعد إجراء الفحص النسائي.

## ٢. النشاط

- تناولي قسطاً من الراحة.
- خذي قيلولة في فترة ما بعد الظهر.
- زيدي من أنشطتك تدريجياً.
- خططي سابقاً لأنشطتك لتفادي صعود ونزول السلالم كثيراً.
- قومي بإجراء تمارين التنفس العميق والسعال بعد الجراحة. إسأل طبيبك عن التعليمات.
- لا ترفع أي شيء أثقل من طفلك. قيادة السيارة ممنوعة إلى أن يصرح لك طبيبك بذلك.
- إحرصي على توفير بيئة خالية من التدخين لك وللمولود حيث أن لها عواقب بعيدة المدى.

## ٣. التغذية

- تزداد الاحتياجات الغذائية للأمهات بعد الولادة، خاصة أثناء الرضاعة.
- إحرصي على شرب الكثير من السوائل وتناول الأطعمة الغنية بالبروتين وفيتامين ج والحديد. يلعب الطعام الصحي دوراً مهماً في الشفاء والوقاية من العدوى. أدخل في نظامك الغذائي الفاكهه والخضروات والنخالة والبقوليات وخبز الحبوب الكاملة.
- إستمري في تناول الفيتامينات وأقراص الحديد حسب إرشادات الطبيب.



## ٤. العناية بالثدي وحلمة الثدي

### للأمهات المرضعات:

- إمتلاء الثدي والألم الناتج طبيعي ويبدأ عادةً بعد ٤٨ ساعة من الولادة. إليك بعض تدابير الراحة التي يمكنك اتباعها:
- ارتدي حمالة صدر داعمة ٢٤ ساعة في اليوم.
- عرضي حلمتي ثديك للهواء كلما استطعت.
- أرضعي طفلك من كلا الثديين في كل رضة.
- عند احتقان الثديين ، استحمي بماء دافئ أو ضعي مناشف دافئة ورطبة على ثدييك قبل الرضاعة مباشرة.
- إسحبي بعض اللبأ / الحليب من ثدييك يدويًا قبل وضع الطفل على ثديك.
- تأكدي من أن الطفل يأخذ الحلمة بالكامل وبأن منطقة الهالة في فمه.
- إضغطي الحلمة بإصبعك للخارج قبل سحب الطفل عن الثدي.
- لا تستخدم الصابون على الحلمتين!
- إذا تم إعطاؤك أو كنت تستخدمين واقيات الحلمة، يجب عليك ضخ ما لا يقل عن ست مرات في اليوم / خمسة عشر دقيقة من كل ثدي. تابعي واستشيري خبيرة الرضاعة.

### للأمهات الغير المرضعات:

- قد يحتقن الثديين أيضًا عند الأمهات الغير المرضعات. سيساعدك ما يلي من تقليل أي إزعاج قد تشعرين به:
- تجنب ملامسة الثدي.
- إذا امتلأ ثدييك وشعرت بالألم ، ضعي أكياس من الثلج على ثدييك لمدة عشرين دقيقة. قطع الثلج أو الثلج المجروش في الأكياس البلاستيكية فعال في مثل هذه الحالة.

## ٥. العناية بعد الولادة

- بعد الولادة الطبيعية ، قد يكون لديك بعض الغرز المهبلية. إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لمنع العدوى ولزيادة راحتك بعد الولادة الطبيعية:
- تنظيف منطقة العجان من الأمام إلى الخلف بعد كل تبول أو تبرز. يمكنك الاستمرار في استخدام الزجاجة التي استخدمتها في المستشفى. ضعي وسادة نظيفة في كل مرة تستخدمين فيها الحمام.
- ضعي الدواء على منطقة العجان حسب إرشادات الطبيب.
- استمتعي بحمام المقعدة الدافئ عدة مرات في اليوم للشعور بالراحة ولتعزيز الشفاء.
- ستدوب الخيوط الجراحية في غضون اثنان إلى ثلاثة أسابيع.

## ٦. العناية بعد الولادة القيصرية

- حافظي على نظافة منطقة الجرح بغسلها بالماء والصابون المعتدل. استحمي حسب الحاجة. لا تفركي المنطقة وجففيها بالتريبت.
- راقبي الشق بحثًا عن علامات العدوى ، مثل تزايد الاحمرار أو وجود إفرازات.
- ضعي وسادة على الجرح عند الضحك أو السعال وعند النهوض من وضعية الاستلقاء أو الجلوس.
- تذكرتي، قد يستغرق التأم الجرح ستة أسابيع.

## ٧. الكآبة النفاسية

- ممكن أن تؤدي الأمومة إلى مزيج من المشاعر القوية ، تتراوح بين الإثارة والفرح إلى التوتر والقلق. تعاني العديد من الأمهات الجدد من اكتئاب ما بعد الولادة ، والذي قد يشمل:
- إعياء.
- اضطرابات في النوم.
- ضغط عصبي.
- قلق.
- تقلب المزاج.
- عادة ما تهدأ هذه المشاعر بعد حوالي أسبوعين حيث تتكيف الأم والطفل مع بعضهما البعض. تعاني واحدة من كل عشرة نساء بضيق نفسي أكثر حدة و المعروف باسم اكتئاب ما بعد الولادة.



## ٨. اكتئاب ما بعد الولادة

لا يعتبر اكتئاب ما بعد الولادة عيبًا في الشخصية أو ضعفًا ، والنساء اللواتي يعانين منه لسن وحدهن. العلاجات الفعالة متاحة. إذا راودتك أي أفكار بإيذاء نفسك أو طفلك، يرجى الاتصال بطبيبك على الفور. إذا كنت مصابة باكتئاب ما بعد الولادة، يمكن أن يساعدك العلاج الفوري في إدارة الأعراض والاستمتاع بحياتك. تشمل بعض الأعراض ما يلي:

- تغييرات ملحوظة في النوم.
- قلة الشهية.
- انخفاض مستويات الطاقة.
- الشعور بالحزن.
- اليأس.
- العزلة.
- القلق.

## ٩. متى تتصلين بطبيبك؟

اتصلي بطبيبك على الفور إذا واجهت أيًا مما يلي:

- حمى تصل إلى ٣٨ درجة مئوية أو أعلى.
- إحممرار أو ألم أو نزيف في موضع الجرح.
- نزيف الذي يتطلب فوطية صحية جديدة كل ساعة.
- ألم شديد في البطن.
- ألم أو حاجة ملحة للتبول.
- صعوبة التبول أو إفراغ المثانة.
- رائحة كريهة من الإفرازات المهبلية.
- عدم وجود حركة للأمعاء خلال أسبوع واحد بعد ولادة طفلك.
- منطقة منتفخة وحمراء ومؤلمة في الساق.
- ظهور طفح جلدي.
- منطقة مؤلمة وحمراء على الثدي قد تصاحبها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا.
- مشاعر القلق والذعر و / أو الاكتئاب.

