

Im Folgenden sei (Ω, \mathcal{A}, P) ein Wahrscheinlichkeitsraum und $X \in L^1(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Definition 1. Sei $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}$ eine σ -Algebra. Eine Zufallsvariable Y heißt bedingte Erwartung von X gegeben \mathcal{F} , symbolisch $E[X|\mathcal{F}] := Y$, falls gilt:

- i) Y ist \mathcal{F} -messbar.
- ii) Für jedes $A \in \mathcal{F}$ gilt $E[X\mathbb{1}_A] = E[Y\mathbb{1}_A]$

B7A1 Zeigen Sie, $E[X, \mathcal{F}]$ existiert und ist eindeutig (bis auf Gleichheit fast sicher). Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- i) Eindeutigkeit: Nehmen Sie an, dass Y und Y' Definition 1 erfüllen und betrachten Sie die Menge $A := \{Y - Y' > 0\}$.
- ii) Existenz: Definieren Sie das Maß Q^+ auf (Ω, \mathcal{F}) durch $Q^+[A] := E[\mathbb{1}_A X^+]$ und analog Q^- . Konstruieren Sie nun die bedingte Erwartung mit dem Satz von Radon–Nikodym.

B7A2 Welche der folgenden Teilmengen des Raumes der reellen Folgen

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} = \prod_{i \in \mathbb{N}} \mathbb{R}$$

sind messbar bezüglich $\mathcal{B}^{\mathbb{N}} := \bigotimes_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{B}(\mathbb{R})$?

$$(a) \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n > 3 \right\}$$

$$(b) \left\{ (x_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum_{k=1}^n \right\}$$

B7A3

B7A4