

Satz 6 Hier haben wir verschiedene Ungleichungen Für Wahrscheinlichkeiten, Erwartungswerte und \mathcal{L}^p -Normen zu Verfügung. Seien X, Y reellwertige Zufallsvariable. Dann gilt folgendes.

(i) Die *Markov-Ungleichung* – Sei $f: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$ monoton wachsend, $\varepsilon > 0$ so, dass $f(\varepsilon) > 0$. Dann gilt

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E[f(X)]}{f(\varepsilon)}.$$

(ii) Die *Tschebyscheff-Ungleichung* – ist $E[X^2] < \infty$, so gilt

$$P(|X - E[X]| > \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

(iii) Die *Hölder-Ungleichung* – Für $0 < p, q, r \leq \infty$ so, dass $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$ gilt

$$\|XY\|_r \leq \|X\|_p \|Y\|_q.$$

iv Die *Minkowski-Ungleichung* – für $1 \leq p \leq \infty$ gilt

$$\|X + Y\|_p \leq \|X\|_p + \|Y\|_p.$$

(v) Das Analogon der Minkowski-Ungleichung im konkaven Fall – für $0 < p < 1$ gilt

$$E[|X + Y|^p] \leq E[|X|^p] + E[|Y|^p].$$

(vi) Eine Abschätzung Normen verschiedener \mathcal{L}^p -Räume. Für $p \leq q$ und $X \in \mathcal{L}^q$ gilt

$$\|X\|_p \leq \|X\|_q.$$

Satz 8 Die *Jensen-Ungleichung* – sei $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ konvex und $X \in \mathcal{L}^1$, dann gilt

$$E[g(X)] \geq g(E[X]).$$

B4A1.1 Haben $X_1(\omega) = \omega$ und $X_2(\omega) = 1 - \omega$ die gleiche Verteilung auf $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda|_{[0, 1]})$?

B4A1.2 Gibt es ein Wahrscheinlichkeitsmaß P auf $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]))$, so dass $X_1(\omega) = \omega$ und $X_2(\omega) = 1 - \omega$ nicht die gleiche Verteilung haben?

B4A1.3 Wenn $X \sim \mathcal{N}(2, 2)$ verteilt ist, gilt $P[|X - 2| \geq 2] \leq \frac{1}{2}$.

B4A1.4 Jedes $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ messbar hat eine Dichte bezüglich λ .

B4A1.5 Auf $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ sind alle Abbildungen $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega)) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ messbar.

B4A1.6 Für $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ und $Y \sim \mathcal{N}(0, 2)$ gilt $E[XY] \leq \sqrt{2}$.

B4A1.7 \mathbb{N} -wertige Zufallsvariable X zu sich selbst unabhängig gilt genau dann, wenn X fast sicher konstant ist.

B4A1.8 Es gilt $E[\mathbb{1}_A \mathbb{1}_B] = E[\mathbb{1}_A]E[\mathbb{1}_B]$ genau dann, wenn A und B unabhängig sind.

B4A1.9 Für X exponentialverteilt mit $\lambda = 1$ gilt $E[X^4] \geq E[X]^4$.

B4A1.10 Gilt $\mu(A) = 0$ genau dann, wenn $\nu(A) = 0$, dann gibt es ein messbares f , sodass $\mu(A) = \int_A f(\omega) \nu(d\omega)$.

B4A1.11 Auf $(\omega, \{\Omega, \emptyset\})$ gibt es keine Borel-messbare Abbildung.

B4A1.12 Seien $X \sim \text{Exp}(6)$ und $Y \sim \text{Exp}(\frac{1}{3})$, dann gilt $E[XY] \leq 1$, wobei für $Z \sim \text{Exp}(\lambda)$ gilt $E[Z] = \frac{1}{\lambda}$ und $E[Z^2] = \frac{2}{\lambda^2}$.

B4A1.13 Ist $q \leq p$ und $X \in L^p(\Omega, \mathcal{F}, P)$, so ist $X \in L^q(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

B4A2 Seien (X_n) Zufallsvariablen sodass $X_1 = 0$ und $X_n = \sqrt{n} \mathbb{1}_{(\frac{1}{n}, \frac{2}{n})}$ auf $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), \lambda|_{[0, 1]})$.

B4A2.1 (X_n) konvergiert in Wahrscheinlichkeit.

B4A2.2 (X_n) konvergiert fast sicher.

B4A2.3 (X_n) konvergiert in L_2 .

B4A2.4 (X_n) ist gleichgradig integrierbar.

B4A3 Seien (X_n) Zufallsvariablen, sodass $X_n(\omega) = \omega^{\frac{1}{n}}$ auf $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), P)$, wobei $P \ll \lambda|_{[0,1]}$ mit Dichte $f(\omega) = \frac{1}{2}\omega^{-\frac{1}{2}}$.

B4A2.1 (X_n) konvergiert in Wahrscheinlichkeit.

B4A2.2 (X_n) konvergiert fast sicher.

B4A2.3 (X_n) konvergiert in L_1 .

B4A2.4 (X_n) ist gleichgradig integrierbar.

Literatur