
1.b izpit iz Moderne fizike 1

25. januar 2021

čas reševanja 90 minut

- 1. Molekulo NaCl obravnavamo kot iona Na $^+$ in Cl $^-$ na razdalji a=0,25 nm. Molekulo vzbudimo v rotacijsko vzbujeno stanje z l=1 in m=0. Kolikšen je povprečni življenjski čas, preden zaradi dipolnega prehoda preide v osnovno stanje? Kolikšna je energija pri prehodu izsevanega fotona? Relativna masa Na je 23, Cl pa 35.
- 2. Na plasteh molekul sipamo curek elektronov z energijo E in merimo prepustnost. Pri vzorcu 1 lahko merimo le pri nizkih energijah in ugotovimo, da prepustnost linearno narašča z energijo, in sicer T=aE, kjer je $a=0.10/\mathrm{eV}$. Vzorce 2, ki je nekajkrat debelejši, pa dopušča tudi meritve visokih energij, glej sliko obeh meritev. Vzorca obravnavaj kot potencialni plasti in s pomočjo podane slike določi, koliko znaša potencial plasti in kako debela je plast pri vzorcu 1.



- 3. Rotator je v stanju l=1 kot kombinacija stanj z m=0 in 1. Izmerjeni povprečni kvadrat vrtilne količine je $9/5\,\hbar^2$, povprečna projekcija vrtilne količine na os y je $3/(10\sqrt{2})\,\hbar$. Določi verjetnost, da pri meritvi projekcije na os z izmerimo vrednost nič. Napovej povprečno vrednost projekcij na os x in z. Namig: $\int Y_{l'm'}^* \hat{l}_{x,y} Y_{lm} = \{1, \pm 1/i\}_{x,y} \hbar/2\sqrt{l(l+1)-m(m\pm 1)}\delta_{l'l}\delta_{m'm+1}$.
- 4. Ion helija He⁺ postavimo v magnetno polje in natančno merimo energijske nivoje. Kolikšen je popravek zaradi sklopitve ls $\Delta E_{ls} = Z^2 \alpha \hbar c/(2m_e^2 c^2) \langle r^{-3} \rangle \langle ls \rangle$ v stanju n=3, l=2 ter poljubnim m_l ? Skiciraj razcepe in število stanj pri B=0 in v močnem B. Pomagaš si lahko z valovno funkcijo za vodik: $\psi_{320} = 1/(81\sqrt{6\pi}r_B^{3/2}) \left(r/r_B\right)^2 \left(3\cos^2\theta 1\right) e^{-r/(3r_B)}$, $r_B = \hbar c/(\alpha m_e c^2)$.