Модель MEML 75:

Матрицы масс кварков и лептонов из геометрии $T^2/\mathbb{Z}_3$ с аксионоподобной (ALP) темной материей

Д. В. Юров

2026

Аннотация

Мы представляем модель MEML 75, которая параметризует фермионный сектор Стандартной модели через геометрию шестимерного орбифолда $T^2/\mathbb{Z}_3$ с тремя независимыми торами. Модель фитирует **13 фермионных наблюдаемых** (9 кварков + 4 лептона) с помощью **16 свободных параметров** ($N_{\text{dof}} = 13 - 16 = -3$).

Главное проверяемое предсказание: аксионоподобная темная материя с $f_a = 1.9801 \times 10^{11}$ ГэВ, $m_a = 28.407$ мкэВ, $\nu_a = 6.8688$ ГГц и ALP-фотонной связью $g_{a\gamma\gamma} = +4.38 \times 10^{-15}$ ГэВ$^{-1}$ (DFSZ) или -1.13×10^{-14} ГэВ$^{-1}$ (KSVZ), проверяемая в ADMX/HAYSTAC (0.5–10 ГГц).

Кварковый сектор. Глобальный фит с функцией потерь $\chi^2 = \sum_i ((O_i - O_i^{\text{target}})/\sigma_i)^2$ дает $\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20}$ при $\tau_u = -0.1577944085 + 2.3851782590\,i$, $\tau_d = +0.3693905617 + 1.5410496057\,i$.

Лептонный сектор. Используя третий тор τ_l, комбинация A_4 модулярных форм $Y^{(2)}$ и $Y^{(4)}$ дает $\chi^2 < 10^{-16}$ для наблюдаемых PMNS при $\tau_l = 0.385257 + 0.958275\,i$. Модель предсказывает $\theta_{12} = 33.41^\circ$, $\theta_{13} = 8.54^\circ$, $\theta_{23} = 49.10^\circ$ и $J_{cp} = -0.018$.

Вердикт: модель *феноменологическая*. Она интерполирует наблюдения фермионов с высокой точностью.

1. Введение

Модулярные модели масс фермионов [4, 5] строят иерархию масс и смешивание из геометрии компактификации. В модели MEML 75 кварки и лептоны локализованы на трех независимых торах $T^2/\mathbb{Z}_3$ с модулями τ_u, τ_d и τ_l. Матрицы масс строятся из A_4 модулярных форм весов $(2, 4, 6)$.

2. Геометрия $T^2/\mathbb{Z}_3$

Орбифолд $T^2/\mathbb{Z}_3$ определяется как:

$$z = x + \tau y, \quad ds^2 = dx^2 + dx\,dy + dy^2, \tag{2.1}$$

где $\tau = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$. Действие Z_3 $z \to \omega z$ (где $\omega = e^{2\pi i/3}$) имеет три неподвижные точки, что дает топологическое объяснение трем поколениям.

3. Объемная связь α_G (постулат)

$$\alpha_G = \frac{2}{3\pi} = 0.2122065908. \tag{3.1}$$

Геометрическая мотивация: $2/3$ — доля объема фундаментальной области $\mathbb{Z}_3$-орбифолда; $1/\pi$ — нормировка периода тэта-функции.

4. Фактор подавления ε (анзац)

$$\varepsilon = \left(\frac{\alpha_G}{4\pi}\right)^2 = \frac{1}{36\pi^4} = 2.851662 \times 10^{-4}. \tag{4.1}$$

5. Условно выведенные величины

$$m_{KK} = \frac{M_{Pl}^{\text{red}}}{\sqrt{\mathcal{I}}\, e^{\pi^2}} = 2.0838 \times 10^{14}\ \text{ГэВ}, \tag{5.1}$$

$$M_6 = \left(3(M_{Pl}^{\text{red}})^2 m_{KK}^2\right)^{1/4} = 2.9646 \times 10^{16}\ \text{ГэВ}, \tag{5.2}$$

при $\mathcal{I} = 0.3653$.

6. Аксионоподобный (ALP) сектор

6.1. Параметры ALP

$$f_a = M_{Pl}^{\text{red}}\, \varepsilon^2 = 1.9801 \times 10^{11}\ \text{ГэВ}, \tag{6.1}$$

$$m_a = \frac{(\chi^{1/4})^2}{f_a} = 28.407\ \mu\text{эВ}, \tag{6.2}$$

$$\nu_a = \frac{m_a c^2}{h} = 6.8688\ \text{ГГц}. \tag{6.3}$$

Здесь $\chi^{1/4} \approx 75.0$ МэВ — корень четвертой степени из топологической восприимчивости КХД. Мы подчеркиваем, что явная $U(1)_{PQ}$ симметрия не вводится; объект является ALP.

6.2. ALP-фотонная связь

$$g_{a\gamma\gamma} = \frac{\alpha_{\rm EM}}{2\pi f_a}\left(\frac{E}{N} - 1.92\right). \tag{6.4}$$

При $f_a = 1.9801 \times 10^{11}$ ГэВ: $\alpha_{\rm EM}/(2\pi f_a) = 5.866 \times 10^{-15}$ ГэВ$^{-1}$.

Таблица 1: Предсказание для $g_{a\gamma\gamma}$.

Сценарий	E/N	$g_{a\gamma\gamma}$, ГэВ$^{-1}$
KSVZ	0	-1.126×10^{-14}
DFSZ	8/3	$+4.379 \times 10^{-15}$

6.3. Темная материя из ALP

$$\Omega_a h^2 \approx 0.12\,\theta_i^2\, f_{\rm anh}(\theta_i)\left(\frac{f_a}{3\times 10^{11}}\right)^{7/6}, \tag{6.5}$$

где $f_{\rm anh}(\theta_i) = [\ln(e/(1-(\theta_i/\pi)^2))]^{7/6}$ — фактор ангармоничности. Численные T-эффекты вносят поправку $+12.4\%$, что приводит к согласию с Planck при $\theta_i = 1.1162$.

7. Кварковый сектор (11 параметров)

7.1. Матричная структура

$$M_u = \begin{pmatrix} a_u Y_1^{(2)} & b_u Y_3^{(4)} & c_u Y_2^{(6)} \\ a_u Y_3^{(2)} & b_u Y_2^{(4)} & c_u Y_1^{(6)} \\ a_u Y_2^{(2)} & b_u Y_1^{(4)} & c_u Y_3^{(6)} \end{pmatrix},\; M_d = \begin{pmatrix} a_1 Y_1^{(6)} & b Y_3^{(2)} & c Y_2^{(2)} \\ a_1 Y_3^{(6)} & b Y_2^{(2)} & c Y_1^{(2)} \\ a_2 Y_2^{(2)} & b Y_1^{(2)} & c Y_3^{(4)} \end{pmatrix}. \tag{7.1}$$

7.2. Целевые значения

Таблица 2: Целевые значения (PDG 2024).

Наблюдаемая	$O_i^{\text{target}} \pm \sigma_i$
m_u/m_t	$(1.27 \pm 0.30) \times 10^{-3}/172.0$
m_c/m_t	$(0.620 \pm 0.020)/172.0$
m_d/m_b	$(2.70 \pm 0.20) \times 10^{-3}/2.860$
m_s/m_b	$(55.0 \pm 5.0) \times 10^{-3}/2.860$
m_b/m_t	$(2.860 \pm 0.030)/172.0$
$\lvert V_{us}\rvert$	0.22501 ± 0.00068
$\lvert V_{cb}\rvert$	0.04053 ± 0.00042
$\lvert V_{ub}\rvert$	0.00382 ± 0.00020
$\lvert J\rvert$	$(3.080 \pm 0.130) \times 10^{-5}$

7.3. Результаты

Независимая оптимизация дает $\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20}$ при модулях, указанных в абстракте. Коэффициенты:

$$c^{\text{fit}} \approx (5.31 \times 10^{-5},\ 7.19,\ 0.039,\ 2.43 \times 10^{-4},\ 0.503,\ 1.37 \times 10^{-3},\ 2.22 \times 10^{-3}). \tag{7.2}$$

8. Лептонный сектор (5 параметров)

Массы заряженных лептонов берутся диагональными, в то время как матрица масс нейтрино M_ν строится из комбинации модулярных форм весов 2 и 4.

8.1. Матричная структура

$$M_\nu = g_1 M_{3_S}(Y^{(2)}) + g_2 M_{3_S}(Y^{(4)}) + d \cdot \mathbb{I}, \tag{8.1}$$

где триплетная свертка $M_{3_S}(Y)$ имеет вид:

$$M_{3_S}(Y) = \begin{pmatrix} 2Y_1 & -Y_3 & -Y_2 \\ -Y_3 & 2Y_2 & -Y_1 \\ -Y_2 & -Y_1 & 2Y_3 \end{pmatrix}. \tag{8.2}$$

Диагональный член $d \cdot \mathbb{I}$ нарушает $\mu - \tau$ симметрию.

8.2. Результаты

Независимая оптимизация дает:

$$\boxed{\chi^2 < 10^{-16} \quad \text{при} \quad \tau_l = 0.385257 + 0.958275\,i,\ g_1 = -19.9981,\ g_2 = -19.4310,\ d = 14.3320.} \tag{8.3}$$

Таблица 3: Наблюдаемые PMNS (NuFIT 5.2).

Наблюдаемая	Предсказание	Цель	Отклонение
θ_{12} (солнечный)	33.41°	$33.41^\circ \pm 0.5^\circ$	$\sim 10^{-9}$
θ_{13} (реакторный)	8.54°	$8.54^\circ \pm 0.1^\circ$	$\sim 10^{-9}$
θ_{23} (атмосферный)	49.10°	$49.1^\circ \pm 0.5^\circ$	$\sim 10^{-9}$
J_{cp} (CP-фаза)	-0.0180	-0.018 ± 0.005	$\sim 10^{-9}$

9. Полный баланс

Таблица 4: Свободные параметры (16).

Категория	Параметры	Количество
Модули кварков	τ_u, τ_d (комплексные)	4
Кварковые коэффициенты	$a_u, b_u, c_u, a_1, a_2, b, c$	7
Модуль лептонов	τ_l (комплексный)	2
Лептонные коэффициенты	g_1, g_2, d	3
Всего		**16**

$$N_{\text{dof}} = 13 - 16 = -3. \tag{9.1}$$

9.1. Информационные критерии

Таблица 5: AIC/BIC для фермионного сектора ($n = 13$).

Модель	k	χ^2	AIC	BIC
MEML 75	16	$\approx 10^{-20}$	32.0	41.0
SM	19	0.9	38.9	49.6

10. Открытые проблемы

1. **Вырожденность коэффициентов.** Коэффициенты c_i неединственны: χ^2 инвариантна относительно $c_i \to kc_i$ (Приложение D).

2. **Статус α_G.** Постулат. Систематический поиск не дает точной формулы.

3. **Статус ε.** Анзац; выбор 4π не выведен.

4. **Плоскостность $\operatorname{Re}\tau$.** $\operatorname{Re}\tau$ мягко-плоский (Приложение E).

5. **Нестабильность LOO.** При $N_{\text{dof}} = -3$, разброс $|V_{ub}|$ от -97% до $+25407\%$.

11. Дорожная карта

Таблица 6: Этапы развития.

Этап	Задача	Приоритет
I	Механизм для c_i: голоморфные связи 6D→4D	Критический
I	Потоковая стабилизация $\mathrm{Im}\,\tau$ ($\pm 3\%$)	Высокий
II	Сокращение параметров в кварках	Средний
III	ADMX, DESI, DUNE, KamLAND-Zen	Внешний

12. Заключение

Что было сделано:

1. Совместный фит кварков и лептонов с 16 параметрами для 13 наблюдаемых ($N_{\mathrm{dof}} = -3$), плюс проверяемое предсказание для аксиона.
2. Кварковый сектор: $\chi^2 = 6.195 \times 10^{-20}$.
3. Лептонный сектор: $\chi^2 < 10^{-16}$ при $\tau_l = 0.385257 + 0.958275\,i$. Нарушение $\mu - \tau$ симметрии успешно достигается с помощью члена $d \cdot \mathbb{I}$.

Вердикт. Модель феноменологическая. Она воспроизводит наблюдения, но не предсказывает. Вырожденность коэффициентов показывает, что модель интерполирует 13 наблюдений с помощью 16 параметров.

Доступность данных

Наборы данных и скрипт проверки на Python, сгенерированные в ходе данного исследования, доступны в репозитории Zenodo по адресу https://doi.org/10.5281/zenodo.23503366 и в репозитории GitHub по адресу https://github.com/kolbasa1972/MEML-75-Complete.

A. A_4 модулярные формы: полные q-разложения

Определение: $q = e^{2\pi i\tau}$.

$$Y_1^{(2)} = 1 + \sum_{n=1}^{17} C_1^{(n)} q^n, \tag{A.1}$$

$$Y_2^{(2)} = -6\, q^{1/3} \left(1 + \sum_{n=1}^{11} C_2^{(n)} q^n\right), \tag{A.2}$$

$$Y_3^{(2)} = -18\, q^{2/3} \left(1 + \sum_{n=1}^{10} C_3^{(n)} q^n\right), \tag{A.3}$$

$C_1 = [12, 36, 12, 84, 72, 36, 96, 180, 12, 216, 144, 36, 156, 96, 84, 240, 36]$; $C_2 = [1, 7, 8, 18, 14, 30, 20, 42, 30, 56, 42]$; $C_3 = [1, 2, 5, 6, 12, 8, 14, 10, 22, 16]$.

Свертки:

$$Y_1^{(4)} = (Y_1^{(2)})^2 - Y_2^{(2)} Y_3^{(2)}, \tag{A.4}$$

$$Y_2^{(4)} = (Y_3^{(2)})^2 - Y_1^{(2)} Y_2^{(2)}, \tag{A.5}$$

$$Y_3^{(4)} = (Y_2^{(2)})^2 - Y_1^{(2)} Y_3^{(2)}, \tag{A.6}$$

$$Y_1^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_1^{(2)} Y_1^{(4)} - Y_2^{(2)} Y_3^{(4)} - Y_3^{(2)} Y_2^{(4)}\right], \tag{A.7}$$

$$Y_2^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_3^{(2)} Y_3^{(4)} - Y_1^{(2)} Y_2^{(4)} - Y_2^{(2)} Y_1^{(4)}\right], \tag{A.8}$$

$$Y_3^{(6)} = \tfrac{1}{3}\left[2Y_2^{(2)} Y_2^{(4)} - Y_3^{(2)} Y_1^{(4)} - Y_1^{(2)} Y_3^{(4)}\right]. \tag{A.9}$$

B. Процедура численного фита

Глобальный фит был выполнен с использованием `differential_evolution` (SciPy): 3 сида (42, 43, 44); maxiter= 150; popsize= 15; tol= 10^{-8}. Границы: $\mathrm{Re}\,\tau \in [-0.5, 0.5]$, $\mathrm{Im}\,\tau \in [0.87, 2.5]$, $c_i \in [10^{-8}, 10^2]$.

C. Воспроизведение τ и χ^2

Таблица 7: Три независимых прогона DE (кварковый сектор).

Источник	$\mathrm{Re}\,\tau_u$	$\mathrm{Im}\,\tau_u$	$\mathrm{Re}\,\tau_d$	$\mathrm{Im}\,\tau_d$
Прогон 1	−0.15779	2.38518	+0.36939	1.54105
Прогон 2	−0.15779	2.38518	+0.36939	1.54105
Прогон 3	−0.12893	2.38411	−0.37212	1.54102

D. Доказательство вырожденности коэффициентов

При фиксированном τ, умножаем все c_i на k:

Таблица 8: Инвариантность χ^2 относительно $c_i \to kc_i$.

k	χ^2
0.5	6.20×10^{-20}
1.0	6.20×10^{-20}
1.87	1.08×10^{-19}
10.0	3.00×10^{-19}

E. Плоскостность $\mathrm{Re}\,\tau$

Сканирование по $\mathrm{Re}\,\tau_u$: ширина $\chi^2 < 10$: $[-0.40, +0.00]$ (0.40). Сканирование по $\mathrm{Re}\,\tau_d$: ширина $\chi^2 < 10$: $[+0.30, +0.50]$ (0.20).

F. Тест LOO

Для каждого $j \in \{1, \ldots, 9\}$: удалить j-ю наблюдаемую, предсказать j-ю. $N_{\mathrm{dof}} = +1$. Результаты: среднее $|V_{ub}|$ +16728%, std 11819%.

G. Систематический поиск α_G

Проверено $N = 392$ комбинации. **2 совпадения ниже** 0.1%**:** $|Y_1^{(6)}|/|Y_3^{(4)}| = 0.212125$ (-0.0385%); $|Y_2^{(6)}|/\pi = 0.212411$ ($+0.0965\%$). Пуассон: $\langle n \rangle = 0.78$, $n_{\mathrm{obs}} = 2$; $P(n \geq 2) = 0.185$.

Список литературы

[1] Planck Collaboration, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020).

[2] R. L. Workman et al. (PDG), Prog. Theor. Exp. Phys. **2022**, 083C01 (2022).

[3] ADMX Collaboration, Phys. Rev. Lett. **134**, 021002 (2025).

[4] F. Feruglio, Eur. Phys. J. C **77**, 713 (2017).

[5] T. Kobayashi et al., Prog. Theor. Exp. Phys. **2020**, 053B05 (2020).