

CONCOURS D'ENTREE EN LICENCE

EPREUVE: PHYSIQUE /ELECTRONIQUE

Session: 2017

Durée: 1h30

Sur la feuille « GRILLES DE REPONSES », cochez dans chacun des cas la bonne réponse. Une réponse juste apporte 2 points, une réponse fausse retranche 1 point. L'absence de réponse ne rapporte ni ne retranche de point

Q1- La charge d'un électron est de :

- a) -1,6.10⁻¹⁹ C
- b) 1,67.10⁻²⁷ kg
- c) 6,022.10⁻²³ mol⁻¹

Q2- L'atome est constitué de :

- a) nucléons et électrons
- b) protons et électrons
- c) neutrons et électrons

Q3- l'établissement du courant dans une bobine suit une loi

- a) instantanée
- b) linéaire
- c) exponentielle

Q4- la constante de temps τ du condensateur est :

- a) R/C
- b) C/R
- c) RC

Q5- Sous une tension constante, lorsque la valeur de la résistance est grande,

- a) le courant qui la traverse est faible
- b) le courant qui la traverse est fort
- c) le courant qui la traverse est nul

Q6- Dans un mouvement rectiligne uniforme,

- a) l'accélération est constante et la vitesse est nulle
- b) l'accélération est nulle et la vitesse est constante
- a) l'accélération et la vitesse sont constantes.

Q7- La vitesse angulaire ω s'exprime en :

- a) mètre par seconde
- b) radian par seconde
- c) seconde

Q8- L'équation du mouvement d'un corps lâché dans le champ de pesanteur g sans vitesse initiale en un point pris comme origine des espaces est :

a)
$$y = -\frac{1}{2}gt^2 + 2t$$

b)
$$y = -\frac{1}{2}g.t^2$$

c)
$$y = gt^2 + 3$$

Q9- Les lignes de champ du spectre d'un aimant droit

- a) sortent du pôle nord et entrent par le pôle sud de l'aimant
- b) sortent du pôle sud et entrent par le pôle nord de l'aimant
- c) sont des droites

Q10- Dans un transformateur abaisseur de tension lorsqu'on applique une tension continue au primaire on obtient au secondaire une tension :

- a) continue
- b) alternative
- c) nulle

Q11- La puissance électrique consommée par le primaire d'un transformateur dont le circuit du secondaire est ouvert, est :

- a) la moitié de la puissance du transformateur
- b) la totalité de la puissance du transformateur
- c) nulle

Q12- En régime alternatif, le cosinus de l'angle de déphasage entre le courant et la tension aux bornes d'un conducteur ohmique est :

- a) égal à 1
- b) nul
- c) égal à $\frac{1}{2}$

Q13-Lorsque deux condensateurs sont montés en dérivation la capacité équivalente est :

- a) la somme des capacités
- b) le produit des capacités divisé par leur somme
- c) la moitié de leur somme

Q14-Lorsque deux inductances sont montées en dérivation l'inductance équivalente est :

- a) la somme des inductances
- b) le produit des inductances divisé par leur somme
- c) la moitié de leur somme


Q15-Lorsque deux résistances sont montées en dérivation la résistance équivalente est :

a) La somme des résistances

- b) Le produit des résistances divisé par leur somme
- c) La moitié de leur somme

Q16-La résistance équivalente du réseau de résistances suivant est :

- a) 2R
- b) R
- c) R/2



Enoncé de Q17 et Q18

Entre deux électrodes A et B distantes de d = 10 cm et reliées aux bornes d'un générateur électrostatique, on applique une différence de potentielle U=UAB de 10 kV. Il se crée alors entre A et B un champ électrostatique uniforme \vec{E} . On injecte en O comme l'indique la figure ci-dessous, un proton H⁺ de masse $m = 1,66.10^{-27} kg$ et de charge $q = 1,6.10^{-19}$ C avec une vitesse $v_0 =$

1.5.10⁵ m.s⁻¹ colinéaire à \vec{E} .

Q17- Le champ électrostatique étant uniforme, on peut affirmer que :

- a) le vecteur champ varie d'un point à un autre.
- b) les lignes de champs sont des droites parallèles, elles-mêmes orthogonales aux plaques
- c) les plans équipotentiels sont orthogonaux aux plaques
- d) le vecteur \overrightarrow{E} est dirigé du potentiel le moins élevé au potentiel le plus élevé.

Q18 - A un instant t donné, la vitesse du proton est :

a)
$$v(t) = \frac{q}{d}E t + v_0$$

a)
$$v(t) = \frac{q}{d} E t + v_0$$
 b) $v(t) = \frac{q}{m} U t + v_0$

c)
$$v(t) = \frac{q}{m} E t + v_0$$
 d) $v(t) = \frac{q}{d} U t + v_0$

d)
$$v(t) = \frac{q}{d} U t + v_0$$

Enoncé de Q19 et Q20

Devant une lentille (L), on place à 10 cm un objet AB lumineux de hauteur 4 cm de sorte que A se trouve sur l'axe de la lentille et B au-dessus de l'axe. On recueille l'image nette A'B' de AB sur un écran situé à 15 cm : AB est disposé perpendiculaire à l'axe de la lentille.

Q19- La lentille (L) est une lentille :

a) convergente

- b) divergente
- c) à bord épais



Q20- L'image A'B' a une hauteur de :

- a) A'B' = 16 cm
- b) A'B' = 8 cm
- c) A'B' = 6 cm
- d) A'B' = 15 cm



CONCOURS D'ENTREE EN LICENCE

SESSION 2017

EPREUVE DE PHYSIQUE/ELECTRONIQUE SIGNATURE DU CANDII	
N° DE TABLE :	
NOM: PRENOMS: Date de naissance: / / /	A NONYMAT
G	GRILLES DE REPONSES A NONYMAT
EPREUVE DE PHYS	SIQUE/ELECTRONIQUE
Date: / / 2017	
Signatures des surveillants	
1) 3)	
2)	
A B C Q1	D A B C D Q11
Q2	Q12
Q3	Q13
Q4	Q14
Q5	Q15
Q6	Q16
Q7 🔲 🔲	Q17
`	
Q8	Q18
	Q18

NOTE