
















Donor differences across human anatomy

	Mean anatomy	Repeat capture	Bilateral	Unrelated donor	Context mean 16 donors	Mean-fill V own scale
Faces CelebA		 1.30 [1.26, 1.34]	 0.99 [0.94, 1.03]	 2.02 [2.00, 2.04]	 0.54 [0.53, 0.55]	
Faces IMDb-WIKI		 1.40 [1.36, 1.44]	 1.10 [1.04, 1.15]	 2.02 [2.00, 2.05]	 0.56 [0.56, 0.57]	
Brain MRI QTIM Gaussian; P		 0.28	 1.56	 1.99	 0.75	
Fundus GRAPE P8; P		 0.49 [0.40, 0.58]	 1.33 [1.22, 1.44]	 2.01 [1.90, 2.14]	 0.86 [0.83, 0.88]	
Fundus PAPILA P9; P		unavailable	 1.47 [1.42, 1.51]	 1.99 [1.94, 2.05]	 0.94 [0.91, 0.95]	
Iris UTIRIS NIR P2; P		 0.41 [0.34, 0.47]	 1.26 [1.12, 1.40]	 2.00 [1.82, 2.21]	 0.50 [0.47, 0.53]	



Local squared error / mean-fill error (Q); white = 1. V has a separate scale.