

強制法セミナー第4回：連続体仮説の独立性証明

Hiromi ISHII (@mr_konn)

2025-XX-XX

目次

1 擬順序の組合せ論的性質と基数の保存	1
2 Cohen 強制法の基本性質	5
3 ZFC + CH の無矛盾性の証明	9
4 ZFC + \neg CH の無矛盾性の証明	10
5 参考文献	10

本章では、いよいよ連続体仮説（CH）の独立性証明に移る。通常、ZFC + CH の無矛盾性証明には Gödel の L を用い、ZFC + \neg CH の無矛盾性に強制法が用いられることが多いが、ここではどちらも強制法による無矛盾性証明を与える。また、本章では常に AC は仮定する。

1 擬順序の組合せ論的性質と基数の保存

前回までに見たように、基数の概念は必ずしも強制法により保たれるとは限らない。一方、CH は基数に関する言明であるので、強制法によりどの範囲の基数が保たれるのか分析しなければならない。そこで本節では、基数の保存を導くような強制法擬順序の組合せ論的性質について議論しておく。そうした代表的な性質が、 κ -鎖条件と κ -閉性である：

定義 1.1. κ を基数とする。

- 擬順序 \mathbb{P} が κ -鎖条件 (κ -chain condition、 κ -c.c.) を持つ $\stackrel{\text{def}}{\iff} \mathbb{P}$ の任意の反鎖の濃度が κ 未満。
- 擬順序 \mathbb{P} が κ -閉 (κ -closed) $\stackrel{\text{def}}{\iff} \mathbb{P}$ は任意の長さ κ 未満の下降列の下界を持つ。すなわち：
$$\forall \alpha < \kappa \ \forall \langle p_\xi \in \mathbb{P} \mid \xi < \alpha \rangle \left[\forall \xi < \zeta < \alpha \ (p_\zeta \leq p_\xi) \implies \exists q \in \mathbb{P} \ \forall \xi < \alpha \ q \leq p_\xi \right].$$
- 擬順序 \mathbb{P} が基数 κ を保つ $\stackrel{\text{def}}{\iff} \Vdash_{\mathbb{P}} \text{“}\kappa \text{: 基数”}$ 。

演習 1.1. 擬順序 \mathbb{P} ごとに、 \mathbb{P} が κ -鎖条件を満たす最小の κ は、常に正則基数となることを示せ。

注意 1.1. 定義より、擬順序 \mathbb{P} は常に $|\mathbb{P}|^+$ -鎖条件を満たす。

閉性・鎖条件と基数の保存の関係を述べたのが、次の二つの補題である：

補題 1.1. κ が正則基数で \mathbb{P} が κ -鎖条件を持つならば、 \mathbb{P} は κ 以上の全ての基数を保つ。即ち、任意の基数 $\lambda \geq \kappa$ について $\Vdash_{\mathbb{P}} \text{“}\lambda : \text{基数”}$ 。

補題 1.2. κ が正則基数で \mathbb{P} が κ -閉なら、 \mathbb{P} は κ 以下の全ての基数を保つ。即ち、任意の基数 $\lambda \leq \kappa$ について $\Vdash_{\mathbb{P}} \text{“}\lambda : \text{基数”}$ 。

以下、本節ではこの二つの補題の証明を与えてゆく。以下の証明に限らずよく使うのが次の補題である：

補題 1.3. \mathbb{P} を擬順序、 $a \in A \in V$ とし、 B を $B \cap V = B \cap V[G]$ となるクラスとする。 $p \in \mathbb{P}$ および \dot{f} が $p \Vdash \dot{f} : \check{A} \rightarrow B$ を満たすなら、 $z \in B$ と $q \leq p$ で $q \Vdash \dot{f}(\check{a}) = \check{z}$ を満たすものが存在し、とくにこのような z は q に対し一意である。

注意 1.2. このような q を「 $\dot{f}(a)$ の値を決定するような q 」と呼ぶ。

証明 仮定より $p \Vdash \dot{f}(a) \in B$ なので、強制法の章の系 5.13 (3) より次の集合 D が p 以下で稠密となる：

$$D = \{q \in \mathbb{P} \mid \exists z \ q \Vdash \dot{f}(\check{a}) = \check{z}\} : p \text{ 以下で稠密}$$

特に $q \leq p$ で $q \in D$ となるものが取れる。よって D の定義より、 $z \in B$ が存在して $q \Vdash \dot{f}(\check{a}) = \check{z}$ となる。 z の q に対する一意性は、 Δ_0 -論理式の絶対性から明らか。□

では、鎖条件の特徴付けを述べ、補題 1.1 が成り立つことを確認しよう。

記法. 以下、 (V, \mathbb{P}) -生成的フィルター G が固定されていると思って議論をする。

実は、正則基数 κ について、 κ 以上の基数の保存は、特に正則基数が $V[G]$ でも（正則とは限らない）基数になっていることが言えれば十分である：

補題 1.4. 擬順序 \mathbb{P} 、正則基数 κ について次は同値：

1. \mathbb{P} は κ 以上の基数を保つ。
2. \mathbb{P} は κ 以上の正則基数を基数として保つ。すなわち、 $\forall \lambda \geq \kappa : \text{正則} \ \Vdash_{\mathbb{P}} \text{“}\lambda : \text{基数”}$ 。

証明 任意の特異基数は正則基数の極限として表すことができ、基数の極限は常に基数であり、極限は強制拡大で不変であることから。□

演習 1.2. 上をちゃんと示せ。

定義 1.2. 擬順序 \mathbb{P} が κ -大域被覆性質 (κ -global covering property) を持つ $\stackrel{\text{def}}{\iff} V[G]$ の任意の順序数の (集合サイズの) 無限列 $f \in V[G]$ に対して、その値域の候補を高々 κ 未満の集合で捕まえる $F \in V$ が

存在する。つまり：

$$\forall \alpha \forall f : {}^\alpha \text{On} \cap V[G] \exists F : \alpha \rightarrow [\text{On}]^{<\kappa} [F \in V \wedge \forall \xi < \alpha f(\alpha) \in F(\alpha)].$$

注意 1.3. おもむろに $V[G]$ への言及がでてきているが、これは幾つかの方法で正当化できることは既に触れた。具体的にこういうことをするのは初めてなので、たとえば強制関係を使って V の中だけでちゃんと定義できることを見ておこう。

結論から言えば、 \mathbb{P} が κ -大域被覆性質を持つことは、次の論理式により V の中だけで書き下せる：

$$\forall \alpha \forall \dot{f} \in V^{\mathbb{P}} \exists F : \alpha \rightarrow [\text{On}]^{<\kappa} [\Vdash_{\mathbb{P}} \text{“}\dot{f} : \check{\alpha} \rightarrow \text{On”} \implies \Vdash_{\mathbb{P}} \text{“}\forall \xi < \alpha \dot{f}(\xi) \in \check{F}(\xi)\text{”}].$$

補題 1.5 (κ -鎖条件の特徴付け). 擬順序 \mathbb{P} について、次は同値：

1. \mathbb{P} が κ -鎖条件を持つ。
2. \mathbb{P} が κ -大域被覆性質を持つ。

証明 (1) \implies (2) : \mathbb{P} が κ -鎖条件を持つとし、順序数 α を固定して $\dot{f} \in V^{\mathbb{P}}$ を $\Vdash_{\mathbb{P}} \text{“}\dot{f} : \check{\alpha} \rightarrow \text{On”}$ を満たす \mathbb{P} -名称とする。目標は、 $F : \alpha \rightarrow [\text{On}]^{<\kappa}$ であって各 $\xi < \alpha$ ごとに、 $\{p \in \mathbb{P} \mid p \Vdash \dot{f}(\xi) \in \check{F}(\xi)\}$ が \mathbb{P} で稠密となるようなものを見付けることである。

まず、 D_ξ ($\xi < \alpha$) を次のように定める：

$$D_\xi = \{p \in \mathbb{P} \mid \exists \beta \ p \Vdash \dot{f}(\check{\xi}) = \check{\beta}\}.$$

すると、補題 1.3 より各 D_ξ は \mathbb{P} で稠密である。また、強制関係は下に遺伝するので、 D_ξ は特に開集合でもある。そこで、各 ξ について D_ξ に含まれる中で極大な反鎖 \mathcal{A}_ξ をとっておく。すると、 \mathbb{P} の κ -鎖条件から、 $|\mathcal{A}_\xi| < \kappa$ となる。ここで、各 $p \in D_\xi$ に対し、 $p \Vdash \dot{f}(\xi) = \beta$ となる β は一意に定まるので、それを β_p とおき、 $F(\xi) := \{\beta_p \mid p \in \mathcal{A}_\xi\}$ により $F : \alpha \rightarrow \mathcal{P}(\text{On})$ を定める。すると $|\mathcal{A}_\xi| < \kappa$ より $|F(\xi)| \leq |\mathcal{A}_\xi| < \kappa$ となるので、特に $F : \alpha \rightarrow [\text{On}]^{<\kappa}$ である。

また、 \mathcal{A}_ξ の極大性から、任意の $p \in D_\xi$ に対して $q \in \mathcal{A}_\xi$ で $p \parallel q$ となるものがとれるが、 $r \leq p, q$ を取れば $r \Vdash \check{\beta}_p = \dot{f}(\check{\xi}) = \check{\beta}_q$ となり、 Δ_0 -絶対性から $\beta_p = \beta_q$ を得、 $p \Vdash \dot{f}(\xi) \in \check{F}(\xi)$ となる。よって、特に D_ξ 上で $\dot{f}(\xi) \in \check{F}(\xi)$ が強制されているので、目標が達成された。

(2) \implies (1) : 対偶を示す。 $\mathcal{A} \subseteq \mathbb{P}$ を濃度 κ の \mathbb{P} の反鎖とする。また、 \dot{f} をつくる代わりに、順序数の \mathbb{P} -名称 $\dot{\alpha}$ であって、その取り得る値の範囲が κ 以上となるものを作る（つまり、 $\alpha = 1$ としている）。ここで、 $\mathcal{A} = \{p_\xi \mid \xi < \kappa\}$ として数え挙げ、 $\dot{f} \in V^{\mathbb{P}}$ を次で定める：

$$\dot{\alpha} := \{(\check{\xi}, p_\xi) \mid \xi < \kappa\}.$$

すると定義より $p_\xi \Vdash \dot{\alpha} = \check{\xi}$ となるので、明らかに $\dot{\alpha}$ の値の取り得る範囲は κ である。 \square

注意 1.4. 実は、 κ -極大被覆性質は擬順序に対してだけではなく、任意の推移的クラス $V \subseteq W$ について同様に定義できる。この場合、特に \mathbb{P} に対する言及がなくても、 V, W がともに AC を満たすなら、

(V, W) が κ -被覆性質を持つことと、 W がなんらかの κ -鎖条件擬順序 \mathbb{P} による V の生成拡大であることは同値であることが知られている。この特徴付けは、 V の基礎モデルを数え上げる **集合論の地質学** で重要な役割を果たす。

Proof of 補題 1.1 \mathbb{P} を κ -鎖条件を満たす強制法とする。補題 1.4 を念頭に \mathbb{P} が κ 以上の正則基数を基数として保つことを示そう。証明は背理法である。つまり、 V の正則基数 $\lambda \geq \kappa$ で $V[G]$ で基数でなくなるようなものがあったとして矛盾を導く。特に、そのような λ が特異基数になってしまうことが言えればよい。

そこで、 V の正則基数 $\lambda \geq \kappa$ で、 $V[G]$ で基数でなくなっているものがあったとする。ここで $\theta := |\lambda|^{V[G]} < \lambda$ とおけば、 $V[G]$ で全射 $f : \theta \twoheadrightarrow \lambda$ が取れる。すると、補題 1.5 より V に属する関数 $F : \theta \rightarrow [\lambda]^{<\kappa}$ で $f(\xi) \in F(\xi)$ ($\forall \xi < \theta$) を満たすものがとれる。そこで、以下によって $g : \theta \rightarrow \lambda$ を定める：

$$g(\xi) := \sup F(\xi).$$

ここで、 $\lambda \geq \kappa$ かつ λ が正則であることから、 $\sup F(\xi) < \lambda$ となるので、 $g : \theta \rightarrow \lambda$ である。しかし、 f が全射であることから、 $\sup_{\xi < \theta} f(\xi) = \lambda$ となるので、 $\text{cf}^V(\lambda) \leq \theta < \lambda$ となる。これは λ が V で正則であることに反する。 \square

系 1.6. 任意の擬順序 \mathbb{P} は $|\mathbb{P}|^+$ 以上の基数を保つ。

最後に閉性の帰結を述べ、これにより下方向の基数の保存が導かれることを示す：

補題 1.7. 擬順序 \mathbb{P} が κ -閉なら、 \mathbb{P} による強制拡大は長さ κ 未満の順序数列について閉じている。即ち、 ${}^{<\kappa}\text{On} \cap V[G] = {}^{<\kappa}\text{On} \cap V$ 。

演習 1.3. 上の主張を厳密化せよ。

これを認めれば、次のようにして補題 1.2 は一瞬である：

Proof of 補題 1.2 対偶を示す。 $\alpha \leq \kappa$ を順序数とする。 $V[G]$ で α が基数でなかったとすると、 $\beta < \alpha$ と $V[G]$ に属する全射 $f : \beta \twoheadrightarrow \alpha$ が取れる。今、 \mathbb{P} は κ -未満の順序数列について閉じているので、この f は V に属しており、特に V においても $\beta < \alpha$ から α への全射となっている。よって α は V でも基数ではない。 \square

Proof of 補題 1.7 \mathbb{P} が κ -閉であるとする。 $\alpha < \kappa$ を適当に固定し、 \dot{f} を $\Vdash_{\mathbb{P}}$ “ $\dot{f} : \check{\alpha} \rightarrow \text{On}$ ” を満たす \mathbb{P} -名称とする。以下が稠密であることが示せればよい：

$$D := \{ q \in \mathbb{P} \mid \exists g : \alpha \rightarrow \text{On} \ \forall \xi < \alpha \ q \Vdash \dot{f}(\check{\xi}) = \check{g}(\check{\xi}) \}.$$

つまり、 $p \in \mathbb{P}$ を適当に固定し、 $q \leq p$ と $g : \alpha \rightarrow \text{On}$ で、任意の $\xi < \alpha$ について $q \Vdash \dot{f}(\check{\xi}) = \check{g}(\check{\xi})$ を満たすものが取れればよい。そこで、以下のようにして $\langle (p_\xi, \gamma_\xi) \mid \xi \leq \alpha \rangle$ を帰納的に取っていく：

1. $p_0 = p$,
2. $\xi < \zeta \implies p_\zeta \leq p_\xi$,

$$3. p_{\xi+1} \Vdash \dot{f}(\xi) = \check{\gamma}_\xi.$$

このようなものが取れたとする。 $q := p_\alpha$ とおけば、 $\forall \xi < \alpha \ p_\xi \geq q \Vdash \dot{f}(\xi) = \gamma_\xi$ となるので、 $g(\xi) := \gamma_\xi$ とおけば、これが所望のものである。そこで、以下、 (p_ξ, γ_ξ) を構成していく。

後続ケース： p_ξ まで取れたとして、 $p_{\xi+1}$ を取る。これは簡単で、補題 1.3 により、 $p_{\xi+1} \leq p_\xi$ で $\dot{f}(\xi)$ の値を決定するような条件を取り、その値を γ_ξ とすればよい。

極限ケース： 閉性を使う。 $\xi \leq \alpha$ が極限順序数で、任意の $\zeta < \xi$ について p_ζ, γ_ζ が条件を満たすように取れているとする。 $p_\xi \leq p_\zeta$ ($\forall \zeta < \xi$) となるものが常に取れる、というのが \mathbb{P} の κ -閉性が保証するところなので、有り難く下界を取ればよい。 \square

2 Cohen 強制法の基本性質

CH やその否定の無矛盾性証明では、 κ -Cohen 強制法と呼ばれる強制概念が重要な役割を果たす。そこで、本節ではその基本的な性質を採り上げておく。

定義 2.1. κ を無限基数とする。

1. 以下で定まる $\text{Add}(\kappa)$ を、 κ の部分集合を付け加える κ -Cohen 強制法と呼ぶ：

$$\text{Add}(\kappa) := \{ f : A \rightarrow 2 \mid A \in [\kappa]^\kappa \},$$

$$p \leq q \stackrel{\text{def}}{\iff} p \supseteq q \iff \text{dom}(p) \supseteq \text{dom}(q) \wedge p \restriction \text{dom}(q) = q.$$

$\text{Add}(\omega)$ を単に実数を付け加える **Cohen 強制法**と呼ぶ。

2. 集合 I で添え字づけられた擬順序の族 $\langle (\mathbb{P}_i, \mathbb{1}_i, \leq_i) \mid i \in I \rangle$ への κ -台直積 $\prod_{i \in I}^{\leq \kappa} \mathbb{P}_i$ を次で定める：

$$\prod_{i \in I}^{\leq \kappa} \mathbb{P}_i := \{ p : \text{関数} \mid \text{dom}(p) \in [I]^{<\kappa} \wedge \forall i \in \text{dom}(p) [p(i) \in \mathbb{P}_i] \},$$

$$\mathbb{1} = \emptyset,$$

$$p \leq q \stackrel{\text{def}}{\iff} \text{dom}(p) \supseteq \text{dom}(q) \wedge \forall i \in \text{dom}(q) [p(i) \leq_i q(i)].$$

3. $\text{Add}(\kappa)$ の γ 個の κ -台直積 $\text{Add}(\kappa, \gamma) := \prod_{\alpha < \gamma}^{\leq \kappa} \text{Add}(\kappa)$ のことを、 γ 個の κ の部分集合を付け加える κ -Cohen 強制法と呼ぶ。 $\text{Add}(\omega, \gamma)$ を単に γ 個の実数を付け加える **Cohen 強制法**と呼ぶ。

注意 2.1. $\mathbb{B}(\text{Add}(\kappa)) \cong \mathbb{B}(\text{Add}(\kappa, 1))$ である。

「 κ の部分集合を付け加える」といっているので、本当に付け加えられているのか確認していこう。実のところ、 $\text{Add}(\kappa)$ は κ の新しい部分集合 x の特性関数 χ_x を近似している：

演習 2.1. F を関数から成る \supseteq に関するフィルターとすると、 $\bigcup F$ は F の任意の元を拡張する関数となることを示せ。

ヒント：関数 f, g が両立するなら、 $f \subseteq g$ か $g \subseteq f$ が成り立ち、 $f \cup g \supseteq f, g$ が f, g を拡張する。

補題 2.1. G を $(V, \text{Add}(\kappa))$ -生成的フィルターとし、 $f_G := \bigcup G$ とおく。このとき次が成立する：

1. $f_G : \kappa \rightarrow 2$,
2. $f_G \notin V$.

このとき、 $x_G := \{ \alpha < \kappa \mid f_G(\alpha) = 1 \}$ を κ -Cohen 集合と呼ぶ。特に、 $\kappa = \omega$ のとき、 x_G は Cohen 実数と呼ばれる。

証明 V で議論する。各 $\alpha < \kappa$ および $g : \kappa \rightarrow 2$ に対し、以下の集合 D_α, E_g を考える：

$$D_\alpha = \{ p \in \text{Add}(\kappa) \mid \alpha \in \text{dom}(p) \},$$

$$E_g = \{ p \in \text{Add}(\kappa) \mid \exists \alpha \in \text{dom}(p) [g(\alpha) \neq p(\alpha)] \}.$$

このとき、 D_α, E_g は明らかに $\text{Add}(\kappa)$ で稠密であり、 V の元である。

そこで $(V, \text{Add}(\kappa))$ -生成的フィルター G を取る。このとき、演習 2.1 より、 $f_G := \bigcup G$ は G の各元を拡張する関数である。また、生成的フィルターの定義より、任意の $g \in V$, $\alpha < \kappa$ に対して $G \cap D_\alpha \neq \emptyset$ かつ $G \cap E_g \neq \emptyset$ が成り立つ。特に、 $D_\alpha \cap G \neq \emptyset$ より $\alpha \in \text{dom}(f_G)$ が出るので、 $\text{dom}(f_G) = \kappa$ である。また、 $f \in V$ をとれば、 $E_f \cap G \neq \emptyset$ よりある $\alpha < \kappa, p \in G$ があって、 $f_G(\alpha) = p(\alpha) \neq f(\alpha)$ となる。よって $f_G \notin V$ である。 \square

よって $\text{Add}(\kappa)$ は新しい κ の部分集合を付け足していることがわかった。つづいて $\text{Add}(\kappa, \gamma)$ が「 γ 個以上」の新しい集合を足している事を見ていこう。

まず、前章の補題 5.16 より、次の補題から直積は各直積成分の生成的フィルターを足すことがわかる：

補題 2.2. $\langle \mathbb{P}_i \mid i \in I \rangle$ を擬順序の族、 κ を無限基数、 $\mathbb{Q} := \prod_{i \in I}^{\leq \kappa} \mathbb{P}_i$ とする。このとき、 $e_i : \mathbb{P}_i \rightarrow \mathbb{Q}$ を $e_i(p) = \{(i, p)\}$ により定めると、 e_i は \mathbb{P}_i から \mathbb{Q} への完備埋め込みとなる。

証明 順序や \perp を保つことは直ちに従う。あとは \mathcal{A} が \mathbb{P}_i の極大反鎖なら、 $e_i[\mathcal{A}]$ も \mathbb{Q} で極大反鎖となることを示せばよい。

そこで、適当に $p \in \mathbb{Q}$ をとったとき、 $p^* \in \mathcal{A}$ で $e(p^*) \parallel p$ となるものが取れることを示せばよい。いま、 \mathcal{A} の \mathbb{P}_i での極大性から、 $q \in \mathcal{A}$ で $p(i) \parallel q$ となるものが存在する。そこで $r \leq_i p(i), q$ となるような $r \in \mathbb{P}_i$ を取り、 $p^* := e(q)$ とおけば、 $p^* \in e[\mathcal{A}]$ である。あとは p と p^* が \mathbb{Q} で下界を持つことを示せばよい。

実際、次のように定義すればよい：

$$r^*(j) := \begin{cases} r & (j = i) \\ p(j) & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

すると、定義より $r^* \leq p, p^*$ となる。これが示したかった事である。 \square

系 2.3. G を $(V, \prod_{i < \kappa} \mathbb{P}_i)$ -生成的とすると、 $G_i := \{p(i) \mid p \in G, i \in \text{dom}(p)\}$ は (V, \mathbb{P}_i) -生成的。

これにより、特に $\text{Add}(\kappa, \gamma)$ は $\text{Add}(\kappa)$ の生成的フィルターを足すことがわかった。特に γ 個足されている訳だが、これらの間に重複はないだろうか？つまり、 γ 個足されているように見えても、実際には同じ生成的フィルターになっていたりはしないだろうか？

ちゃんとこの γ 個が互いに相異なることを保証するのが、Cohen 強制法の無原子性である：

補題 2.4. $\text{Add}(\kappa)$ は原子を持たない。すなわち、任意の $p \in \text{Add}(\kappa)$ に対し、 $q, r \leq p$ で $q \perp r$ となるものが存在する。

証明 $p \in \text{Add}(\kappa)$ を任意に取る。このとき、 $\text{dom}(p) < \kappa$ なので $\alpha \in \kappa \setminus \text{dom}(p)$ が取れる。ここれ $q := p \cup \{(\alpha, 0)\}$, $r := p \cup \{(\alpha, 1)\}$ とおけば、 $q, r \leq p$ で $q \perp r$ となる。 \square

補題 2.5. 補題 2.2、系 2.3 の状況で、更に各 \mathbb{P}_i が原子を持たないとする。このとき、 $i \neq j$ なら $p \in G_i, q \in G_j$ で $e_i(p) \perp_{\mathbb{Q}} e_j(q)$ となるものが存在する。

特に、 $\mathbb{P}_i = \mathbb{P}$ が原子を持たないなら、各 G_i は互いに両立しない元を持つ生成的フィルターとなる。

証明 面倒なので「特に」の $\mathbb{P}_i = \mathbb{P}$ の場合だけ示す。 $i \neq j$ として、 $D_{ij} \subseteq \mathbb{Q}$ を次で定める：

$$D_{ij} := \{p \in \mathbb{Q} \mid i, j \in \text{dom}(p) \wedge p(i) \perp p(j)\}.$$

$D_{ij} \in V$ なので、 D_{ij} が \mathbb{Q} で稠密であることが示せれば、 $p \in G \cap D_{ij}$ が取れ、定義より $p(i) \in G_i, p(j) \in G_j$ である。 D_{ij} の定義より $p(i) \perp p(j)$ となるので、これが示したかった事である。

では D_{ij} の稠密性を示していく。 $p \in \mathbb{Q}$ を任意に取り、 $p^* \leq p$ で $p^*(i) \perp p^*(j)$ となるものを探せばよい。 $i \notin \text{dom}(p)$ または $j \notin \text{dom}(p)$ の少なくとも一方が成り立っていれば、 \mathbb{P} の無原子性から p をしかるべく延長できるのでよい。そこで、 $i, j \in \text{dom}(p)$ とする。もし $p(i) \perp p(j)$ なら既に $p \in D_{ij}$ となっているので、以下 $p(i) \parallel p(j)$ とする。そこで $q \leq p(i), p(j)$ をとる。このとき、 \mathbb{P} の無原子性から、 $r, s \leq q$ で $r \perp s$ となるものが取れる。そこで、次により p^* を定める：

$$p^*(k) := \begin{cases} r & (k = i) \\ s & (k = j) \\ p(k) & (\text{otherwise}) \end{cases}$$

すると定め方より明らかに $p^* \leq p$ かつ $p^* \in D_{ij}$ である。 \square

演習 2.2. 一般のケースを示せ。

系 2.6. $\text{Add}(\kappa, \gamma)$ は相異なる $|\gamma|$ 個の κ の部分集合を足す。

以上から、 κ -Cohen 強制法により、望んだ数の κ の部分集合を付け加えられることがわかった。一方で、 $\text{Add}(\kappa, \gamma)$ たちがどのような基数を保つのかについては、まだよくわかっていない。特に、仮に γ 個新しい実数や集合を足したとしても、 γ が強制法の前で基数ではなくなっているかもしれず、そうした場合、 $\mathcal{P}(\kappa)$ の濃度を狙ったように増やせているかはわからない。

そこで、以下では $\text{Add}(\kappa)$ や $\text{Add}(\kappa, \gamma)$ がどのような基数を保つのかを議論する。まず、 $\text{Add}(\kappa)$ は $\text{cf}(\kappa)$ 以下の基数を保つことを見ていこう。

補題 2.7. I を集合、 $\kappa, \lambda \leq \text{cf}(\kappa)$ を無限基数とし、 $\langle \mathbb{P}_i \mid i \in I \rangle$ を λ -閉擬順序の族とする。このとき $\prod_{i \in I}^{\leq \kappa} \mathbb{P}_i$ も λ -閉である。

演習 2.3. 稠密性をちゃんと示せ。

証明 成分ごとに閉性をつかって下界を取ればよい。定義域が κ 未満となることに、 $\lambda \leq \text{cf}(\kappa)$ を使う。 \square

演習 2.4. ちゃんと示せ。

補題 2.8. $\text{Add}(\kappa, \gamma)$ や $\text{Add}(\kappa)$ は $\text{cf}(\kappa)$ -閉。特に、 κ が正則なら κ -Cohen 強制法は κ -閉。

証明 補題 2.7 より $\text{Add}(\kappa)$ の場合についてだけ証明すればよい。面倒なので κ が正則な場合のみ示す。 $\gamma < \kappa$ とし、 $\langle p_\alpha \mid \alpha < \gamma \rangle$ を $\text{Add}(\kappa, \gamma)$ の下降列とする。このとき、 $p_\gamma := \bigcup_{\alpha < \gamma} p_\alpha$ とおけば、少なくとも $p_\gamma \supseteq p_\alpha$ ($\forall \alpha < \gamma$) が成り立つ。あとは $|p_\gamma| < \kappa$ が言えればよいが、これは κ が正則で、 $\gamma < \kappa$ かつ $\forall \alpha < \gamma$ $|p_\alpha| < \kappa$ であることから従う。 \square

演習 2.5. ちゃんと証明せよ。

系 2.9. κ -Cohen 強制法 $\text{Add}(\kappa)$ および $\text{Add}(\kappa, \gamma)$ はいずれも $\text{cf}(\kappa)$ -以下の無限基数を全て保ち、更に長さ $\text{cf}(\kappa)$ 未満の無限列を足さない。

系 2.10. κ が正則、 G が $(V, \text{Add}(\kappa))$ -生成的なら、 $(^{<\kappa}2)^{V[G]} = (^{<\kappa}2)^V$ 。

続いて鎖条件について議論する。一個足す強制法 $\text{Add}(\kappa)$ については、濃度を数えるだけで直ちにわかる：

補題 2.11. $\text{Add}(\kappa)$ は $(2^{<\kappa})^+$ -鎖条件を満たし、従って $(2^{<\kappa})^+$ 以上の基数を保つ。

証明 $|\text{Add}(\kappa)| = |^{<\kappa}[\kappa]| = 2^{<\kappa}$ なので明らか。 \square

では、複数個足す強制法 $\text{Add}(\kappa, \gamma)$ についてはどうだろうか？これについては、やや混み入った無限組合せ論

的議論が必要となるため、 $\neg\text{CH}$ の証明の節 4 で採り上げる。

3 ZFC + CH の無矛盾性の証明

まずは比較的簡単な ZFC + CH の無矛盾性証明を行う。鍵となるのは、次の補題である：

補題 3.1. κ が正則で G が $(V, \text{Add}(\kappa))$ -生成的なら、 κ は $V[G]$ でも基数であり、 $(2^{<\kappa})^{V[G]} = \kappa$ 。

特に、系として $\text{Add}(\omega_1)$ が CH を強制することがわかる。

系 3.2. $\text{Add}(\omega_1)$ は実数を付加せず CH を強制し、 ω_1 以下と $(2^\omega)^+$ 以上の基数を全て保つ。

証明 補題 3.1 より $V[G] \models 2^\omega = 2^{<\omega_1} = \omega_1$ を得る。 \square

あとは補題 3.1 を示せばよい。 $\text{Add}(\kappa)$ が κ -閉であることから、特に V と $V[G]$ で $^{<\kappa}2$ が一致することを利用すれば、 $\text{Add}(\kappa)$ が κ から $^{<\kappa}2$ への全射を付け加えることが示せばよい。

ある集合への全射を付け足す強制法としては、**Levy 崩壊**が標準的な手法である：

定義 3.1. 基数 κ について、 A の濃度を κ 以下に潰す **Levy 崩壊強制法** $\text{Col}(\kappa, A)$ を以下で定める：

$$\begin{aligned} \text{Col}(\kappa, A) &:= \{p : \alpha \rightarrow A \mid \alpha < \kappa\}, \\ p \leq q &\stackrel{\text{def}}{\iff} \text{dom}(p) \supseteq \text{dom}(q) \wedge p \restriction \text{dom}(q) = q. \end{aligned}$$

Cohen 強制法の場合と同様の論法により、Levy 崩壊は κ -閉である：

補題 3.3. κ が正則基数なら、 $\text{Col}(\kappa, A)$ は κ -閉であり、特に κ 以下の基数を保つ。

演習 3.1. 上を示せ。

実際に Levy 崩壊により A の濃度が κ 以下になることが以下の補題によりわかる：

補題 3.4. κ : 正則、 $G : (V, \text{Col}(\kappa, A))$ -生成的なら、 $\bigcup G$ は κ から A への全射で、従って $|A|^{V[G]} \leq \kappa$ 。

証明 G を $(V, \text{Col}(\kappa, A))$ -生成的とすると、 $f_G := \bigcup G : \kappa \rightarrow A$ となることは Cohen 強制法の場合と同様に示せる。全射性を示す。

各 $a \in A$ に対し、以下の $D_a \subseteq \text{Col}(\kappa, A)$ は $\text{Col}(\kappa, A)$ で稠密である：

$$D_a := \{p \in \text{Col}(\kappa, A) \mid \exists \xi < \kappa \ p(\xi) = a\}.$$

なぜなら、 $p \in \text{Col}(\kappa, A)$ と $a \in A$ に対し、 $q := p \cup \{(\text{dom}(p), a)\}$ とすれば $q \in D_a$ かつ $q \leq p$ となるからである。よって、任意の $a \in A$ に対し、 $G \cap D_a \neq \emptyset$ が成り立つ。特に、 $f_G(\xi) = a$ となるような $\xi < \kappa$ が存在する。したがって、 f_G は A への全射である。 \square

よって、後は $\text{Col}(\kappa, {}^{<\kappa}2)$ が $\text{Add}(\kappa)$ に完備に埋め込めることが示せばよい：

補題 3.5. $\text{Col}(\kappa, {}^{<\kappa}2)$ は $\text{Add}(\kappa)$ に完備に埋め込まれる。

証明 $\langle -, - \rangle : \kappa \times \kappa \xrightarrow{\sim} \kappa$ を標準的な全単射として、写像 $e : \text{Col}(\kappa, {}^{<\kappa}2) \rightarrow \text{Add}(\kappa)$ を次で定める：

$$\begin{aligned}\text{dom}(e(p)) &:= \{ \langle \xi, \eta \rangle \mid \xi \in \text{dom}(p) \wedge \eta < \text{dom}(p(\xi)) \}, \\ e(p)(\langle \xi, \eta \rangle) &:= p(\xi)(\eta).\end{aligned}$$

すると、 e は明らかに順序単射である。

前章の補題 5.1 より、あとは任意の $r \in \text{Add}(\kappa)$ に対して、その簡約 $r^* \in \text{Col}(\kappa, {}^{<\kappa}2)$ で次を満たすものが存在することを示せばよい：

$$\forall p \in \text{Add}(\kappa) \quad [p \parallel r^* \implies e(p) \parallel r]. \quad (\star)$$

そこで $r \in \text{Add}(\kappa)$ を固定し、 $r^* \in \text{Col}(\kappa, {}^{<\kappa}2)$ を次で定める：

$$\begin{aligned}\text{dom}(r^*(\xi)) &:= \sup\{ \eta + 1 \mid \langle \xi, \eta \rangle \in \text{dom}(r) \} < \kappa, \\ r^*(\xi)(\eta) &:= \begin{cases} r(\langle \xi, \eta \rangle) & (\langle \xi, \eta \rangle \in \text{dom}(r)) \\ 0 & (\text{otherwise}) \end{cases}\end{aligned}$$

すると、 $p \parallel r^*$ としたとき、 $s := p \cup r^*$ とおけば、 $e(s) \leq e(p), r$ となり、 $e(p) \parallel r$ を得る。 \square

演習 3.2. ここでは Levy 崩壊を完備に埋め込む事で $\text{Add}(\kappa)$ が κ から ${}^{<\kappa}2$ への全射を付加することを見た。一方で、単純に $\text{Add}(\kappa)$ の稠密集合を ${}^{<\kappa}2$ の各元に対して作ってやり、 $\text{Add}(\kappa)$ -生成的な G から細工して全射を創り出すこともできる。

この方法で CH の無矛盾性を証明してみよ。また、今回した議論との対応関係を考察してみよ。

4 ZFC + $\neg\text{CH}$ の無矛盾性の証明

5 参考文献