

# Mathematik fürs Informatikstudium und Abitur: Eine Zusammenfassung

Konstantin Lukas

Fassung vom 11. Oktober 2021

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Mengen</b>	<b>5</b>
1.1	Definierte Zahlenmengen	6
1.2	Abbildungen	6
1.3	Kartesisches Produkt	8
1.4	Komplexe Zahlen	9
1.4.1	Darstellungsformen	11
1.4.2	Komplexe Zahlen potenzieren	12
1.4.3	Komplexe Zahlen radizieren	12
<b>2</b>	<b>Elementarmathematik</b>	<b>15</b>
2.1	Brüche dividieren	15
2.2	Lösungsmenge	15
2.3	Normalform	15
2.3.1	p-q-Formel	16
2.4	Intervalle	16
2.5	Beträge	16
2.6	Binomische Formeln	16
2.7	Euklidischer Algorithmus	16
2.8	Potenzgesetze	17
2.9	Wurzelgesetze	18
2.9.1	Wurzeltherme vereinfachen (Beispiele)	19
2.10	Logarithmusgesetze	19
<b>3</b>	<b>Gleichungen vereinfachen</b>	<b>20</b>
3.1	Quadratische Ergänzung	20
3.2	Faktorisieren	20
3.2.1	Faktorisierung durch Ausklammern	20
3.2.2	Faktorisierung mit binomischen Formeln	21
3.2.3	Faktorisierung mit dem Satz von Viëta	21
3.3	Substitution	21
<b>4</b>	<b>Ungleichungen</b>	<b>22</b>
4.1	Rechenregeln	22
4.2	Quadratische Ungleichungen	22
4.3	Ungleichungen mit Beträgen	23


4.4	Ungleichungen mit Variable im Nenner – Teil I . . . . .	23
4.5	Ungleichungen mit Variable im Nenner – Teil II . . . . .	24
<b>5</b>	<b>Lineare Gleichungssysteme . . . . .</b>	<b>27</b>
5.1	Einsetzungsverfahren . . . . .	27
5.2	Additionsverfahren . . . . .	28
5.3	Gauß-Verfahren . . . . .	29
5.4	Lineare Gleichungssysteme mit Parameter . . . . .	29
5.5	Erweiterte Koeffizientenmatrix . . . . .	30
5.6	Lösbarkeit von linearen Gleichungssystemen . . . . .	31
<b>6</b>	<b>Geometrie . . . . .</b>	<b>32</b>
6.1	Rechtwinklige Dreiecke . . . . .	32
6.1.1	Kathetensatz . . . . .	32
6.1.2	Höhensatz . . . . .	32
6.1.3	Sinus, Kosinus und Tangens . . . . .	32
6.2	Rechnen mit Flächen (Formeln) . . . . .	33
6.2.1	Dreieck . . . . .	33
6.2.2	Kreis . . . . .	33
6.3	Rechnen mit Körpern (Formeln) . . . . .	34
6.3.1	Prisma . . . . .	34
6.3.2	Pyramide . . . . .	34
6.3.3	Zylinder . . . . .	34
6.3.4	Kegel . . . . .	35
<b>7</b>	<b>Vektorgeometrie . . . . .</b>	<b>36</b>
7.1	Rechnen mit Vektoren . . . . .	37
7.2	Geraden . . . . .	39
7.3	Ebenen . . . . .	40
7.4	Umwandeln von Ebenengleichungen . . . . .	41
7.5	Lagebeziehungen . . . . .	43
7.5.1	Punkt – Punkt . . . . .	43
7.5.2	Punkt – Gerade/Ebene . . . . .	43
7.5.3	Gerade – Gerade/Ebene . . . . .	43
7.5.4	Ebene – Ebene . . . . .	44
7.6	Linearkombination . . . . .	45
7.7	Lineare Abhängigkeit . . . . .	46
<b>8</b>	<b>2D-Koordinatensystem . . . . .</b>	<b>48</b>
8.1	Allgemeines . . . . .	48
8.1.1	Monotonie . . . . .	48
8.1.2	Umkehrbarkeit . . . . .	48
8.1.3	Besondere Stellen . . . . .	49
8.1.4	Symmetrie . . . . .	50
8.1.5	Newtonverfahren . . . . .	50
8.2	Potenz- und Wurzelfunktionen . . . . .	51
8.2.1	Wurzelgleichungen . . . . .	52
8.2.2	Wurzelgleichungen mit mehreren Wurzeln (Beispiel) . . . . .	53
8.3	Betragsfunktionen . . . . .	53
8.3.1	Betragsgleichungen mit mehreren Beträgen . . . . .	54
8.4	Ganzrationale Funktionen . . . . .	56

8.4.1	Lösen durch Substitution . . . . .	57
8.4.2	Lösen durch Faktorisierung . . . . .	58
8.4.3	Lösen mit binomischen Formeln . . . . .	59
8.4.4	Lösen durch Polynomdivision . . . . .	59
8.4.5	Grenzverhalten von ganzrationalen Funktionen . . . . .	60
8.5	(Gebrochen)rationale Funktionen . . . . .	61
8.6	Exponentialfunktionen . . . . .	62
8.6.1	Lösen von Exponentialgleichungen . . . . .	63
8.7	Logarithmusfunktionen . . . . .	63
8.7.1	Lösen von Logarithmusgleichungen . . . . .	63
8.8	Trigonometrische Funktionen . . . . .	64
8.9	Verkettete Funktionen . . . . .	65
8.10	Kreisgleichungen . . . . .	65
<b>9</b>	<b>Differenzialrechnung . . . . .</b>	<b>67</b>
9.1	Die Ableitung . . . . .	67
9.1.1	Differenzenquotient . . . . .	68
9.1.2	Differentialquotient . . . . .	68
9.1.3	Extrem- und Wendepunkte . . . . .	69
9.2	Limes: Der Grenzwert . . . . .	70
9.3	Differenzierbarkeit . . . . .	71
9.3.1	Stetige Erweiterung . . . . .	72
9.4	Tangentengleichung . . . . .	73
9.5	Kurvendiskussion . . . . .	74
9.5.1	Symmetrie . . . . .	74
9.5.2	Nullstellen . . . . .	74
9.5.3	Schnittpunkt mit y-Achse . . . . .	75
9.5.4	Grenzverhalten . . . . .	75
9.5.5	Extrema . . . . .	76
9.5.6	Wendepunkte . . . . .	77
9.5.7	Tangentengleichungen der Wendepunkte . . . . .	78
9.5.8	Flächenberechnung . . . . .	79
<b>10</b>	<b>Integralrechnung . . . . .</b>	<b>80</b>
10.1	Die Stammfunktion . . . . .	81
10.2	Partielle Integration . . . . .	82
10.3	Integration durch Substitution . . . . .	83
10.4	Die Fläche zwischen zwei Graphen . . . . .	84
10.5	Rotationsvolumen . . . . .	85
<b>11</b>	<b>Logik . . . . .</b>	<b>87</b>
11.1	Beweise . . . . .	87
11.1.1	Direkter Beweis . . . . .	88
11.1.2	Indirekter Beweis . . . . .	88
11.1.3	Vollständige Induktion . . . . .	89
<b>12</b>	<b>Stochastik . . . . .</b>	<b>90</b>
12.1	Kombinatorik . . . . .	90
12.1.1	Permutation mit Wiederholung . . . . .	91
12.1.2	Permutation ohne Wiederholung . . . . .	91
12.1.3	Variation mit Wiederholung . . . . .	92

12.1.4	Variation ohne Wiederholung . . . . .	92
12.1.5	Kombination mit Wiederholung . . . . .	93
12.1.6	Kombination ohne Wiederholung . . . . .	93
12.2	Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen . . . . .	94
12.2.1	Binomialverteilung . . . . .	94
12.2.2	Hypergeometrische Verteilung . . . . .	95
12.3	Bedingte Wahrscheinlichkeit . . . . .	95
12.4	Diskrete Zufallsvariablen . . . . .	98
12.4.1	Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung . . . . .	99
<b>13</b>	<b>Modul: Lineare Algebra . . . . .</b>	<b>102</b>
<b>14</b>	<b>Modul: Analysis I . . . . .</b>	<b>103</b>
<b>15</b>	<b>Modul: Angewandte Mathematik für die Informatik . . . . .</b>	<b>104</b>
<b>16</b>	<b>Übungsaufgaben . . . . .</b>	<b>105</b>
16.1	Beweise . . . . .	105
16.1.1	Aufgabe A . . . . .	105
16.1.2	Aufgabe B . . . . .	105
16.1.3	Aufgabe C . . . . .	105

# 1 Mengen

## Vereinigung




$$A \cup B := \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

## Durchschnitt



$$A \cap B := \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

## Differenz



$$A \setminus B := \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

## Symmetrische Differenz



$$A \triangle B := \{x \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$$

$$A \triangle B := \{x \mid (x \in A) \leftrightarrow (x \in B)\}$$

## Noch ein paar Notationsnormen:

Anzahl der Elemente in einer Menge (Mächtigkeit):  $|M| = x$

Echte Teilmenge N von M:  $N \subsetneq M$

Teilmenge N von M, die gleich M sein kann:  $N \subseteq M$

Die Potenzmenge einer Menge  $M = \{1; 2\}$  beinhaltet alle möglichen Teilmengen von  $M$ :  
 $\mathfrak{P}(M) = \{\emptyset; \{1\}; \{2\}; \{1; 2\}\}.$

Das Komplement einer Menge  $M$  in einem Universum  $U$  enthält alle Elemente, die nicht in  $M$  sind, aber im Universum  $U$  existieren. Sind das Universum z.B. die natürlichen Zahlen, so gilt:  
 $M^C = \bar{M} = \mathbb{N} \setminus M.$

## 1.1 Definierte Zahlenmengen

### Natürliche Zahlen

$$\mathbb{N} = \{1; 2; 3; \dots\}$$

### Natürliche Zahlen mit Null

$$\mathbb{N}_0 = \{0; 1; 2; 3; \dots\}$$

### Ganze Zahlen

$$\mathbb{Z} = \{\dots; -2; -1; 0; 1; 2; 3; \dots\}$$

### Irrationale Zahlen

$$\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

### Reelle Zahlen

Die reellen Zahlen  $\mathbb{R}$  umfassen die rationalen und irrationalen Zahlen.

### Rationale Zahlen

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$$

## 1.2 Abbildungen

Abbildungen ordnen jedem Wert einer Menge  $X$  genau einen Wert aus der Menge  $Y$  mithilfe einer Vorschrift  $f$  zu. In der Analysis kommen Abbildungen in Form von Funktionen zum Einsatz. Man findet sie aber auch in der Geometrie, Stochastik oder der linearen Algebra. Die Notation ist wie folgt:


$$f : X \rightarrow Y, x \mapsto f(x)$$

Dabei ist  $X$  der *Definitionsbereich* und  $Y$  der *Zielbereich* von  $f$ .

Wenn die Definition einer Abbildung erfüllt ist, spricht man auch von *wohldefiniert*. Die Abbildungsvorschrift  $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}, \frac{m}{n} \mapsto m$  wäre z.B. nicht wohldefiniert und damit auch keine Abbildung. Der Grund dafür ist, dass man für dasselbe Argument unterschiedliche Werte kriegen kann.  $\frac{1}{2}$  ist beispielsweise das gleiche wie  $\frac{2}{4}$ . Laut der Vorschrift, würden wir jedoch 1 und 2 als Werte kriegen. Damit ist jedem Wert der Definitionsmenge mehr als ein Wert der Zielmenge zugewiesen. Wenn man das Argument wie hier auf verschiedene Weisen darstellen kann, spricht man dabei von Repräsentanten. Ist jedem Repräsentanten dasselbe Element des Zielbereiches zugewiesen, sagt man, die Zuordnung ist *repräsentantenunabhängig*. Diese Unabhängigkeit ist Voraussetzung für Wohldefiniertheit, jedoch muss man auch noch überprüfen, ob die Abbildungsvorschrift für alle Elemente des Definitions- und Zielbereichs funktioniert.


Die Teilmenge des Zielbereichs, die durch die gegebenen Werte aus dem Definitionsbereich erzeugt wird, nennt man Bild von  $X$  unter  $f$ .

$$\text{Im}(f) = \text{Bild}(f) = f(X) := \{f(x) \mid x \in X\}$$



Im Gegensatz dazu existiert auch noch das Urbild. Das ist die Menge der Werte des Definitionsbereiches, die die Werte einer Teilmenge  $M$  des Zielbereichs erzeugen.


$$f^{-1}(M) := \{x \in X \mid f(x) \in M\}$$




Eine besondere Art von Abbildung ist die identische Abbildung oder auch einfach Identität. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die genau ihr Argument zurückgibt.  $\text{id}_{\mathbb{R}} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$  ist z.B. die identische Abbildung auf den reellen Zahlen.

Es gibt drei sehr wichtige Begriffe für Abbildungen: Injektivität, Surjektivität und Bijektivität. Diese sind wie folgt definiert:


**Surjektiv** bedeutet, dass jedes Element der Zielmenge ein nichtleeres Urbild hat.



**Injektiv** bedeutet, dass jedes Element der Zielmenge höchstens ein Urbild hat.



**Bijektiv** bedeutet, die Funktion sowohl surjektiv als auch injektiv ist.




Hinweis: Für die Begriffe injektiv, surjektiv und bijektiv, gibt es noch eine Erklärung im Kapitel zur [Umkehrbarkeit](#) (S. 48).

### 1.3 Kartesisches Produkt

Hat man ein Zahlenpaar, wie eine 2D-Koordinate  $(x; y)$ , so spricht man von einem geordneten Paar, denn die Reihenfolge der Zahlen ist relevant. Wenn man zwei Mengen  $A$  und  $B$  hat, dann nennt man die Menge aller möglichen Paare  $(x, y)$  mit  $x$  aus  $A$  und  $y$  aus  $B$  das kartesische Produkt der Mengen  $A$  und  $B$ . Die entsprechende Notation dafür ist  $A \times B$ . Wenn  $A$  und  $B$




gleich sind, schreibt man stattdessen auch  $A^2$ . Obwohl hier von einem Produkt die Rede ist, ist es nicht egal, wie herum man die Faktoren schreibt.  $A \times B$  ist nicht das Gleiche, wie  $B \times A$ .



Hinweis: Wenn man das kartesische Produkt in ein Koordinatensystem einzeichnet, verwendet man gestrichelte Linien, um zu zeigen, dass der jeweilige Wert genau nicht mehr Teil des kartesischen Produktes ist.

## 1.4 Komplexe Zahlen

Mit den reellen Zahlen war es uns bisher nicht möglich die Gleichung  $x^2 = -1$  zu lösen. Deshalb gibt es den Zahlenbereich  $\mathbb{C}$  der komplexen Zahlen. Darin wird  $i := \sqrt{-1}$  definiert.  $i$  alleine ist aber noch nicht unbedingt eine komplexe Zahl, denn  $i := \sqrt{-1}$  alleine hilft uns immer noch nicht z.B.  $x^2 = -9$  zu lösen. Um also verschiedene Gleichungen zu lösen, gibt es eine andere Notationsform: Eine komplexe Zahl hat die Form  $z = a + b \cdot i$ , wobei  $a$  und  $b$  reelle Zahlen sind. Dabei wird  $a$  als *Realteil*,  $b$  als *Imaginärteil*,  $i$  als *imaginäre Einheit* und  $b \cdot i$  als *imaginäre Zahl* bezeichnet. Anders als die reellen Zahlen werden die komplexen Zahlen nicht auf einem Zahlenstrahl dargestellt, sondern der Zahlenstrahl der reellen Zahlen wird noch um die Achse des Imaginärteils erweitert. Dieses System nennt man auch *gaußsche Zahlenebene*. Da  $i$  eine definierte Einheit (also immer gleich) ist, können wir mit den reellen Zahlen  $a$  und  $b$  die komplexen Zahlen als **Vektoren** (S. 36) darstellen. Das Praktische daran ist, dass wir die komplexen Zahl aus dieser Ebene ganz einfach ablesen können.



Für die kartesische Form ( $z = a + b \cdot i$ ) gelten alle gängigen Rechengesetze. Es gibt jedoch auch etwas neues, das sich *komplexe Konjugation* nennt. Das klingt komplizierter als es ist, denn

man dreht nur das Vorzeichen der imaginären Zahl um schreibt zur Markierung einen Strich über die Zahl:  $z = a + b \cdot i \Rightarrow \bar{z} = a - b \cdot i$ . Was beim Rechnen mit komplexen Zahl besonders interessant ist, ist wie wir damit wieder auf reelle Zahlen kommen. Da  $i = \sqrt{-1}$  festgelegt ist, gilt somit auch  $i^2 = -1$ . Das heißt z.B., das Produkt aus  $1+i$  und  $-1-i$  ist  $-1-i-i-i^2 = -2i$ . Etwas schwieriger wird es bei der Division, da es durch das  $i$  schwer werden kann zurück auf die kartesische Form zu kommen. Dafür gibt es einen kleinen Trick, denn es gilt  $z \cdot \bar{z} = a^2 + b^2$ . Das kann man ganz einfach durch Nachrechnen allgemein prüfen:


$$\begin{aligned}
 z \cdot \bar{z} &= (a + b \cdot i) \cdot (a - b \cdot i) \\
 \Leftrightarrow &= a^2 - abi + abi - (bi)^2 \\
 \Leftrightarrow &= a^2 - abi + abi - b^2 i^2 \quad | \text{denk daran, dass } i^2 = -1 \text{ gilt} \\
 \Leftrightarrow &= a^2 - abi + abi + b^2 \\
 \Leftrightarrow &= a^2 + b^2
 \end{aligned}$$

Das ist übrigens auch der Betrag der Zahl bzw. die Länge des Vektors ins Quadrat, denn wir erinnern uns, die Länge eines Vektors beträgt  $\sqrt{a^2 + b^2}$ . Gut, aber wie hilft uns das jetzt zwei komplexe Zahlen zu dividieren? Nun, wenn wir in einer Gleichung mal Eins rechnen ist das ja eine Äquivalenzumformung, bzw. eigentlich verändern wir ja gar nichts wirklich, denn  $1 \cdot x$  ist  $x$ . Und was wollen erreichen? Dass im Nenner des Bruches kein  $i$  mehr steht. Das bedeutet für die Rechnung  $\frac{z_1}{z_2}$ , wir multiplizieren mit  $\frac{\bar{z}_2}{\bar{z}_2}$ . Dazu ein praktisches Beispiel:

$$\begin{aligned}
 \frac{2+9i}{3-6i} &= \frac{2+9i}{3-6i} \cdot \frac{3+6i}{3+6i} \\
 \Leftrightarrow &= \frac{(2+9i) \cdot (3+6i)}{(3-6i) \cdot (3+6i)} \\
 \Leftrightarrow &= \frac{6+12i+27i+54i^2}{3^2+6^2} \\
 \Leftrightarrow &= \frac{-48+39i}{45} \\
 \Leftrightarrow &= -\frac{16}{15} + \frac{13}{15}i
 \end{aligned}$$


### 1.4.1 Darstellungsformen

#### Kartesische Form



$$z = a + b \cdot i$$

#### Polarform



$$z = r \cdot (\cos \phi + i \cdot \sin \phi) = r \cdot e^{i\phi}$$

Bis hierhin haben wir die kartesische Form benutzt, die uns ganz einfach die Koordinaten in der gaußschen Zahlenebene ablesen lässt. Eine komplexe Zahl lässt sich jedoch auch auf andere Weise genau festlegen, nämlich mit der *Polarform*. Dabei wird die Zahl durch die Länge des Vektors und dem Winkel zwischen Abszisse und Vektor festgelegt.

Hinweis:  $r \cdot (\cos \phi + i \cdot \sin \phi)$  wird auch trigonometrische Darstellung und  $r \cdot e^{i\phi}$  auch als Exponentialdarstellung der Polarform bezeichnet.  $\phi$  wird auch als Argument der Zahl  $z$  bezeichnet.

Natürlich gibt es auch Regeln, wie man zwischen kartesischer und Polarform umwandeln kann. Größtenteils sind diese sehr einfach, da sie sich aus dem Rechnen mit dem **rechtwinkligen Dreieck** (S. 32) herleiten, jedoch ein kleiner Hinweis:  $\text{sgn}(b)$  (Signum) meint das Vorzeichen von  $b$  und  $\arccos$  ist dasselbe wie  $\cos^{-1}$  auf dem Taschenrechner.

Für die Umrechnung zwischen kartesischer Form und Polarform gelten folgende Gleichungen:

$$r = \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\phi = \text{sgn}(b) \cdot \arccos\left(\frac{a}{r}\right)$$

$$a = r \cdot \cos(\phi)$$

$$b = r \cdot \sin(\phi)$$

Noch mal der Hinweis, wie  $\text{sgn}$  definiert ist:

$$\text{sgn}(x) := \begin{cases} +1 & \text{falls } x > 0 \\ 0 & \text{falls } x = 0 \\ -1 & \text{falls } x < 0 \end{cases}$$

Der Grund dafür, dass wir hier das Vorzeichen benötigen, ist dass für den Kosinus in einem Intervall zwei Lösungen existieren. Die Kosinusfunktion hat z.B. bei  $\frac{\pi}{2}$  und bei  $\frac{3\pi}{2}$  eine Nullstelle. Das Vorzeichen hilft uns die richtige Lösung zu finden. Wenn wir nämlich  $-\frac{\pi}{2}$  rauskriegen, rechnen wir  $2\pi$  (eine Periode) drauf und erhalten  $\frac{3\pi}{2}$ .

### 1.4.2 Komplexe Zahlen potenzieren

Möchte man eine komplexe Zahl mit einer sehr hohen Zahl potenzieren, ist es ratsam, sie zunächst in die Polarform zu bringen. Das hat den Hintergrund, dass wir dann die [Potenzgesetze](#) (S. 17) anwenden können, allerdings nur, wenn die Potenz eine ganze Zahl ist. Dieser Zusammenhang wurde erstmals von Abraham de Moivre entdeckt und entsprechend benannt.

$$r^n \cdot e^{in\phi} = r^n \cdot (\cos(n\phi) + i \cdot \sin(n\phi))$$

#### Satz von de Moivre

$$(\cos(\phi) + i \cdot \sin(\phi))^n = \cos(n \cdot \phi) + i \cdot \sin(n \cdot \phi) = e^{in\phi} \text{ wenn } n \in \mathbb{Z}$$

Zur Anwendung dieser Formel, hier ein Beispiel:

$$\begin{aligned} z &= \left( \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}i \right)^{20} \\ r &= \sqrt{\left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2 + \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^2} \\ \Leftrightarrow &= 1 \\ \phi &= \operatorname{sgn} \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \cdot \arccos \left( \frac{\sqrt{2}}{2} \right) && | \text{Achtung: Bogenmaß verwenden!} \\ \Leftrightarrow &= -\frac{1}{4}\pi \\ z &= (1 \cdot e^{-\frac{1}{4}\pi i})^{20} \\ \Leftrightarrow &= e^{-5\pi i} = e^{\pi i} = \cos(\pi) + i \cdot \sin(\pi) = \underline{\underline{-1}} \end{aligned}$$

Das Ergebnis einer solchen Rechnung wird i.d.R. so gekürzt, dass der Winkel zwischen 0 und  $2\pi$  bzw.  $0^\circ$  und  $360^\circ$  liegt, indem man jeweils eine Umdrehung dazu rechnet oder abzieht ( $\pm 2\pi$  oder  $\pm 360^\circ$ ). Das hat den Hintergrund, dass eine Drehung des Vektors um mehr als  $360^\circ$  nur unnötig kompliziert wäre, denn man braucht in der Ebene nur maximal  $360^\circ$  und kann seinen Vektor in jede Richtung zeigen lassen.

### 1.4.3 Komplexe Zahlen radizieren

Wie wir wurzeln aus einer komplexen Zahl ziehen, können wir uns mit den [Potenzgesetzen](#) (S. 17) herleiten. Der große Unterschied zum Potenzieren mit einer ganzen Zahl ist, dass wir mehrere Ergebnisse erhalten. Beim Rechnen der  $n$ -ten Wurzel, gibt es  $n$  Ergebnisse um genau zu sein. Welchen Hintergrund das hat, schauen wir uns hier an. Anschließend folgt ein Beispiel. Hinweis: für dieses Kapitel solltest du das Kapitel zum [Potenzieren](#) (S. 12) von komplexen Zahlen gelesen haben.

Zunächst ist es wieder sehr hilfreich, die komplexe Zahl in der Polarform vorliegen zu haben. Außerdem wissen wir, dass wir beliebig oft um  $2\pi$  drehen können, weshalb wir zum Winkel  $\phi$  Umdrehungen der Anzahl  $k$  hinzufügen:  $2\pi k$ .

$$r \cdot e^{i\phi} = r \cdot e^{i(\phi+2\pi k)}$$


Wenn wir jetzt die  $n$ -te Wurzel ziehen sollen, erhalten wir:

$$\sqrt[n]{r \cdot e^{i(\phi+2\pi k)}}$$

Laut Potenzgesetze können wir das auch schreiben als:

$$\begin{aligned} & (r \cdot e^{i(\phi+2\pi k)})^{\frac{1}{n}} \\ &= r^{\frac{1}{n}} \cdot e^{i\frac{1}{n}(\phi+2\pi k)} \\ &= r^{\frac{1}{n}} \cdot e^{i\left(\frac{\phi}{n} + \frac{2\pi}{n}k\right)} \end{aligned}$$

Von Interesse ist die letzte Zeile. Das  $r$  lassen wir mal außen vor, da es für alle Ergebnisse gleich ist und die folgende Erklärung nur dem Winkel gelten soll. Wir haben ja in der Polarform in der Exponentialschreibweise normalerweise zu stehen  $i\phi$ . Jetzt wo wir unseren Term so umgeformt haben, ist unser Winkel  $\phi$  gleich  $\frac{\phi}{n} + \frac{2\pi}{n}k$ .



Was die obige Abbildung bedeutet ist folgendes: Der Term  $\frac{\phi}{n}$  bleibt konstant; er ist unser Startwinkel. In diesem Fall sind das 45 Grad. Jetzt addieren wir noch  $\frac{2\pi}{n}k$  dazu und das für jedes  $k$  zwischen 0 und  $n-1$ . In diesem Fall addieren wir jedes Mal 60 Grad drauf. Für  $k=1$  hätten wir z.B. einen Winkel von 105 Grad. So kriegen wir am Ende 6 verschiedene Lösungen, deren Beträge zwar alle gleich sind, aber deren Argumente (Winkel) sich unterscheiden.

Wie versprochen dazu noch ein Beispiel:

$$z^3 = 2 + 2i$$

$$r = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

$$\phi = \text{sgn}(2) \cdot \arccos\left(\frac{2}{2\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{4}\pi$$

$$\Downarrow$$

$$z^3 = 2\sqrt{2} \cdot e^{\frac{1}{4}\pi i}$$

$$\Rightarrow z = \sqrt[3]{2\sqrt{2} \cdot e^{\frac{1}{4}\pi i}} = \left(2\sqrt{2} \cdot e^{\frac{1}{4}\pi i}\right)^{\frac{1}{3}} = \sqrt{2} \cdot e^{i\left(\frac{\frac{1}{4}\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}\right)}$$

$$\Rightarrow z_k = e^{i\left(\frac{\frac{1}{4}\pi}{3} + \frac{2\pi}{3}k\right)}$$

$$\Downarrow$$

$$z_0 = \underline{\underline{\sqrt{2} \cdot e^{\frac{1}{12}\pi i}}}$$

$$z_1 = \underline{\underline{\sqrt{2} \cdot e^{\frac{3}{4}\pi i}}}$$

$$z_2 = \underline{\underline{\sqrt{2} \cdot e^{\frac{17}{12}\pi i}}}$$

## 2 Elementarmathematik

### 2.1 Brüche dividieren

Um zwei Brüche zu dividieren bildet man den Kehrwert vom Divisor und multipliziert diesen mit dem Dividenten.

$$\frac{p_1}{q_1} : \frac{p_2}{q_2} = \frac{p_1}{q_1} \cdot \frac{q_2}{p_2}$$

$$\frac{\frac{p_1}{q_1}}{\frac{p_2}{q_2}} = \frac{p_1}{q_1} \cdot \frac{q_2}{p_2}$$

### 2.2 Lösungsmenge

Beispiel 1 ( $x^2 = -1$ ):

$$\mathbb{L} = \emptyset$$

Beispiel 2 ( $x^2 = 4$ ):

$$\mathbb{L} = \{-2; 2\}$$


Beispiel 3 ( $\sin(x) = 0$ ):

$$\mathbb{L} = \{...; -2\pi; -\pi; 0; \pi; 2\pi; ...\}$$

Beispiel 4 ( $x^2 + y = 5$ ):

$$\mathbb{L} = \{(x_0; y_0) \in \mathbb{R}^2 \mid x_0^2 + y_0 = 5\} = \{(x_0; 5 - x_0^2) \mid x_0 \in \mathbb{R}\}$$

In diesem Fall ist die Lösungsmenge die Funktion  $y = 5 - x^2$ .



### 2.3 Normalform

Eine Gleichung in der Form  $ax^2 + bx + c = 0$  mit  $a \neq 0$  und  $b, c \in \mathbb{R}$ , heißt quadratisch. Speziell bezeichnet man  $x^2 + px + q = 0$  mit  $p, q \in \mathbb{R}$  als quadratische Gleichung in Normalform.

Man kann eine quadratische Gleichung in die Normalform überführen, indem man durch  $a$  teilt:  $x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$ .

### 2.3.1 p-q-Formel

Um die Nullstellen einer quadratischen Gleichung in der Normalform zu finden, kann man die p-q-Formel benutzen:  $x_{\pm} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$ .

$D = \left(\frac{p}{2}\right)^2 - q$  ist die Diskriminante. Sie gibt Aufschluss über die Lösungsmenge.

$D > 0 \Rightarrow$  Es gibt zwei Lösungen

$D = 0 \Rightarrow$  Es gibt eine Lösung

$D < 0 \Rightarrow$  Es gibt keine Lösungen

## 2.4 Intervalle

### Abgeschlossene Intervalle

$$[a; b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$$

### Offene Intervalle

$$(a; b) = ]a; b[ := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$$

### Halboffene Intervalle

Rechts offen

$$[a; b) = [a; b[ := \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$$

Links offen

$$(a; b] = ]a; b] := \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$$

## 2.5 Beträge

$$|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}$$

$$|-a| = |a|$$

## 2.6 Binomische Formeln

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

## 2.7 Euklidischer Algorithmus

Der euklidische Algorithmus findet den größten gemeinsamen Teiler zweier Zahlen. Das eignet sich ausgezeichnet dazu, Brüche zu kürzen. Der vorletzte Rest, also bevor  $R = 0$  eintritt, ist



das Ergebnis.

$$2160 : 2592 = 0 \quad R = 2160$$

$$2592 : 2160 = 1 \quad R = 432$$

$$2160 : 432 = 5 \quad R = 0$$

$$\frac{2592}{2160} = \frac{6 \cdot 432}{5 \cdot 432} = \frac{6}{5}$$

## 2.8 Potenzgesetze

$$a^k \cdot a^m = a^{k+m}$$

$$\frac{b^k}{b^m} = b^{k-m}$$

$$a^k \cdot b^k = (a \cdot b)^k$$

$$\frac{a^k}{b^k} = \left(\frac{a}{b}\right)^k$$

$$(a^k)^m = a^{k \cdot m}$$

Für  $a > 0$  und jede rationale Zahl  $\frac{p}{q}$  (mit  $p, q \in \mathbb{Z}$  und  $q > 0$ ) ist

$$a^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{a^p} = (\sqrt[q]{a})^p$$

Beispiel: Bestimme  $m$  und  $n$ , sodass gilt:  $(9x^7)^2 = mx^n$

$$(9x^7)^2 = mx^n$$

$$81x^{14} = mx^n$$

$$m = 81 \text{ und } n = 14$$

## 2.9 Wurzelgesetze

Für  $a, b, c \in \mathbb{R}$  mit  $a, b \geq 0, c > 0$  und  $m, n \in \mathbb{N}$  gilt

$$\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$$

$$\sqrt[n]{\frac{a}{c}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{c}}$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

Beispiel 1: Nach der dritten Binomischen Formel gilt für  $a, b > 0, a \neq b$ :

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} \quad | \cdot (\sqrt{a} - \sqrt{b}) \\ &= \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{(\sqrt{a} + \sqrt{b})(\sqrt{a} - \sqrt{b})} \\ &= \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt{a}^2 - \sqrt{b}^2} \\ &= \frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{a - b} \end{aligned}$$


---

Beispiel 2:

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{(1+a^2) \cdot (a-b)^2}}{\sqrt[4]{16(1+a^2)^2}} \\ &= \sqrt{\frac{(1+a)^2 \cdot (a-b)^2}{\sqrt{16(1+a^2)^2}}} \\ &= \sqrt{\frac{(1+a)^2 \cdot (a-b)^2}{4(1+a)^2}} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{(a-b)^2} \\ &= \frac{|a-b|}{2} \end{aligned}$$

### 2.9.1 Wurzeltherme vereinfachen (Beispiele)

$$\begin{aligned}
 \sqrt{2} + \frac{2}{2\sqrt{2}+3} &= \sqrt{2} + \frac{2 \cdot (2\sqrt{2}-3)}{(2\sqrt{2}+3)(2\sqrt{2}-3)} \\
 &= \sqrt{2} + \frac{4\sqrt{2}-6}{(2\sqrt{2})^2-3^2} \\
 &= \sqrt{2} + \frac{4\sqrt{2}-6}{-1} \\
 &= \sqrt{2} - 4\sqrt{2} + 6 \\
 &= \underline{\underline{6-3\sqrt{2}}}
 \end{aligned}$$

---


$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}-1} - \frac{1}{\sqrt{1+x^2}+1} &= \frac{\sqrt{1+x^2}+1}{(\sqrt{1+x^2}-1) \cdot (\sqrt{1+x^2}+1)} - \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{(\sqrt{1+x^2}+1) \cdot (\sqrt{1+x^2}-1)} \\
 &= \frac{(\sqrt{1+x^2}+1) - (\sqrt{1+x^2}-1)}{1+x^2-1} \\
 &= \frac{2}{\underline{\underline{x^2}}}
 \end{aligned}$$


---

Beispiel 3: Bestimme  $x$  und  $y$ , sodass  $\frac{x}{y}$  vollständig gekürzt ist.

$$\begin{aligned}
 \frac{2 \cdot 2^{\frac{5}{2}}}{2^{\frac{1}{4}}} &= 2^{\frac{x}{y}} \\
 2 \cdot \frac{2^{\frac{5}{2}}}{2^{\frac{1}{4}}} &= 2^{\frac{x}{y}} \\
 2 \cdot 2^{\frac{5}{2}-\frac{1}{4}} &= 2^{\frac{x}{y}} \\
 2 \cdot 2^{\frac{9}{4}} &= 2^{\frac{x}{y}} \\
 \underline{\underline{2^{\frac{13}{4}}}} &= \underline{\underline{2^{\frac{x}{y}}}}
 \end{aligned}$$

Damit gilt  $x = 13$  und  $y = 4$ .

## 2.10 Logarithmusgesetze

Die Logarithmusrechnung dient dazu, das  $x$  im Term  $b^x = a$  zu bestimmen. Es ist damit quasi das Gegenstück zur Potenzrechnung. Rechnen wir z.B.  $9^3$ , kommen wir auf 729. Umgekehrt können wir jetzt aber auch  $\log_9 729$  rechnen und kommen auf 3. Es gibt außerdem die speziellen Notationen  $\ln$  und  $\lg$ , die jeweils *natürlicher Logarithmus* und *dekadischer Logarithmus* genannt werden.

$$\ln(b) := \log_e(b)$$

$$\lg(b) := \log_{10}(b)$$

$$\log_b(b) = 1$$

$$\log_b(1) = 0$$

$$\log_b(u \cdot v) = \log_b(u) + \log_b(v) \quad \log_b\left(\frac{u}{v}\right) = \log_b(u) - \log_b(v)$$

$$\log_b(u^v) = v \cdot \log_b(u)$$

$$\log_b(\sqrt[u]{v}) = \frac{\log_b(v)}{u}$$

$$\log_a(v) = \frac{\log_b(v)}{\log_b(a)}$$

## 3 Gleichungen vereinfachen

### 3.1 Quadratische Ergänzung

Die äquivalente Umformung der quadratischen Gleichung in Normalform  $x^2 + px + q = 0$  in  $(x + \frac{p}{2})^2 = -q + (\frac{p}{2})^2$  wird als quadratische Ergänzung bezeichnet. In anderen Worten fügt man den Term  $+(\frac{p}{2})^2 - (\frac{p}{2})^2$  hinzu. Das darf man, da dieser Wert an sich Null ergibt und die Gleichung nicht verändert.

Beispiel:

$$\begin{aligned}x^2 + 8x + 7 &= 0 \\x^2 + 8x + \left(\frac{8}{2}\right)^2 - \left(\frac{8}{2}\right)^2 + 7 &= 0 \\x^2 + 8x + 4^2 - 4^2 + 7 &= 0 \\(x + 4)^2 - 4^2 + 7 &= 0 \\(x + 4)^2 - 9 &= 0 & | +9 \\(x + 4)^2 &= 9 & | \sqrt{\phantom{x}} \\x &= \pm\sqrt{9} - 4 \\L &= \{-1; -7\}\end{aligned}$$

### 3.2 Faktorisieren

Um die Nullstellen eines Terms zu finden, bietet es sich an, ihn als Produkt einfacher Terme zu schreiben, denn ist ein Faktor 0, ist das Produkt ebenfalls 0. Den Term in so eine Form zu überführen, nennt sich Faktorisieren.

#### 3.2.1 Faktorisierung durch Ausklammern

Beispiel:

$$\begin{aligned}x^4 + 2x^3 + 3x^2 &= 0 \\x^2(x^2 + 2x + 3) &= 0 \\x^2 &= 0 \text{ oder } (x^2 + 2x + 3) = 0 \\L &= \{0\}\end{aligned}$$

Für  $x^2 + 2x + 3 = 0$  existiert keine reelle Lösung  $\Rightarrow$  [p-q-Formel](#) (S. 16).

### 3.2.2 Faktorisierung mit binomischen Formeln

Beispiel:

$$\begin{aligned}9x^2 + 30x + 25 &= 0 \\(3x + 5)^2 &= 0 \\3x + 5 &= 0 & | -5 \\3x &= -5 & | : 3 \\x &= -\frac{5}{3} \\ \mathbb{L} &= \left\{ -\frac{5}{3} \right\}\end{aligned}$$

### 3.2.3 Faktorisierung mit dem Satz von Viëta

Der Satz von Viëta besagt, dass  $x^2 + px + q = (x - x_1) \cdot (x - x_2)$  ist.  $p$  und  $q$  lassen sich auf die Nullstellen zurückführen:  $x_1 + x_2 = -p$  und  $x_1 \cdot x_2 = q$ .

Daraus lässt sich  $x_2 = \frac{q}{x_1}$  ableiten. Wenn man also durch Raten eine Nullstelle findet, kann man so die andere Nullstelle auch ganz einfach finden.

Beispiel (eine Nullstelle ist 1, die andere ergibt sich als  $\sqrt{2} = \frac{\sqrt{2}}{1}$ ):

$$\begin{aligned}x^2 + (\sqrt{2} - 1)x - \sqrt{2} &= 0 \\(x - 1) \cdot (x + \sqrt{2}) &= 0 \\ \mathbb{L} &= \{1; -\sqrt{2}\}\end{aligned}$$

## 3.3 Substitution

Substitution erlaubt es uns manchmal Gleichungen zu vereinfachen, um leichter mit ihnen rechnen zu können.

Beispiel:  $x^8 - 15x^4 - 16 = 0$  (Hier bietet es sich an  $x^4$  durch  $u$  zu ersetzen.)

$$\begin{aligned}u^2 - 15u - 16 &= 0 \\u_{\pm} &= \frac{15}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-15}{2}\right)^2 + 6}\end{aligned}$$

Diesen Term wiederum können wir ganz einfach mit der [p-q-Formel](#) (S. 16) lösen. Dabei erhalten wir  $u_+ = 16$  und  $u_- = -1$ . Um unsere endgültige Lösungsmenge zu bekommen, müssen wir noch die Resubstitution durchführen.

$$\begin{aligned}x^4 &= u_+ = 16 \\x_1 &= 2 \\x_2 &= -2\end{aligned}$$

Da es kein  $x$  gibt, das  $x^4 = -1$  erfüllt, haben wir bereits unsere Lösungsmenge:  $\mathbb{L} = \{-2; 2\}$ .

## 4 Ungleichungen

### 4.1 Rechenregeln

Wenn man eine Ungleichung mit einer negativen Zahl multipliziert oder durch diese teilt, muss das Vergleichszeichen umgekehrt werden.


Für  $c < 0$  gilt:

$$a < b \iff c \cdot a > c \cdot b$$

$$a < b \iff \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$$

### 4.2 Quadratische Ungleichungen

Um die Lösungsmenge einer quadratischen Ungleichung zu finden, formt man die Ungleichung zunächst so um, dass auf einer Seite 0 steht. Auf der anderen Seite hat man dann optimalerweise eine quadratische Funktion. Schauen wir uns mal das Beispiel  $x^2 > 2x + 7$  an.



Wir stellen also zunächst um und erhalten  $x^2 - 2x - 7 > 0$ . Daraus ergibt sich auch die Funktion oben. An der Grafik erkennt man sehr gut, was wir eigentlich suchen. Denn unsere Lösungsmenge sind alle  $x$ , für die  $f(x)$  größer als 0 ist. Und wie kriegen wir das raus? Indem wir die Nullstellen berechnen. Das Intervall von Unendlich bis zur linken Nullstelle ist ein Teil unserer Lösung und der andere ist das Intervall von der rechten Nullstelle bis unendlich. Dabei muss man stets verschiedene Fälle beachten. Für eine nach unten geöffnete Funktion ( $-x^2$ ) suchen wir den Bereich zwischen den Nullstellen. Für eine Funktion oberhalb der  $x$ -Achse, die keine Nullstellen hat, sind alle reellen Zahlen unsere Lösungsmenge, wohingegen eine Funktion ohne Nullstellen unterhalb der  $x$ -Achse eine leere Lösungsmenge liefern würde. Eine quadratische Funktion mit genau einer Nullstelle liefert hingegen eine Lösungsmenge aller reellen Zahlen außer der Nullstelle. Es gibt je nach Art der Funktion und Vergleichszeichen in unserer Ungleichung viele unterschiedliche Szenarien, weshalb es immer ratsam ist eine Skizze anzufertigen. Für das Beispiel oben können wir die [p-q-Formel](#) (S. 16) verwenden, um die

Nullstellen zu berechnen.

$$x_{\pm} = -\frac{-2}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{-2}{2}\right)^2 + 7}$$

$$x_1 = \underline{\underline{1 - 2\sqrt{2}}}$$


$$x_2 = \underline{\underline{1 + 2\sqrt{2}}}$$

Jetzt, wo wir die Nullstellen haben, ist es nicht schwer die Lösungsmenge anzugeben. Dabei sollte man darauf achten, dass man abgeschlossene und offene [Intervalle](#) (S. 16) nicht verwechselt.

$$\mathbb{L} = \mathbb{R} \setminus \left[1 - 2\sqrt{2}; 1 + 2\sqrt{2}\right] = \left(-\infty; 1 - 2\sqrt{2}\right) \cup \left(1 + 2\sqrt{2}; \infty\right)$$

### 4.3 Ungleichungen mit Beträgen

Das Vorgehen bei Betragsungleichungen ist im Grunde genommen dasselbe Prinzip, wie bei den quadratischen. Schauen wir uns das Beispiel  $|x| - 3 < 0$  an.



Wir erkennen die Nullstellen in dem Fall sehr leicht. Das sind  $-3$  und  $3$ . Erkennt man das nicht sofort, muss man eine [Fallunterscheidung](#) (S. 53) durchführen. Jetzt können wir aber erst mal unsere Lösungsmenge definieren, denn wir wissen, dass wir alle  $x$  suchen für die  $f(x) < 0$  gilt.


$$\mathbb{L} = (-3; 3)$$

Hinweis: Wäre unsere Ausgangsungleichung  $|x| - 3 \leq 0$ , sehe unsere Lösungsmenge jetzt so aus:

$$\mathbb{L} = [-3; 3]$$

### 4.4 Ungleichungen mit Variable im Nenner – Teil I

Aus den vorherigen Erklärungen kann man sich herleiten, wie man das macht. Deshalb ist hier nur noch mal ein erklärendes Beispiel:  $2 \leq \frac{14}{|2x+5|}$ .



Wichtig ist, dass wir zunächst alle  $x$  ausschließen, für die im Nenner 0 rauskommt. In diesem Fall ist dass  $-\frac{5}{2}$ .

$$2 \leq \frac{14}{|2x+5|}$$

$$2|2x+5| \leq 14$$

$$|2x+5| \leq 7$$

Fall 1:  $2x+5 > 0$

$$2x+5 \leq 7$$

$$2x \leq 2$$

$$x \leq 1$$

Fall 2:  $2x+5 < 0$

$$-2x-5 \leq 7$$

$$-2x \leq 12$$

$$x \geq -6$$


$$\mathbb{L} = \left[-6; -\frac{5}{2}\right) \cup \left(-\frac{5}{2}; 1\right]$$

## 4.5 Ungleichungen mit Variable im Nenner – Teil II

Wenn wir uns an die [Rechenregeln](#) (S. 22) für Ungleichungen erinnern, könnte man sich fragen, was passiert, wenn der Nenner mit einer Variable sowohl positiv als auch negativ sein kann. Denn wenn wir mit einer negativen Zahl multiplizieren, müssten wir das Vorzeichen umkehren. Hier muss man wieder verschiedene Fälle unterscheiden.

Beispiel:  $\frac{1}{x-2} \leq -x$





Der Fall  $x = 2$  ist aufgrund des  $x$  im Nenner wieder auszuschließen. Fall 1:  $x > 2$

$$\frac{1}{x-2} \leq -x$$

$$1 \leq -x(x-2)$$

$$1 \leq -x^2 + 2x$$

$$x^2 - 2x + 1 \leq 0$$

$$(x-1)^2 \leq 0$$

Dieser Fall gilt für  $x = 1$ . Das widerspricht allerdings der Bedingung  $x > 2$  und das Ergebnis ist entsprechend nicht Teil unserer Lösungsmenge.

Fall 2:  $x < 2$

$$\frac{1}{x-2} \leq -x$$

$$1 \geq -x(x-2)$$

$$1 \geq -x^2 + 2x$$


$$x^2 - 2x + 1 \geq 0$$

$$(x-1)^2 \geq 0$$

Dieser Fall ist für alle  $x$  erfüllt, daher gehören alle  $x < 2$  zur Lösungsmenge.

$$\mathbb{L} = (-\infty; 2)$$

Beispiel:  $\frac{1}{x-9} \leq 8$



Fall 1:  $x > 9$

$$\frac{1}{x-9} \leq 8$$

$$1 \leq 8x - 72$$

$$8x \geq 73$$

$$x \geq \frac{73}{8}$$

Fall 2:  $x < 9$

$$\frac{1}{x-9} \leq 8$$

$$1 \geq 8x - 72$$

$$8x \leq 73$$

$$x \leq \frac{73}{8}$$

$$\mathbb{L} = (-\infty; 9) \cup \left[ \frac{73}{8}; \infty \right)$$

## 5 Lineare Gleichungssysteme

Ein Gleichungssystem ist eine Sammlung an Gleichungen, für die man eine gemeinsame Lösung sucht. Für das Beispiel unten, ist die Lösung  $x = 2, y = 3, z = -4$  oder anders ausgedrückt  $\mathbb{L} = \{(2; 3; -4)\}$ . Wie man darauf kommt, wird unten erklärt.

$$(I) \quad x + 2y + z = 4$$

$$(II) \quad x - y + \frac{3}{2}z = -7$$

$$(III) \quad -4x + 2y = -2$$

### 5.1 Einsetzungsverfahren

Eine Möglichkeit hat man, wenn man eine Funktion nach einer beliebigen Variable umstellt und diese dann in einer anderen Funktion einsetzt.

(III)

$$-4x + 2y = -2$$

$$-4x = -2 - 2y$$

$$x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}y$$

(I)

$$x + 2y + z = 4$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}y + 2y + z = 4$$

$$\frac{1}{2} + \frac{5}{2}y + z = 4$$

$$z = 3,5 - \frac{5}{2}y$$

(II)

$$x - y + \frac{3}{2}z = -7$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}y - y + \frac{3}{2}\left(3,5 - \frac{5}{2}y\right) = -7$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2}y - y + 5,25 - \frac{15}{4}y = -7$$

$$5,75 - \frac{1}{2}y - \frac{15}{4}y = -7$$

$$-\frac{17}{4}y = -\frac{51}{4}$$

$$y = 3$$

(III)

$$-4x + 2y = -2$$

$$-4x + 2 \cdot 3 = -2$$

$$-4x + 6 = -2$$

$$-4x = -8$$

$$x = 2$$

(I)

$$x + 2y + z = 4$$

$$2 + 2 \cdot 3 + z = 4$$

$$z = -4$$

## 5.2 Additionsverfahren

Eine andere Möglichkeit ist es, eine oder mehrere Gleichungen mit einer Zahl zu multiplizieren, sodass eine Variable entfällt, wenn man zwei Gleichungen addiert.

(I) - (III)

$$5x + z = 6$$

$$z = 6 - 5x$$

(I) + 2(II)

$$3x + 4z = -10$$

$$3x + 4(6 - 5x) = -10$$

$$3x + 24 - 20x = -10$$

$$-17x = -34$$

$$x = 2$$

(III)

$$-4x + 2y = -2$$

$$-4 \cdot 2 + 2y = -2$$

$$-8 + 2y = -2$$

$$2y = 6$$

$$y = 3$$

(I)

$$x + 2y + z = 4$$

$$2 + 2 \cdot 3 + z = 4$$

$$z = -4$$

Hinweis: sind zwei Gleichungen identisch, so gibt es unendlich viele Lösungen und man muss nur die entsprechende Notation für die Lösungsmenge kennen.

$$(I) \quad -4x - 2y = -14$$

$$(II) \quad 4x + 2y = 14$$

$$\mathbb{L} = \{(x; 7 - 2x) \mid x \in \mathbb{R}\}$$

### 5.3 Gauß-Verfahren

Das Gauß-Verfahren ist eine bestimmte Vorgehensweise fürs Additionsverfahrens, bei dem man die Gleichungen so umformt, dass man das LGS in die Stufenform bringt und es einfach lösen kann.

$$(I) \quad x + 2y + z = 4$$

$$(II) \quad x - y + \frac{3}{2}z = -7 \quad | -\frac{3}{2}(I)$$

$$(III) \quad -4x + 2y = -2$$

$$(I) \quad x + 2y + z = 4$$

$$(II) \quad -\frac{1}{2}x - 4y = -13$$

$$(III) \quad -4x + 2y = -2 \quad | +\frac{1}{2}(II)$$

$$(I) \quad x + 2y + z = 4$$

$$(II) \quad -\frac{1}{2}x - 4y = -13$$

$$(III) \quad -\frac{17}{4}x = -\frac{17}{2}$$

$$(III)$$

$$-\frac{17}{4}x = -\frac{17}{2}$$

$$x = 2$$

$$(II)$$

$$-\frac{1}{2}x - 4y = -13$$

$$-1 - 4y = -13$$

$$-4y = -12$$

$$y = 3$$

$$(I)$$

$$x + 2y + z = 4$$

$$2 + 6 + z = 4$$

$$z = -4$$

### 5.4 Lineare Gleichungssysteme mit Parameter

Kommt in einem LGS ein Parameter vor, dann muss man eine Fallunterscheidung vornehmen und den Parameter in die Lösungsmenge mit einbeziehen.

$$(I) \quad x - 2y = 0$$

$$(II) \quad y + \frac{1}{3}z = -1$$

$$(III) \quad (a - 3)y = 1$$

Wenn  $a = 3$ , dann kommt bei der letzten Gleichung  $0 = 1$  raus. Dadurch können wir schon mal sagen, was die Lösungsmenge für den Fall  $a = 3$  ist.

$$\mathbb{L} = \emptyset, \text{ falls } a = 3$$

Als nächstes schauen wir uns den Fall  $a \neq 3$  an.

(III)

$$(a - 3)y = 1$$

$$y = \frac{1}{a - 3}$$

(II)

$$\frac{1}{a - 3} + \frac{1}{3}z = -1$$

$$\frac{1}{3}z = -\frac{1}{a - 3} - 1$$

$$z = 3 \left( -\frac{1}{a - 3} - 1 \right)$$

$$z = -\frac{3}{a - 3} - \frac{3a - 9}{a - 3}$$

$$z = \frac{6 - 3a}{a - 3}$$

(I)

$$x - 2y = 0$$

$$x - 2 \left( \frac{1}{a - 3} \right) = 0$$

$$x = \frac{2}{a - 3}$$

$$\mathbb{L} = \left\{ \left( \frac{2}{a - 3}; \frac{1}{a - 3}; \frac{6 - 3a}{a - 3} \right) \right\}, \text{ falls } a \neq 3$$

## 5.5 Erweiterte Koeffizientenmatrix

Da die normale Notation von Gleichungssystemen wird oft schnell unübersichtlich. Man kann die Koeffizienten auch in eine Matrix schreiben. Das hat den Vorteil, dass man die Variablen nicht ständig schreiben muss und eine geordnete Anordnung der Elemente hat.

$$(I) \quad x + 2y + z = 4$$

$$(II) \quad x - y + \frac{3}{2}z = -7$$

$$(III) \quad -4x + 2y = -2$$

Dieses Gleichungssystem kann man jetzt auch so schreiben:

$$\begin{array}{l} (I) \\ (II) \\ (III) \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & \frac{3}{2} & -7 \\ -4 & 2 & 0 & -2 \end{array} \right)$$

Man kann Zeilen und Spalten vertauschen, wenn es praktisch ist, muss aber beim Vertauschen von Spalten darauf achten, die richtigen Variablen am Ende hinzuschreiben, sollte man das Gleichungssystem noch mal in der Form mit Variablen angeben, die man an der letzten Zeile der Stufenform erkennen kann.

## 5.6 Lösbarkeit von linearen Gleichungssystemen

Man kann die Anzahl der Lösungen für ein LGS sehr einfach feststellen in dem man es in die Stufenform bringt. Dabei gibt es drei Szenarios.

### 1. Szenario: Eine Lösung

$$\begin{array}{l} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{array} \right)$$

### 2. Szenario: Keine Lösung

$$\begin{array}{l} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array} \right)$$

### 3. Szenario: Unendlich viele Lösung

$$\begin{array}{l} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Hat ein Gleichungssystem unendliche viele Lösungen, ersetzt man eine der Variablen durch einen Parameter und macht die Lösung davon abhängig.

$$\begin{array}{l} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} 4 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad | -\frac{1}{2} \cdot \text{(II)}$$

$$\begin{array}{l} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} 4 & 0 & -\frac{3}{2} & 3 \\ 0 & 4 & 9 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Jetzt legt man fest, dass  $z$  bzw.  $x_3$  je nachdem, wie man es nennen will, gleich  $\lambda$  ist und gibt die Lösungsmenge an, indem man nach  $x$  und  $y$  umstellt.



$$\mathbb{L} = \left\{ \left( \frac{3}{8}\lambda + \frac{3}{4}; \frac{1}{2} - \frac{9}{4}\lambda; \lambda \right) \mid \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

Alternativ kann man das auch als Geradengleichung angeben.

$$\mathbb{L} = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mid \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} \frac{3}{8} \\ -\frac{9}{4} \\ 1 \end{pmatrix}, \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$

## 6 Geometrie

### 6.1 Rechtwinklige Dreiecke



#### 6.1.1 Kathetensatz

Im rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über einer Kathete flächengleich zu dem Rechteck aus der Hypotenuse und dem der Kathete anliegenden Hypotenusenabschnitt.

$$b^2 = p \cdot c$$

$$a^2 = q \cdot c$$

#### 6.1.2 Höhensatz

Im rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über der Höhe flächengleich zu dem Rechteck aus den beiden Hypotenusenabschnitten.

$$h^2 = p \cdot q$$

#### 6.1.3 Sinus, Kosinus und Tangens

$$\sin(\alpha) = \frac{a}{c} = \frac{\text{Gegenkathete von } \alpha}{\text{Hypotenuse}}$$

$$\cos(\alpha) = \frac{b}{c} = \frac{\text{Ankathete von } \alpha}{\text{Hypotenuse}}$$

$$\tan(\alpha) = \frac{a}{b} = \frac{\text{Gegenkathete von } \alpha}{\text{Ankathete von } \alpha} = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$$



Um mit [trigonometrischen Funktionen](#) (S. 64) umgehen zu können, hilft es außerdem einige Regeln zu kennen, die beim Vereinfachen und Umformen von trigonometrischen Termen helfen.

### **Sinus, Kosinus und Tangens Umformen und Vereinfachen**

$$\cos(-x) = \cos(x)$$

$$\sin(-x) = -\sin(x)$$

$$\tan(-x) = -\tan(x)$$

$$\cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = -\sin(x)$$

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos(x)$$

$$\tan\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{\tan(x)}$$

$$\cos(x + \pi) = -\cos(x)$$

$$\sin(x + \pi) = -\sin(x)$$

$$\tan(x + \pi) = \tan(x)$$

## **6.2 Rechnen mit Flächen (Formeln)**

### **6.2.1 Dreieck**

Für ein Dreieck mit der Grundseite  $c$  und der Höhe  $h_c$  gilt:

$$F = \frac{1}{2} \cdot c \cdot h_c$$

### **6.2.2 Kreis**

Für einen Kreis mit dem Radius  $r$ , dem Umfang  $U$  und der Fläche  $F$  gilt:

$$U = 2\pi r$$

$$F = \pi r^2$$

Für einen Kreissektor mit dem Radius  $r$ , der Bogenlänge  $b$ , der Fläche  $F$  und dem Winkel  $\alpha$  gilt:

$$F = \frac{br}{2}$$

Für ein Kreissegment mit dem Radius  $r$ , der Bogenlänge  $b$ , der Fläche  $F$  und dem Winkel  $\alpha$  gilt:

$$F = \frac{br}{2} - \frac{1}{2}r^2 \cdot \sin(\alpha)$$

## 6.3 Rechnen mit Körpern (Formeln)

### 6.3.1 Prisma

Für ein Prisma mit der Mantelfläche  $M$ , der Grundfläche  $A$ , dem Grundflächenumfang  $U$ , der Oberfläche  $O$ , dem Volumen  $V$  und der Höhe  $h$  gilt:

$$V = A \cdot h$$

$$M = U \cdot h$$

$$O = 2 \cdot A + M$$

### 6.3.2 Pyramide

Für eine Pyramide mit der Mantelfläche  $M$ , der Grundfläche  $A$ , der Oberfläche  $O$ , dem Volumen  $V$  und der Höhe  $h$  gilt:

$$V = \frac{1}{3} \cdot A \cdot h$$

$$O = 2 \cdot A + M$$

### 6.3.3 Zylinder

Für einen Zylinder mit der Grundfläche  $A$ , dem Radius der Grundfläche  $r$ , der Oberfläche  $O$ , dem Volumen  $V$  und der Höhe  $h$  gilt:

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Für einen geraden Zylinder gilt außerdem:

$$O = 2\pi r \cdot (r + h)$$

#### 6.3.4 Kegel

Für einen Kegel mit der Grundfläche  $A$ , dem Radius der Grundfläche  $r$ , der Oberfläche  $O$ , dem Volumen  $V$ , dem Abstand der Spitze zu einem Punkt der Kreislinie  $s$  und der Höhe  $h$  gilt:

$$V = \frac{1}{3}\pi \cdot r^2 \cdot h$$

Für einen geraden Kegel gilt außerdem:

$$s = \sqrt{h^2 + r^2}$$

$$O = \pi r \cdot (r + s)$$

## 7 Vektorgeometrie

Vektoren kommen häufig in der Physik zum Einsatz, denn oftmals interessieren wir uns nicht nur für eine Größe an sich, sondern auch für ihre Richtung. Vektoren werden durch Pfeile gekennzeichnet  $\vec{v}$ , ihr Betrag  $|\vec{v}|$  gibt uns ihre Länge. Wenn zwei gleichlange Vektoren in genau die entgegengesetzte Richtung zeigen ( $\vec{v}$  und  $-\vec{v}$ ), sprechen wir von *Gegenvektoren*. Ein Vektor mit der Länge Null, wird auch als *Nullvektor* bezeichnet. Neben Vektoren, sind Pfeile ein wichtiger Begriff. Diese werden definiert durch ihren Anfangspunkt sowie, ihrem Endpunkt bzw. ihrer Länge und Richtung. Alle Pfeile der selben Länge und Richtung können in einer *Pfeilklass*e zusammengefasst werden. Vektoren können als Pfeilklassen interpretiert werden, denn sie werden nicht durch ihren Anfangspunkt definiert, sondern nur durch Richtung und Länge. Vektoren können jedoch einen festen Anfangspunkt besitzen. In diesem Fall spricht man von *gebundenen Vektoren*, andernfalls von *freien Vektoren*. Außerdem existiert eine besondere Art von gebundenen Vektoren, die sogenannten *Ortsvektoren*, die ihren Anfangspunkt im Koordinatenursprung haben. Der Koordinatenursprung wird mit  $O = (0; 0)$  bezeichnet.

Vektoren werden folgendermaßen notiert:

$$\text{2D: } \overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} Q_x - P_x \\ Q_y - P_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\text{3D: } \overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} Q_x - P_x \\ Q_y - P_y \\ Q_z - P_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$


Diese Notation dient dazu sie von Punkten zu unterscheiden. Man spricht hierbei von *Spaltenvektoren*.

Die Länge eines Vektors können wir mithilfe des Satz des Pythagoras berechnen, denn wir können einen Vektor auch als Hypotenuse eines rechtwinkligen Dreiecks sehen, bei dem die Katheten die  $x$ - und  $y$ -Werte sind.

Für die Berechnung der Länge eines Vektors gelten folgende Formeln:


$$\text{2D: } |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$\text{3D: } |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$




## 7.1 Rechnen mit Vektoren


Wenn wir Vektoren addieren wollen, können wir das ganz einfach tun, indem wir ihre jeweiligen Werte miteinander addieren. Die untere Abbildung zeigt, dass es egal ist, in welcher Reihenfolge wir das tun und auch, dass die Position von Vektoren keine Rolle spielt.



Ebenso können wir Vektoren ganz einfach mit einer Zahl (Skalar) multiplizieren. Dabei spricht man von *skalarer Multiplikation*. Dabei können sagen, dass zwei Vektoren parallel sind, wenn es ein  $\lambda$  gibt, welches  $\lambda \cdot \vec{c} = \vec{w}$  erfüllt. Das gilt jedoch nicht für den Nullvektor.



Neben der Multiplikation mit einer Zahl, können wir auch zwei Vektoren miteinander multiplizieren. Das ist das Skalarprodukt, welches man nicht mit skalarer Multiplikation verwechseln sollte. Das Skalarprodukt kann man benutzen, um die Länge von Vektoren sowie, den Winkel zwischen ihnen zu bestimmen. Insbesondere gilt: Wenn das Skalarprodukt gleich Null ist, dann haben wir einen rechten Winkel und die Vektoren sind orthogonal bzw. liegen senkrecht aufeinander. Das Skalarprodukt heißt übrigens so, weil unser Ergebnis ein Skalar ist.



Wenn das Skalarprodukt nicht Null ist, können wir trotzdem den Winkel bestimmen, es ist nur etwas komplizierter. Dafür rechnet man das Skalarprodukt durch das Produkt der beiden Vektorlängen und erhält damit den Kosinuswert.

### Winkelberechnung zwischen Vektoren

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{v} \cdot \vec{w}}{|\vec{v}| \cdot |\vec{w}|}$$

Nehmen wir dazu das Beispiel  $\begin{pmatrix} -8 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1,5 \end{pmatrix}$ .

$$\begin{aligned} \cos(\alpha) &= \frac{\begin{pmatrix} -8 \\ 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 1,5 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} 4 \\ 1,5 \end{pmatrix} \right|} \\ &= \frac{-27,5}{\sqrt{73} \cdot \frac{\sqrt{73}}{2}} \\ &= \frac{-27,5}{\frac{73}{2}} \\ &= -\frac{55}{73} \\ &\Rightarrow \alpha \approx \underline{\underline{138,9^\circ}} \end{aligned}$$

Achtung: Achte darauf, dass du im Taschenrechner das Gradmaß und nicht das Bogenmaß eingestellt hast!

Mit dem Skalarprodukt finden wir alternativ zum Satz des Pythagoras auch die Länge eines Vektors, denn es gilt  $\vec{v} \cdot \vec{v} = |\vec{v}|^2$ . Wenn wir also das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selber bilden und anschließend die Wurzel vom Betrag des Skalarproduktes ziehen, erhalten wir die Länge des Vektors.


Beispiel:

$$\begin{aligned} \left| \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} \right|^2 &= 17 \\ \Rightarrow \sqrt{17} &\approx \underline{\underline{4,123}} \end{aligned}$$

Hinweis: All die oben genannten Rechengesetze, wie z.B. das Skalarprodukt lassen sich im dreidimensionalen Raum genauso anwenden wie im zweidimensionalen.

Neben dem Skalarprodukt gibt es noch eine Möglichkeit das Produkt aus zwei Vektoren zu bilden, nämlich das sogenannte *Kreuzprodukt*. Mit dem Kreuzprodukt kriegen wir den Normalenvektor heraus. Das ist ein Vektor, der Orthogonal zu den beiden ursprünglichen Vektoren ist. Um Das Kreuzprodukt zu berechnen, schreibt man nebeneinander die Werte der Vektoren jeweils zwei mal übereinander und multipliziert wie unten angegeben über Kreuz: Erst die blauen Linien und dann Minus die roten.

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 z_2 - z_1 y_2 \\ z_1 x_2 - x_1 z_2 \\ x_1 y_2 - y_1 x_2 \end{pmatrix}$$



Anmerkung: Um den Normalenvektor zu ermitteln, kann man alternativ auch ein Gleichungssystem aufstellen, indem man sagt, dass das Skalarprodukt aus dem Normalenvektor und jeweils einem der beiden Richtungsvektoren Null ergibt. Man hätte dann zwei Gleichungen der Form  $\vec{n} \cdot \vec{v} = 0$ .


## 7.2 Geraden

Um eine Gerade aufzustellen, braucht man zwei von einander verschiedene Punkte.

### Koordinatenform

Diese Notation ist wahrscheinlich am einfachsten zu verstehen, denn man hat zwei **Punkte**, zwischen denen man eine **Gerade** zeichnen kann.


$$g : ax + by = c$$



### Parameterform

Bei dieser Notationsform wird an einen Ortsvektor – genannt **Stützvektor** – ein **Richtungsvektor** angelegt. Dieser **Vektor** liegt jetzt auf einer **Geraden**. Da die Länge des **Richtungsvektors** egal ist, nimmt man noch den Skalar  $r$  hinzu.


$$g : \vec{x} = \overrightarrow{OP} + r \cdot \overrightarrow{PQ}$$



## Normalenform

Bei dieser Notationsform braucht einen **Stützvektor** und einen **Normalenvektor**, der orthogonal zu einer **Geraden** ist. Die Normalenform für Geraden existiert nur in  $\mathbb{R}^2$ , denn in drei Dimension gibt es keinen eindeutigen Normalenvektor, der orthogonal zum Stützvektor ist.

$$g : \vec{n} \cdot [\vec{x} - \overrightarrow{OP}] = 0$$




## 7.3 Ebenen

Um eine Ebene aufzustellen, braucht man drei Punkte, die paarweise verschieden sind und nicht auf einer Geraden liegen.

### Koordinatenform

Diese Notation ist wahrscheinlich am einfachsten zu verstehen, denn man hat drei **Punkte**, die zusammen eine **Ebene** aufspannen. Genauer gesagt, handelt es sich um die **Spurpunkte**, d.h. die Schnittpunkte mit den Achsen.


$$E : ax + by + cz = d$$



### Parameterform

Bei dieser Notationsform werden an einen Ortsvektor – genannt **Stützvektor** – zwei **Richtungsvektoren** oder auch **Spannvektoren** angelegt. Diese beiden **Vektoren** liegen jetzt auf einer **Ebene**. Da die Länge der **Spannvektoren** egal ist, nimmt man noch die Skalare  $r$  und  $s$  hinzu.


$$E : \vec{x} = \overrightarrow{OP} + r \cdot \overrightarrow{PQ} + s \cdot \overrightarrow{PR}$$





## Normalenform

Bei dieser Notationsform braucht man nur zwei Vektoren: Einmal den **Stützvektor** und einmal den **Normalenvektor**. Der **Normalenvektor** ist ein Vektor, der orthogonal zur **Ebene** liegt. Da durch ihn die Ebene eindeutig identifiziert werden kann, kann er die beiden Spannvektoren ersetzen.



$$E : \vec{n} \cdot [\vec{x} - \vec{OP}] = 0$$

## 7.4 Umwandeln von Ebenengleichungen

Manchmal muss man zwischen den verschiedenen Formeln umwandeln, daher hier eine Übersicht. Dazu sei gesagt, dass diese Tabelle für Ebenen- und Geradengleichung gleichermaßen gilt.

Von	Nach	Wie?
Parameterform	Normalenform	Normalenvektor aufstellen mithilfe der Richtungsvektoren: Entweder Kreuzprodukt bilden oder Gleichungssystem aufstellen (Kreuzprodukt geht nicht bei Geradengleichungen)
Normalenform	Koordinatenform	Den kompletten Term ausmultiplizieren
Koordinatenform	Parameterform	x durch r und y durch s ersetzen (soweit vorhanden) und dann nach z umstellen und Parameterform aufstellen
Koordinatenform	Normalenform	Normalenvektor ablesen (Koeffizienten vor xyz) und Stützvektor berechnen, indem man die Gleichung der Koordinatenform löst

Für die nicht aufgeführten Umwandlungen muss man erst in eine andere Form als Zwischenschritt umwandeln. Zum besseren Verständnis folgt für jede Umwandlung noch ein Beispiel.

### Von Parameterform nach Normalenform

$$\begin{aligned} E : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ -7 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow E : \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -3 \\ -7 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \left[ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right] &= 0 \\ \Rightarrow E : \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \left[ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right] &= 0 \end{aligned}$$

### Von Normalenform nach Koordinatenform

$$\begin{aligned} E : \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \left[ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right] &= 0 \\ \Rightarrow E : \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} &= 0 \\ \Rightarrow E : 7x - 3y + 6z &= 11 \end{aligned}$$

### Von Koordinatenform nach Parameterform

$$\begin{aligned} E : 7x - 3y + 6z &= 11 \\ \Rightarrow E : 7r - 3s + 6z &= 11 \\ \Rightarrow E : 6z &= 11 - 7r + 3s \\ \Rightarrow E : z &= \frac{11}{6} - \frac{7}{6}r + \frac{1}{2}s \\ \Rightarrow E : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & r & 0 \\ 0 & 0 & s \\ \frac{11}{6} & -\frac{7}{6}r & \frac{1}{2}s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{11}{6} \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -\frac{7}{6} \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Hinweis: Sollten von  $x, y$  und  $z$  nicht alle gegeben sein, einfach an der entsprechenden Stelle 0 einsetzen. Übrigens nicht wundern, dass nicht dasselbe wie bei den vorherigen Beispielen rauskommt. Es gibt schließlich unendliche viele Möglichkeiten eine Ebenengleichung aufzustellen.

### Von Koordinatenform nach Normalenform

$$\begin{aligned} E : 7x - 3y + 6z &= 11 \\ \Rightarrow E : \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 6 \end{pmatrix} \cdot \left[ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right] &= 0 \end{aligned}$$

Hinweis: Für den Stützvektor können auch komplett andere Werte benutzt werden, solange sie die Gleichung in Koordinatenform erfüllen.

## 7.5 Lagebeziehungen

In der analytischen Geometrie schaut man sich oft an, wie Punkte, Geraden und Ebenen zueinander stehen. Von Interesse ist u.a., ob sich Geraden schneiden, ob Punkte auf einer Geraden liegen oder auch, ob Ebenen parallel sind. Für dieses Kapitel solltest du [Gleichungssysteme](#) (S. 27) lösen können. Vorab noch eine kleine Begriffsklärung: *Windschief* bedeutet, dass zwei Geraden sich weder schneiden, noch parallel sind.

### 7.5.1 Punkt – Punkt

Für die Beziehung zwischen zwei Punkten gibt es nur ein Szenario: Entweder sie sind gleich oder nicht und das ist wirklich einfach zu überprüfen. Haben zwei Punkte dieselben Koordinaten, so sind sie gleich.

### 7.5.2 Punkt – Gerade/Ebene

Ein Punkt kann auf einer Geraden bzw. einer Ebene liegen oder nicht. Das überprüft man, indem man den Punkt für  $\vec{x}$  in die Parameterform einsetzt und daraus ein Gleichungssystem aufstellt. Ist dieses lösbar, so liegt der Punkt auf der Geraden oder auf der Ebene. Dazu ein Beispiel mit dem Punkt  $P(-3; -2; 5)$  und einer Geraden:

$$\begin{aligned} g : \vec{x} &= \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \\ \Rightarrow \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} \\ (I) \quad -3 &= 4 + 2s \\ (II) \quad -2 &= 1 + s & \quad | -1 \\ (III) \quad 5 &= 3 - 2s & \quad | (II) \text{ einsetzen} \\ &\Downarrow \\ (III) \quad 5 &= 3 - 2(-2 - 1) \\ &5 = 9 \end{aligned}$$

Wir erhalten eine unwahre Aussage. Damit ist das Gleichungssystem nicht lösbar und der Punkt liegt nicht auf der Geraden.

### 7.5.3 Gerade – Gerade/Ebene

#### Schnittpunkt

Um zu überprüfen, ob sich zwei Geraden schneiden oder sich eine Gerade mit einer Ebene schneidet, so setzt man diese gleich und stellt daraus ein Gleichungssystem auf. Es gilt ganz einfach, dass wenn das Gleichungssystem lösbar ist, dann existiert auch ein Schnittpunkt. Vorsicht, denn man darf für den Skalar  $s$  im Gleichungssystem nicht den gleichen Buchstaben verwenden, denn unsere Richtungsvektoren dürfen unterschiedlich skaliert werden. Wenn es kein Ergebnis gibt, dann heißt das für den Fall Gerade/Ebene, dass diese parallel zueinander liegen.

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \\
& \Downarrow \\
& \begin{array}{ll} (I) & 4 + 2s = 1 - 2r \\ (II) & 1 + s = 2 - r \quad | -1 \\ (III) & 3 - 2s = 4 + 3r \quad | (II) \text{ einsetzen} \end{array} \\
& \Downarrow \\
& \begin{array}{ll} (III) & 3 - 2(1 - r) = 4 + 3r \\ \Leftrightarrow & 1 + 2r = 4 + 3r \\ \Leftrightarrow & -3 = r \end{array} \\
& \Downarrow \\
& \begin{array}{ll} (I) & 4 + 2s = 1 - 2r \quad | (II) \text{ einsetzen} \\ \Rightarrow & 4 + 2(1 - r) = 1 - 2r \quad | (III) \text{ einsetzen} \\ \Rightarrow & 4 + 2(1 + 3) = 1 + 6 \\ \Leftrightarrow & 12 = 7 \end{array}
\end{aligned}$$

Das Gleichungssystem ist nicht lösbar. Damit schneiden sich die beiden Geraden nicht.

### Parallelität (nur Geraden)

Sind die Richtungsvektoren von zwei Geraden Vielfache voneinander, so verlaufen sie parallel. Das kann man wieder mit einem Gleichungssystem ganz einfach beweisen.

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \\
& \Downarrow \\
& \begin{array}{ll} (I) & 2 = -2a \\ (II) & 1 = -1a \\ (III) & -2 = 3a \end{array}
\end{aligned}$$

Für dieses Beispiel sind die Geraden nicht parallel, denn für (I) und (II) erhält man die Lösung 1, diese erfüllt jedoch nicht die dritte Gleichung. Folglich sind diese beiden Vektoren und damit auch mögliche in Verbindung stehende Geraden nicht parallel zueinander.

Achtung: Windschief sind sie erst, wenn man auch bewiesen hat, dass sie keinen Schnittpunkt haben.

### 7.5.4 Ebene – Ebene

Der größte Unterschied bei der Betrachtung des Lageverhältnisses zwischen zwei Ebenen, besteht bei der Interpretation des Ergebnisses. Kriegt man am Ende ein unwahre Aussage, liegen die Ebenen logischerweise parallel zu einander aber nicht aufeinander. Bekommen wir eine wahre Aussage als Ergebnis, sind die Ebenen identisch. Sollten am Ende ein oder zwei Parameter übrig bleiben, existiert eine Schnittgerade der beiden Ebenen. In diesem Fall rechnet es sich am einfachsten, wenn man eine Gleichung in der Koordinatenform und die andere in der Parameterform hat. Dazu ein Beispiel:

$$\begin{aligned}
E_1 : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -0,5 \end{pmatrix} \\
E_2 : 3x + y + 2z &= 10 \\
&\Downarrow \\
x &= 3 + 2r + 3s \\
y &= 1 + 2r \\
z &= -2 + 2r - 0,5s
\end{aligned}$$

Diese Werte aus  $E_1$  setzen wir jetzt in  $E_2$  ein.

$$\begin{aligned}
&3x + y + 2z = 10 \\
\Rightarrow &3(3 + 2r + 3s) + 1 + 2r + 2(-2 + 2r - 0,5s) = 10 \\
\Leftrightarrow &9 + 6r + 9s + 1 + 2r - 4 + 4r - s = 10 \\
\Leftrightarrow &12r + 8s = 4
\end{aligned}$$

Mithilfe dieses Ergebnisses kann man jetzt eine Schnittgeradengleichung aufstellen. Dafür muss man zunächst nach  $r$  oder nach  $s$  umstellen.

$$\begin{aligned}
&12r + 8s = 4 \\
\Leftrightarrow &8s = 4 - 12r \\
\Leftrightarrow &s = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}r
\end{aligned}$$

Dieses  $s$  setzt man jetzt in die Ebenengleichung in Parameterform ein und erhält damit die Schnittgerade.

$$\begin{aligned}
g_s : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}r\right) \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -0,5 \end{pmatrix} \\
\Leftrightarrow g_s : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}r\right) \\ 0 \\ -0,5\left(\frac{1}{2} - \frac{3}{2}r\right) \end{pmatrix} \\
\Leftrightarrow g_s : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{2} - \frac{9}{2}r \\ 0 \\ -\frac{1}{4} + \frac{3}{4}r \end{pmatrix} \\
\Leftrightarrow g_s : \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 4,5 \\ 1 \\ -2,25 \end{pmatrix} + r \cdot \begin{pmatrix} -2,5 \\ 2 \\ 2,75 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

## 7.6 Linearkombination

Wenn ein Vektor mithilfe von Vektoraddition und Skalarmultiplikation erzeugt wird, nennt man das Linearkombination. So ist ein Vektor  $\vec{v}$  gleich der Summe aller Vektoren  $a_i$  multipliziert mit den Skalaren  $\lambda_i$ .

$$\vec{v} = \sum_{i=1}^n \lambda_i \vec{a}_i$$

Man nimmt sich also eine Anzahl  $n$  an Vektoren und addiert diese ggf. unter Benutzung von Skalaren. Diese Summe nennt man Linearkombination.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = 5 \cdot \vec{a} + 2 \cdot \vec{b} = \begin{pmatrix} 25 \\ -5 \\ 35 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 29 \\ -5 \\ 37 \end{pmatrix}$$

## 7.7 Lineare Abhängigkeit

Hat man Vektoren, deren Linearkombination den Nullvektor erzeugen kann, spricht man von linearer Abhängigkeit unter der Voraussetzung, dass mindestens einer der genutzten Skalare nicht Null ist. Hat man mehr als zwei Vektoren des  $\mathbb{R}^2$  oder mehr als drei Vektoren des  $\mathbb{R}^3$ , sind diese Vektoren immer linear abhängig. Des Weiteren sind zwei Vektoren immer dann linear voneinander abhängig, wenn sie parallel sind. Für drei Vektoren des  $\mathbb{R}^3$  gilt außerdem, dass sie sich auf einer Ebene befinden, wenn sie linear voneinander abhängig sind.

Beispiel: Sind die drei  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  Vektoren linear voneinander abhängig?

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} -6 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \text{(I)} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -6 & 2 & 0 \end{array} \right) \\ \text{(II)} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & -6 & 0 \end{array} \right) \quad | -(\text{I}) \\ \text{(III)} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} 4 & -2 & -6 & 0 \end{array} \right) \quad | -2 \cdot (\text{I}) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{(I)} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -6 & 2 & 0 \end{array} \right) \\ \text{(II)} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 8 & -8 & 0 \end{array} \right) \\ \text{(III)} \quad \left( \begin{array}{ccc|c} 0 & 10 & -10 & 0 \end{array} \right) \quad | \cdot 8 \quad | -10 \cdot (\text{II}) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{(I)} \\ \text{(II)} \\ \text{(III)} \end{array} \left( \begin{array}{ccc|c} 2 & -6 & 2 & 0 \\ 0 & 8 & -8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

Das Gleichungssystem bietet unendlich viele Lösungen, d.h., diese drei Vektoren sind linear abhängig.

## 8 2D-Koordinatensystem

### 8.1 Allgemeines

#### 8.1.1 Monotonie

Seien  $x_1$  und  $x_2$  zwei Argumente einer Funktion, so gelten folgende Definitionen:

**Monoton wachsend**

wenn  $x_1 \leq x_2$  und  $f(x_1) \leq f(x_2)$

**Streng monoton wachsend**

wenn  $x_1 < x_2$  und  $f(x_1) < f(x_2)$

**Monoton fallend**

wenn  $x_1 \leq x_2$  und  $f(x_1) \geq f(x_2)$

**Streng monoton fallend**

wenn  $x_1 < x_2$  und  $f(x_1) > f(x_2)$

Des Weiteren kann man, das Monotonieverhalten einer Funktion mithilfe ihrer [Ableitung](#) (S. 67) bestimmen. Ist die Ableitung  $f'$  einer Funktion größer oder gleich Null, so ist sie monoton wachsend. Ist sie größer als und ungleich Null, ist sie sogar streng monoton wachsend. Dasselbe gilt umgekehrt für monoton fallende Funktion, wenn ihre Ableitung an der untersuchten Stelle negativ ist.

**Monoton wachsend:**  $f'(x) \geq 0$

**Streng monoton wachsend:**  $f'(x) > 0$

**Monoton fallend:**  $f'(x) \leq 0$

**Streng monoton fallend:**  $f'(x) < 0$


#### 8.1.2 Umkehrbarkeit

Bei der Umkehrfunktion  $f^{-1}$  einer Funktion  $f$  werden quasi Abszissen und Ordinaten vertauscht. Das heißt quasi, dass die Funktion von der  $y$ -Achse auf die  $x$ -Achse gelegt wird. Da es aber für jedes  $x$  nur ein  $y$  geben darf, gelten besondere Regeln für die Umkehrbarkeit von Funktionen: Eine Funktion ist in einem Intervall umkehrbar, wenn sie in diesem Intervall entweder nur streng monoton fallend oder nur streng monoton wachsend ist. In anderen Worten, darf es für jeden  $y$ -Wert maximal einen  $x$ -Wert geben, der auf ersteren verweist. Diese Eigenschaft nennt man auch *Injektivität*. Um das zu überprüfen kann man mithilfe der [Ableitung](#) (S. 67)



die Extremstellen der Funktion untersuchen. Die Funktion sollte außerdem *surjektiv* sein, d.h. Jeder  $y$ -Wert hat mindestens einen  $x$ -Wert zu gewiesen. Wenn beides gegeben ist, braucht jeder  $y$  in anderen Worten genau einen  $x$ -Wert. Das wird auch als *bijektiv* bezeichnet.

Wenn man sich also sicher ist, dass die Funktion im jeweiligen Intervall bijektiv ist, darf man auch eine Umkehrfunktion bilden. Das ist je nach Funktionstyp gar nicht so schwer, denn man muss die Funktion nur nach  $y$  umstellen und dann  $x$  und  $y$  vertauschen. Hier ein Beispiel für eine Funktion und ihre Umkehrfunktion:



### 8.1.3 Besondere Stellen

Für manche Stellen einer Funktion werden besondere Begriffe benutzt. Hinweis:  $D_f$  ist der Definitionsbereich der Funktion und  $I$  ein beliebig kleiner offener Intervall, der  $x_{max}$  bzw.  $x_{min}$  beinhaltet.

#### Globale Maximalstelle

wenn  $f(x_{max}) \geq f(x)$  aller  $x \in D_f$

#### Lokale Maximalstelle

wenn  $f(x_{max}) \geq f(x)$  aller  $x \in D_f \cap I$

#### Globale Minimalstelle

wenn  $f(x_{max}) \leq f(x)$  aller  $x \in D_f$

#### Lokale Minimalstelle

wenn  $f(x_{max}) \leq f(x)$  aller  $x \in D_f \cap I$

#### Strikte Extrema

Ersetzt man bei den obigen Definitionen das  $\geq$  bzw.  $\leq$  durch  $>$  bzw.  $<$ , spricht man von einem strikten Maximum oder Minimum.

Hinweis: Maximal- und Minimalstellen werden auch als Extremalstellen bezeichnet.

### 8.1.4 Symmetrie

Wenn man Funktionen untersucht, schaut man sich auch oft an, wie deren Symmetrie ist. Ist eine Funktion achsensymmetrisch zur  $y$ -Achse, spricht man von *gerade* und wenn sie punktsymmetrisch zum Nullpunkt ist, von *ungerade*.

#### Gerade

$$\text{wenn } f(-x) = f(x)$$


#### Ungerade

$$\text{wenn } f(-x) = -f(x)$$

Achtung: Eine Funktion kann nur gerade oder ungerade sein, wenn ihr Definitionsbereich symmetrisch zur Nullstelle auf der  $x$ -Achse ist.

### 8.1.5 Newtonverfahren

Bei komplizierten Funktion kann es passieren, dass – obwohl welche existieren – man keine Nullstellen findet. Manchmal nicht einmal durch Raten. Eine ganzrationale Funktion zu vereinfachen durch Polynomdivision ist z.B. ebenfalls erst möglich, wenn man eine Nullstelle gefunden hat. Dennoch findet man online viele Rechner, die einem die Nullstellen geben, aber wie machen die das? In diesem Fall hilft das Newtonverfahren, sich einem Wert zu nähern. Hier ist ein Beispiel für so einen Fall:



Als erstes legt man eine Wertetabelle an, um die grobe Positionen der Nullstellen zu finden. Dabei will man wissen, zwischen welchen Stellen das Vorzeichen wechselt.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
f(x)	-7	1	1	-1	1	13	41

Wir untersuchen jetzt einmal die Nullstelle zwischen  $-1$  und  $0$ . Um uns der Nullstelle anzunähern, teilen wir die Funktion durch ihre Ableitung an einer der beiden Stellen, zwischen denen unsere gesuchte Nullstelle liegt. Es gilt folgende Formel:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Um diese Formel anzuwenden, brauchen wir als erstes die Ableitung und dann wiederholen wir diesen Prozess solange, bis wir genügend Nachkommastellen oder die tatsächliche Nullstelle gefunden haben.

$$f'(x) = 3x^2 + 4x - 1$$

$$x_1 = (-1) - \frac{(-1)^3 + 2(-1)^2 - (-1) - 1}{3(-1)^2 + 4(-1) - 1} = -\frac{1}{2}$$

$$x_2 = \left(-\frac{1}{2}\right) - \frac{\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + 2\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - \left(-\frac{1}{2}\right) - 1}{3\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 4\left(-\frac{1}{2}\right) - 1} = -\frac{5}{9}$$

$$x_3 = \left(-\frac{5}{9}\right) - \frac{\left(-\frac{5}{9}\right)^3 + 2\left(-\frac{5}{9}\right)^2 - \left(-\frac{5}{9}\right) - 1}{3\left(-\frac{5}{9}\right)^2 + 4\left(-\frac{5}{9}\right) - 1} = -\frac{929}{1674}$$


$$x_4 = \left(-\frac{929}{1674}\right) - \frac{\left(-\frac{929}{1674}\right)^3 + 2\left(-\frac{929}{1674}\right)^2 - \left(-\frac{929}{1674}\right) - 1}{3\left(-\frac{929}{1674}\right)^2 + 4\left(-\frac{929}{1674}\right) - 1} = -0,5549581321$$

$$x_5 = \dots = -0,5549581321$$

Wenn man zwei Mal den gleichen Wert bekommt, weiß man, dass man den endgültigen Wert erreicht hat.

## 8.2 Potenz- und Wurfelfunktionen

Potenzfunktionen in der Form  $f(x) = x^m$  mit  $m \in \mathbb{N}_0$  und  $D_f = \mathbb{R}$  heißen **Monome** (im Gegensatz zu Polynomen). Potenzfunktionen mit der Form  $x^{\frac{m}{n}}$  sind **Wurfelfunktionen**, wenn  $n \geq 2$  gilt und der Bruch keine ganze Zahl ist. An der Potenz kann man erkennen, ob eine Funktion gerade ( $x^{2n}$ ) oder ungerade ( $x^{2n-1}$ ) ist. Hier sind einige Beispiele für Graphen von Potenz- und Wurfelfunktionen:



$$f(x) = x^3$$

$$f(x) = x^{\frac{3}{2}}$$

$$f(x) = x^{-\frac{1}{2}}$$

$$f(x) = x^{-3}$$

$$f(x) = x^2$$

$$f(x) = x^{\frac{2}{3}}$$

$$f(x) = x^{-2}$$

### 8.2.1 Wurzelgleichungen

Bei Wurzelgleichungen wird zuerst der Definitionsbereich bestimmt, also die Menge an reellen Zahlen, für die der Radikand positiv oder gleich Null ist. Zur Lösung von Wurzelgleichungen wird die Wurzel auf einer Seite der Gleichung isoliert. Dann werden beide Seiten der Gleichung mit dem Wurzelexponenten (im Falle der Quadratwurzel also mit 2) so lange potenziert, bis alle Wurzeln eliminiert sind. Man bekommt also unter Umständen durch das Quadrieren (das Potenzieren mit einer geraden Zahl ist keine Äquivalenzumformung) neue Lösungen (Scheinlösungen) hinzu, die die ursprüngliche Gleichung nicht hatte. Die Probe ist folglich für Wurzelgleichungen unverzichtbar!

Beispiel ( $\sqrt{2x+1} = x-17$ ):

$$2x+1 \geq 0$$

$$x \geq -\frac{1}{2}$$

Damit haben wir den Definitionsbereich. Jetzt kann man nach der Lösung suchen.

$$\sqrt{2x+1} = x-17$$

$$2x+1 = (x-17)^2$$

$$2x+1 = x^2 - 34x + 289$$

$$x^2 - 36x + 288 = 0$$

$$x_1 = 12$$

$$x_2 = 24$$

Jetzt MUSS man das Ergebnis noch überprüfen, indem man die Werte  $x_1$  und  $x_2$  in die ursprüngliche Gleichung einsetzt.

$$\sqrt{2x_1+1} = x_1-17$$

$$\sqrt{2 \cdot 12 + 1} = 12 - 17$$

$$\sqrt{25} = -5$$

$$5 = -5$$

Das Einsetzen von  $x_1$  liefert keine wahre Aussage und ist somit nicht Teil der Lösungsmenge.

$$\sqrt{2x_2+1} = x_2-17$$

$$\sqrt{2 \cdot 24 + 1} = 24 - 17$$


$$\sqrt{49} = 7$$

$$7 = 7$$

Da  $x_2$  im Definitionsbereich liegt und beim Einsetzen eine wahre Aussage ergibt, ist es in der Lösungsmenge enthalten.

$$\mathbb{L} = \{24\}$$

Übrigens: Wenn man mehrere Wurzeln in der Gleichung hat, muss man den Definitionsbereich für den Radikanden jeder Wurzel bestimmen.



Mithilfe dieser Graphen kann man das Ergebnis wunderbar visualisieren, denn das Ergebnis ist der  $x$ -Wert des Schnittpunkts der beiden Funktionen, die man aus der linken und rechten Seite der Wurzelgleichung entnehmen kann.

### 8.2.2 Wurzelgleichungen mit mehreren Wurzeln (Beispiel)

$$\sqrt{8x-14} + \sqrt{5x-2} = \sqrt{27x-36}$$

$$(\sqrt{8x-14} + \sqrt{5x-2})^2 = 27x-36$$

$$8x-14 + 2\sqrt{(8x-14)(5x-2)} + 5x-2 = 27x-36$$

$$2\sqrt{(8x-14)(5x-2)} = 14x-20$$

$$\sqrt{(8x-14)(5x-2)} = 7x-10$$

$$40x^2 - 86x + 28 = (7x-10)^2$$


$$40x^2 - 86x + 28 = 49x^2 - 140x + 100$$

$$0 = 9x^2 - 54x + 72 = x^2 - 6x + 8$$

Jetzt kann man die [p-q-Formel](#) (S. 16) anwenden und erhält die Lösungsmenge  $\mathbb{L} = \{2; 4\}$ .

## 8.3 Betragsfunktionen

Um mit Betragsgleichungen oder auch Betragsfunktionen rechnen zu können muss man mehrere Fälle betrachten. Nämlich einmal den Fall, dass im Betrag ein Wert größer oder gleich 0 entsteht und einmal den Fall, dass das Ergebnis im Betrag kleiner als Null ist. Betrachten wir ein Beispiel, bei dem man den Schnittpunkt zwischen  $f(x) = |x+1|$  und  $f(x) = x+2$  finden soll.



Zunächst setzen wir unsere Funktionen gleich und erhalten eine Betragsgleichung. Dann betrachten wir die verschiedenen Fälle für den Betrag.

$$|x + 1| = \begin{cases} x + 1 & \text{falls } x \geq -1 \\ -(x + 1) & \text{falls } x < -1 \end{cases}$$

Durch die Fallunterscheidung kann man die Betragsstriche weglassen, indem man jeden Fall einzeln betrachtet. Hinterher muss man aber noch überprüfen, ob das Ergebnis der Bedingung für  $x$  in dem Fall entspricht.

Fall  $x \geq -1$  ( $x + 1$  ist positiv):

$$\begin{array}{lcl} x + 1 = x + 2 & | & -x \\ 1 = 2 \end{array}$$

Für den Fall  $x \geq -1$  gibt es keine Lösung, also weiter zum nächsten Fall.

Fall  $x < -1$  ( $x + 1$  ist negativ):

$$\begin{array}{lcl} -x - 1 = x + 2 & | & +x - 2 \\ 2x = -3 & & \\ x = -\frac{3}{2} \end{array}$$


Damit haben wir unsere Lösungsmenge, denn wir bekommen für den Fall  $-(x < -1)$  ein Ergebnis, welches dem Kriterium  $x < -1$  entspricht.

$$\mathbb{L} = \left\{ -\frac{3}{2} \right\}$$

Durch einsetzen dieser  $x$ -Koordinate, finden wir auch den dazugehörigen  $y$ -Wert:  $P\left(-\frac{3}{2} \mid \frac{1}{2}\right)$ :

### 8.3.1 Betragsgleichungen mit mehreren Beträgen

Haben wir mehrere Beträge in unserer Gleichung, haben wir auch mehrere Fälle zu betrachten. Schon wir uns das an einem Beispiel an, indem wir die Schnittpunkte von  $f(x) = |x + 1| + 5$  und  $f(x) = |2x - 4|$  suchen.



Zunächst setzen wir die Funktionen wieder gleich.

$$|x + 1| + 5 = |2x - 4|$$

Die Fälle müssen wir alle einzeln betrachten. Das heißt, wir haben insgesamt 4 Fälle. Wir schauen uns zunächst die beiden Fälle eines Betrages an und dann innerhalb dieser Fälle betrachten wir die Fälle für den zweiten Betrag.

1. Fall für  $|x + 1|$ :  $x \geq -1$  ( $x + 1$  ist positiv)

$$x + 1 + 5 = |2x - 4|$$

$$x + 6 = |2x - 4|$$

Innerhalb dieses ersten Falles unterscheiden wir jetzt noch einmal für den übrigen Betrag.

1. Fall für  $|2x - 4|$ :  $x \geq 2$  ( $2x - 4$  ist positiv)

$$x + 6 = 2x - 4$$

$$x + 10 = 2x$$

$$10 = x$$

Jetzt müssen wir überprüfen, ob  $x \geq 2$  und  $x \geq -1$  für  $x = 10$  gelten. Das ist der Fall daher haben wir schon mal einen Teil unserer Lösungsmenge. Auf der Grafik kann man auch sehen, dass sich die beiden Graphen dort schneiden.

2. Fall für  $|2x - 4|$ :  $x < 2$  ( $2x - 4$  ist negativ)

$$x + 6 = -(2x - 4)$$

$$x + 6 = -2x + 4$$

$$3x + 6 = 4$$

$$3x = -2$$

$$x = -\frac{2}{3}$$

Wir überprüfen jetzt wieder, ob  $x < 2$  und  $x \geq -1$  für  $x = -\frac{2}{3}$  gelten. Da das der Fall ist, können wir auch dieses  $x$  zu unserer Lösungsmenge hinzufügen.

2. Fall für  $|x + 1|$ :  $x < -1$  ( $x + 1$  ist negativ)

$$-(x + 1) + 5 = |2x - 4|$$

$$-x + 4 = |2x - 4|$$

1. Fall für  $|2x - 4|: x \geq 2$  ( $2x - 4$  ist positiv)

In diesem Fall müssen wir gar nicht erst versuchen  $x$  auszurechnen, denn es gibt keine Zahl, die sowohl  $x \geq 2$ , als auch  $x < -1$  erfüllt.

2. Fall für  $|2x - 4|: x < 2$  ( $2x - 4$  ist negativ)

$$-x + 4 = -(2x - 4)$$

$$-x + 4 = -2x + 4$$

$$-x = -2x$$

$$x = 0$$

Wir haben jetzt  $x = 0$  als Lösung, jedoch erfüllt dieses Ergebnis nicht die Bedingung  $x < -1$  und ist daher auch nicht in der Lösungsmenge enthalten.


Abschließend können wir feststellen, dass unsere Lösungsmenge  $\mathbb{L} = \{10; -\frac{2}{3}\}$  ist. Durch Einsetzen in eine der beiden Funktionen erhalten wir dann unsere Schnittpunkte  $P_1(10 \mid 16)$  und  $P_2(-\frac{2}{3} \mid \frac{16}{3})$ .

## 8.4 Ganzrationale Funktionen

Polynome sind die Summe aus den Vielfachen von Monomen. Eine ganzrationale Funktion oder auch Polynomfunktion genannt mit dem Koeffizienten  $a_n$  hat folgende Form:

$$p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x^1 + 1_0$$

Das Verhalten einer Polynomfunktion hängt für  $x \rightarrow \pm\infty$  vom Summanden mit der höchsten Potenz und für  $x \rightarrow 0$  vom Summanden mit der niedrigsten Potenz ab.





## Nullstellen

Polynome n-ten Grades haben maximal n Nullstellen.

$$p(x) = a_{2k-1}x^{2k-1} + \dots + a_1x + a_0, \text{ wenn } a_{2k-1} \neq 0$$

Polynome ungeraden Grades haben mindestens eine Nullstelle.

$$p(x) = a_{2k}x^{2k} + \dots + a_2x^2 + a_0, \text{ wenn } a_{2k} \geq 0 \text{ und } a_0 > 0$$


Polynome geraden Grades besitzen manchmal keine Nullstellen.

## Symmetrie

Für die Symmetrie der Funktion gilt wie bei Monomen weiterhin, dass bei geraden Potenzen eine gerade Funktion vorliegt und bei ungeraden Potenzen eine ungerade Funktion. Hat ein Polynom jedoch sowohl gerade, wie auch ungerade Exponenten, so kann man beides ausschließen.

### 8.4.1 Lösen durch Substitution

In diesem Beispiel werden die Nullstellen der Funktion mithilfe von [Substitution](#) (S. 21) und anschließend Anwenden der [p-q-Formel](#) (S. 16) ermittelt.



$$p(x) = x^4 - 5x^2 + 2$$

$$0 = x^4 - 5x^2 + 2$$

$$0 = u^2 - 5u + 2$$

$$u_{1,2} = \frac{5}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{5}{2}\right)^2 - 2}$$

$$u_1 = \frac{5 + \sqrt{17}}{2}$$

$$u_2 = \frac{5 - \sqrt{17}}{2}$$

$$x_{1,2}^2 = \frac{5 + \sqrt{17}}{2}$$

$$x_{1,2}^2 = \pm 2,135779205$$


$$x_{3,4}^2 = \frac{5 - \sqrt{17}}{2}$$

$$x_{3,4}^2 = 0,6621534469$$

$$\mathbb{L} = \{-2,135779205; -0,6621534469; 0,6621534469; 2,135779205\}$$

### 8.4.2 Lösen durch Faktorisierung

In diesem Beispiel werden die Nullstellen der Funktion mithilfe von [Faktorisierung durch Ausklammern](#) (S. 20) ermittelt.



$$p(x) = x^5 - 3x^3$$

$$0 = x^5 - 3x^3$$


$$0 = x^2(x^2 - 3)$$

$$0 = x^2(x^2 - \sqrt{3})(x^2 + \sqrt{3})$$

$$\mathbb{L} = \{-\sqrt{3}; 0; \sqrt{3}\}$$

### 8.4.3 Lösen mit binomischen Formeln

In diesem Beispiel wird Funktion mithilfe der [binomischen Formeln](#) (S. 16) so vereinfacht, dass man die Nullstellen ganz einfach ablesen kann.



$$p(x) = x^4 - 4x^2 + 1$$

$$0 = x^4 - 4x^2 + 1$$

$$0 = (x^2 - 1)^2$$


$$x = \pm 1$$

$$\mathbb{L} = \{-1; 1\}$$

---

### 8.4.4 Lösen durch Polynomdivision

Wenn alle anderen Stränge reißen, ist man leider gezwungen die Polynomdivision durchzuführen. Um damit beginnen zu können, braucht man aber mindestens eine Nullstelle, die man durch Raten findet. Für das Beispiel unten finden wir so heraus, dass eine Nullstelle  $x_1 = 1$  ist. Jetzt stellen wir  $x = 1$  nach 0 um und erhalten  $0 = x - 1$ . Anschließend teilen wir unser Polynom durch  $x - 1$ .



$$(2x^3 - 5x^2 - 2x + 5) : (x - 1)$$


Zunächst teilt man den Term mit der höchsten Potenz  $2x^3$  durch  $x$  und erhält  $2x^2$ . Das ist der erste Teil unseres Ergebnisses.

$$(2x^3 - 5x^2 - 2x + 5) : (x - 1) = 2x^2 \dots$$

Jetzt muss man zurück multiplizieren, indem man den Term  $2x^2$ , den wir gerade bekommen haben, mit unserem ursprünglichen Divisor  $x - 1$  multiplizieren. Das Ergebnis ziehen wir von unserem Polynom ab und holen anschließend den nächsten Ausdruck runter. Diesen Prozess wiederholen wir jetzt so oft, wie möglich.

$$\begin{array}{r} (2x^3 - 5x^2 - 2x + 5) : (x - 1) = 2x^2 - 3x - 5 \\ \underline{-2x^3 + 2x^2} \phantom{-2x + 5} \\ -3x^2 - 2x \phantom{+ 5} \\ \underline{3x^2 - 3x} \phantom{+ 5} \\ -5x + 5 \\ \underline{5x - 5} \\ 0 \end{array}$$

Mit der Funktion, die wir jetzt haben, können wir ganz einfach die restlichen Nullstellen errechnen.



$$f(x) = 2x^2 - 3x - 5$$

$$0 = 2x^2 - 3x - 5$$

$$0 = x^2 - 1,5x - 2,5$$

$$x_{1,2} = \frac{1,5}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{1,5}{2}\right)^2 + 2,5}$$


$$x_1 = 2,5$$

$$x_2 = -1$$

$$\mathbb{L} = \{-1; 1; 2,5\}$$

#### 8.4.5 Grenzverhalten von ganzrationalen Funktionen

Hat man eine Funktion wie z.B.  $f(x) = -x^5 + 2x^3 + 3x^2 + x + 2$  und untersucht, wie sie sich gegen (minus) Unendlich verhält, würde man intuitiv sagen, sie nähert sich (minus) Unendlich an. Hier soll es darum gehen, wie man das auch rechnerisch herausfinden kann und sicher unterscheidet, ob nun plus oder minus Unendlich richtig ist. Der Trick bei Funktionen dieser Form ist es, das  $x$  mit dem höchsten Exponenten auszuklammern.



$$\lim_{x \rightarrow \infty} -x^5 + 2x^3 + 3x^2 + x + 2$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^5 \left( \frac{-x^5}{x^5} + \frac{2x^3}{x^5} + \frac{3x^2}{x^5} + \frac{x}{x^5} + \frac{2}{x^5} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^5 \left( -1 + \frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3} + \frac{1}{x^4} + \frac{2}{x^5} \right)$$

Wir sehen, dass sich die Brüche in der Klammer alle Null annähern, somit bleibt dort nur noch  $-1$ . Währenddessen nähert sich  $x^5$  Unendlich an. Multipliziert mit  $-1$  ergibt das dann minus Unendlich.

$$\begin{aligned} & \infty^5 \left( -1 + \frac{2}{\infty^2} + \frac{3}{\infty^3} + \frac{1}{\infty^4} + \frac{2}{\infty^5} \right) \\ &= \infty^5 (-1 + 0 + 0 + 0 + 0) \\ &= -\infty \end{aligned}$$


Dasselbe kann man jetzt natürlich auch für  $x \rightarrow -\infty$  testen.

$$\begin{aligned} & -\infty^5 \left( -1 - \frac{2}{\infty^2} - \frac{3}{\infty^3} - \frac{1}{\infty^4} - \frac{2}{\infty^5} \right) \\ &= -\infty^5 (-1 - 0 - 0 - 0 - 0) \\ &= \infty \end{aligned}$$

Hinweis: Wenn man mit  $x \rightarrow (-)\infty$  arbeitet, setzt man  $\infty$  normalerweise nicht in die Funktion ein. Hier habe ich es einmal gemacht, damit man das Ergebnis besser nachvollziehen kann. Wenn man ausführlicher arbeiten will/muss, kann man den Limes von jedem Term einzeln aufstellen, um das Endergebnis zu begründen.

## 8.5 (Gebrochen)rationale Funktionen

Wenn wir von (gebrochen) rationalen Funktionen reden, meinen wir eine Funktion mit einem Polynom im Nenner eines Bruches.  $f(x) = \frac{2}{x^3}$  ist z.B. eine rationale Funktion,  $f(x) = \frac{x^3}{2}$  jedoch nicht.



Das Besondere an rationalen Funktionen der Form  $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$  ist, dass wir zum Bestimmen von Nullstellen und Definitionslücken den Zähler und Nenner einzeln betrachten können. Mithilfe des Zählers bestimmen wir ganz einfach Nullstellen der Funktion.


$$\begin{aligned}
 g(x) &= 0 \\
 0 &= 2x^4 - 10 \\
 10 &= 2x^4 \\
 5 &= x^4 \\
 x &= \pm \sqrt[4]{5} \\
 \mathbb{L} &= \{-\sqrt[4]{5}; \sqrt[4]{5}\}
 \end{aligned}$$

Mithilfe des Nenners bestimmen wir Definitionslücken.

$$\begin{aligned}
 h(x) &= 0 \\
 0 &= x^3 - 3 \\
 3 &= x^3 \\
 x &= \sqrt[3]{3} \\
 \mathbb{L} &= \{\sqrt[3]{3}\}
 \end{aligned}$$


## 8.6 Exponentialfunktionen

Eine Funktion der Form  $f(x) = a^x$  wird als Exponentialfunktion bezeichnet, denn die Variable  $x$  steht im Exponenten. Speziell wird die Funktion  $f(x) = e^x$  als *natürliche Exponentialfunktion* bezeichnet.



### 8.6.1 Lösen von Exponentialgleichungen

Zum Lösen von Exponentialgleichungen brauchen wir in der Regel den **Logarithmus** (S. 19). Wie das funktioniert, sehen wir an dem Beispiel hier drunter. Dabei ist die Nullstelle der Funktion zu bestimmen. In diesem Beispiel sollte man sich außerdem nochmal daran erinnern, dass  $\sqrt[n]{x}$  dasselbe ist, wie  $x^{\frac{1}{n}}$ .




$$\begin{aligned} f(x) &= \sqrt[4]{7^x} - 4 \\ 0 &= \sqrt[4]{7^x} - 4 && | +4 \\ 4 &= 7^{\frac{x}{4}} && | \log_7() \\ 0,7124143742 &= \frac{x}{4} && | \cdot 4 \\ x &= 2,849657497 \end{aligned}$$

$$\mathbb{L} = \{2,849657497\}$$

## 8.7 Logarithmusfunktionen


Funktionen wie  $f(x) = \log_3(x^2)$  werden als Logarithmusfunktionen bezeichnet, da sie einen oder mehrere Logarithmen beinhalten. Speziell bezeichnet man  $f(x) = \ln(x)$  als *natürliche Logarithmusfunktion* und  $f(x) = \lg(x)$  als *dekadische Logarithmusfunktion*.



### 8.7.1 Lösen von Logarithmusgleichungen

Gesucht wird hier die Nullstelle einer Logarithmusfunktion. Hinweis: Um einen Logarithmus aufzulösen, musst du beide Seiten der Gleichung als Exponent zur Basis des jeweiligen Logarithmus setzen. Um dorthin zu kommen, hilft es enorm, die Gleichung zunächst umzuformen.

Wenn du Schwierigkeiten mit den Umformungen in diesem Beispiel hast, schaue dir noch einmal die [Potenzgesetze](#) (S. 17) und [Logarithmusgesetze](#) (S. 19) an.



$$f(x) = 3 \cdot \lg(x^3) - 2 \cdot \lg(x^2) - 4$$

$$0 = 3 \cdot \lg(x^3) - 2 \cdot \lg(x^2) - 4$$

$$0 = \lg((x^3)^3) - \lg((x^2)^2) - 4 \quad | +4$$

$$\lg\left(\frac{x^9}{x^4}\right) = 4$$

$$\lg(x^5) = 4 \quad | 10^{\phantom{0}}$$

$$10^{\lg(x^5)} = 10^4$$

$$x^5 = 10^4 \quad | \sqrt[5]{\phantom{0}}$$


$$x = 6,309573445$$

$$\mathbb{L} = \{6,309573445\}$$

## 8.8 Trigonometrische Funktionen

Trigonometrische Funktionen oder auch Winkelfunktionen genannt, beinhalten die aus der [Geometrie](#) (S. 32) bekannten winkelabhängigen Funktionen, wie Sinus, Kosinus und Tangens. Dabei sind diese Funktionen hier allerdings abhängig von der Variable  $x$  und damit im Bogenmaß, nicht im Gradmaß. Beim Taschenrechner muss man darauf achten, dass der richtige Modus eingestellt ist, ansonsten kann es sein, dass man versehentlich im falschen Maß rechnet. Auf dem CASIO fx-86DE PLUS, drückt man Shift, dann Setup und wählt dort die 3:Deg (engl. degree) für Gradmaß oder 4:Rad (engl. radian) fürs Bogenmaß.






$$f(x) = \sin(x) \quad f(x) = \cos(x) \quad f(x) = \tan(x)$$

Anmerkung: Die Nullstellen des Sinus sind die Extremstellen des Kosinus und umgekehrt. Ebenso haben Sinus und Tangens dieselben Nullstellen.

## 8.9 Verkettete Funktionen

Verkettungen sind eigentlich keine eigene Funktionsart, sondern eine Möglichkeit Funktionen durch Zusammensetzung zu transformieren. Man schreibt das als  $f \circ g$  ("f nach g"). Man spricht hier bei  $g$  auch von der *inneren Funktion*, da sie als Argument in die *äußere Funktion*  $f$  eingesetzt wird.




$$f(x) = \sin(x) \quad g(x) = \frac{x^2}{3} \quad f \circ g(x) = \sin\left(\frac{x^2}{3}\right)$$

## 8.10 Kreisgleichungen

Bei Funktionen ist es so, dass jeder Abszisse ( $x$ -Achsenwert) genau eine Ordinate ( $y$ -Achsenwert) zugeordnet werden kann. Das ist eine Besonderheit von Funktionen und nicht des Koordinatensystems an sich, da Funktionen **Abbildungen** (S. 6) sind. Im Koordinatensystem können wir noch viele andere Gebilde darstellen, so z.B. auch einen Kreis.

Für die Koordinatenform eines Kreises mit dem Radius  $r$  und dem Mittelpunkt  $M(x_m | y_m)$  gilt folgende Notation:


$$(x - x_m)^2 + (y - y_m)^2 = r^2$$



## 9 Differenzialrechnung

### 9.1 Die Ableitung

Die Ableitung einer Funktion gibt Aufschluss über ihr [Monotonieverhalten](#) (S. 48) und die Veränderung ihres Anstiegs, denn die Werte der Ableitung  $f'(x)$  einer Funktion  $f(x)$  entsprechen dem Anstieg einer Tangente an derselben Stelle von  $f(x)$ . Das kann man auch an dem unten stehenden Beispiel erkennen. Um eine Potenzfunktion abzuleiten, nehmen wir den Exponenten von jedem  $x$  und holen ihn hinunter, um ihn vor das jeweilige  $x$  zu schreiben. Anschließend reduzieren wir den Exponenten um 1. Dabei ist zu beachten, dass die Ableitung einer reinen Zahl ohne  $x$  immer 0 ist und, dass die Ableitung von  $x = 1$  ist, denn  $x^0$  entspricht 1.



Hinweis: Um Fehler zu vermeiden, sollte man zunächst alle Terme so umformen, dass man einfach ableiten kann. Dafür solltest du die wichtigsten [Rechengesetze](#) (S. 15) beherrschen.

#### Ableitungsregeln

Neben der oben genannten Ableitungsregel von Funktionen, gibt es noch einige andere, die einem das Leben erleichtern:


$c$	$\rightarrow 0$	$\sin(x)$	$\rightarrow \cos(x)$
$x^n$	$\rightarrow nx^{n-1}$	$\cos(x)$	$\rightarrow -\sin(x)$
$\sqrt{x}$	$\rightarrow \frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\tan(x)$	$\rightarrow \frac{1}{\cos^2 x}$
$e^x$	$\rightarrow e^x$	$u(x) \cdot v(x)$	$\rightarrow u'(x) \cdot v(x) + u(x) \cdot v'(x)$
$\ln(x)$	$\rightarrow \frac{1}{x}$	$\frac{u(x)}{v(x)}$	$\rightarrow \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$
$a^x (a > 0)$	$\rightarrow \ln(a) \cdot a^x$	$(u \circ v)(x)$	$\rightarrow u'(v(x)) \cdot v'(x)$
$\frac{1}{x^n}$	$\rightarrow -\frac{n}{x^{n+1}}$		

Tipp: Solltest du es einmal nicht schaffen, eine Funktion mit den Ableitungsregeln abzuleiten oder diese vergessen haben, kannst du die Ableitung immer noch mithilfe des [Differentialquotienten](#) (S. 68) bestimmen.

### 9.1.1 Differenzenquotient

Um die Steigung einer Sekante zwischen zwei Punkten zu berechnen, benutzen wir den Differenzenquotient. Dieser Quotient berechnet sich indem man  $x$  und  $y$  der beiden Punkte jeweils voneinander abzieht und dann  $y$  durch  $x$  teilt.

$$m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



Allgemeiner ausgedrückt, gilt die Formel:

$$m = \frac{f(x+h) - f(x)}{x+h-x} = \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Dabei ist  $h$  eine beliebige Zahl, mit deren Hilfe wir uns jetzt an die genaue Steigung in einem Punkt annähern können. Je kleiner wir den Abstand  $h$  wählen, desto genauer kommen wir an die Tangente oder auch Steigung der Stelle  $x$ .

### 9.1.2 Differentialquotient

Der Differenzenquotient erlaubt es uns die Steigung einer Funktion an einer bestimmten Stelle zu bestimmen. Im Abschnitt über den [Differenzenquotient](#) (S. 68) haben wir schon geklärt, dass wir näher an den Anstieg an der Stelle  $x$  kommen, wenn wir den Abstand  $h$  verringern. Der kleinstmögliche Abstand wäre theoretisch 0. Das geht allerdings nicht, da wir nicht  $h = 0$  in die Formel für den Differenzenquotient einsetzen und den Divisor somit gleich 0 setzen dürfen. Um uns zu überlegen, was also für ein minimal kleines  $h$  passieren würde, brauchen wir den Limes.

$$\lim_{h \rightarrow 0} m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = f'(x)$$


Da setzen wir jetzt unsere Funktion  $f(x) = x^3 + 2$  ein und formen solange um, bis wir das  $h$  aus dem Divisor kriegen, damit wir für  $h$  die Zahl 0 einsetzen können. Hinweis: Nachdem du für  $h$  die Zahl 0 eingesetzt hast, darfst du nicht mehr Limes davor schreiben!

$$\begin{aligned} & \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x+h)^3 + 2 - x^3 - 2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3hx^2 + 2xh^2 + h^3 + 2 - x^3 - 2}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3hx^2 + 2xh^2 + h^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 2xh + h^2) \\ &= 3x^2 \end{aligned}$$

Das, was wir jetzt haben, ist die erste Ableitung  $f'(x)$ . Sofern nicht anders gewünscht, kann man diese oft auch wesentlich leichter bestimmen, indem man die [Ableitungsregeln](#) (S. 67) kennt.

### 9.1.3 Extrem- und Wendepunkte

Leitet man die Ableitung einer Funktion noch mal ab, erhält man die zweite Ableitung  $f''(x)$ . Ebenso verhält es sich mit der dritten Ableitung und allen weiteren. In der folgenden Abbildung sieht man eine Funktion und ihre erste, zweite sowie dritte Ableitung.



Man spricht bei den Bedingungen zur Bestimmung besonderer Punkte von notwendigen Bedingungen. Es existieren zudem weitere Bedingungen, mit deren Hilfe man diese Punkt genauer untersuchen kann, die sogenannten hinreichenden Bedingungen. Die obige Abbildung soll helfen, diese Bedingungen nachzuvollziehen.

#### Notwendige Bedingungen

Wenn  $f'(x) = 0$  gilt, dann ist bei  $x$  ein **Extremal- o. Sattelpunkt** von  $f$ .

Wenn  $f''(x) = 0$  gilt, dann ist bei  $x$  ein **Wendepunkt** von  $f(x)$ .

#### Hinreichende Bedingungen

Wenn  $f'(x) = 0 \wedge f''(x) \neq 0$  gilt, besitzt  $f$  eine **Extremalpunkt** bei  $x$ .

Wenn  $f'(x) = 0 \wedge f''(x) > 0$  gilt, dann ist bei  $x$  ein **Minimum** von  $f$ .

Wenn  $f'(x) = 0 \wedge f''(x) < 0$  gilt, dann ist bei  $x$  ein **Maximum** von  $f$ .

Wenn  $f''(x) = 0 \wedge f'(x) = 0$  gilt, besitzt  $f$  einen **Sattelpunkt** bei  $x$ .

Wenn  $f''(x) = 0 \wedge f'''(x) < 0$  gilt, dann ist bei  $x$  eine **Links-Rechts-Krümmung**.

Wenn  $f''(x) = 0 \wedge f'''(x) > 0$  gilt, dann ist bei  $x$  eine **Rechts-Links-Krümmung**.

Hinweis: Das Zeichen  $\wedge$  bedeutet »und«, während  $\vee$  »oder« bedeutet.

## 9.2 Limes: Der Grenzwert

Für manche Funktionen ist es nicht möglich den Werte einer bestimmten Stelle zu errechnen. Manchmal will man auch das Verhalten einer Funktion wissen, wenn  $x$  gegen Unendlich geht. In u.a. diesen Fällen braucht man dem Limes. Um den Grenzwert einer Funktion für  $x \rightarrow a$  zu ermitteln muss man den links- und den rechtsseitigen Grenzwert betrachten. Es gilt Folgendes:

Um zu überprüfen, ob für eine Funktion mit  $x$  gegen  $a$  ein Grenzwert existiert, schaut man sich jeweils den linksseitigen und rechtsseitigen Grenzwert an. Sind diese gleich, so existiert ein Grenzwert. Sind sie unterschiedlich, existiert kein Grenzwert.

Beim Grenzwert setzt man Zahlen ein, die sich in die Richtung von  $a$  bewegen. Nehmen wir beispielsweise  $f(x) = \frac{1}{x}$ . 0 können wir ja nicht für  $x$  einsetzen, da wir nicht durch Null teilen dürfen. Was wir aber machen können, ist, sehr kleine Zahlen einzusetzen, um zu schauen, ob wir eine Tendenz feststellen können.

$$f(1) = \frac{1}{1} = 1$$

$$f(0,1) = \frac{1}{0,1} = 10$$

$$f(00,1) = \frac{1}{00,1} = 100$$

$$f(000,1) = \frac{1}{000,1} = 1000$$

$$\lim_{x \searrow 0} \frac{1}{x} = \infty$$

Wir sehen also, dass sich unsere Funktion für  $x$  gegen Null Unendlich nähert. Das, was wir uns jetzt angeguckt haben, ist aber nur der , da wir Werte größer als 0 eingesetzt haben und uns somit von rechts angenähert haben. Jetzt machen wir das Ganze noch einmal von links.

$$f(-1) = \frac{1}{-1} = -1$$

$$f(-0,1) = \frac{1}{-0,1} = -10$$

$$f(-00,1) = \frac{1}{-00,1} = -100$$

$$f(-000,1) = \frac{1}{-000,1} = -1000$$

$$\lim_{x \nearrow 0} \frac{1}{x} = -\infty$$

Wir sehen, dass  $\infty \neq -\infty$  gilt. Somit haben wir keinen Grenzwert für  $x \rightarrow 0$ . Übrigens gibt es für den links- und rechtsseitigen Grenzwert unterschiedliche Notationen. Ich benutze hier, die Variante mit den diagonalen Pfeilen, da ich finde, dass sie gut darstellt, was man bei der Annäherung mit dem  $x$  anstellt.


### Linksseitiger Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow a^-} \text{ oder } \lim_{x \uparrow a} \text{ oder } \lim_{x \nearrow a} \text{ oder } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}}$$

### Rechtsseitiger Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow a^+} \text{ oder } \lim_{x \downarrow a} \text{ oder } \lim_{x \searrow a} \text{ oder } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}}$$

## 9.3 Differenzierbarkeit



Was uns an dem obigen Beispiel jetzt speziell interessiert, ist die Stelle  $x = 2$ . Wir wollen wissen, ob  $f$  in dieser Stelle stetig bzw. differenzierbar ist. Das heißt quasi, dass wir wissen wollen, ob man die Funktion zeichnen kann, ohne den Stift abzusetzen. Aber Achtung: Das ist keine sehr akkurate Definition, denn es gibt auch Funktionen, die stetig sind, obwohl man sie nicht durchzeichnen kann. Deshalb hier die mathematischen Bedingungen, die erfüllt sein müssen.

Wenn eine Funktion  $f(x)$  an der Stelle  $x_0$  folgende Bedingungen erfüllt, so ist sie in dieser Stelle *differenzierbar* bzw. *stetig*.

1.  $x_0 \in \mathbb{D}$
2.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  existiert
3.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Sind die obigen Bedingungen für alle  $x$  der Definitionsmenge erfüllt, so spricht man von einer *stetigen Funktion*.

Schauen wir uns das einmal für unser Beispiel an. Die erste Bedingung ist erfüllt, denn für  $x = 2$  ist  $x$  definiert und es gilt  $f(2) = \frac{1}{2}(2)^2 = 2$ . Als nächsten prüfen wir die zweite Bedingung.


$$\lim_{x \nearrow 2} f(x) = \lim_{x \nearrow 2} x^2 = 2^2 = 4$$

$$\lim_{x \searrow 2} f(x) = \lim_{x \searrow 2} \frac{1}{2}x^2 = \frac{1}{2} \cdot 2^2 = 2$$

Unsere zweite Bedingung ist somit nicht erfüllt. Der linksseitige und der rechtsseitige Grenzwert sind unterschiedlich und somit existiert an dieser Stelle auch kein Grenzwert. Daher brauchen wir die letzte Bedingung gar nicht erst überprüfen und können es sogar nicht, da uns der Grenzwert fehlt.

### 9.3.1 Stetige Erweiterung

Eine Funktion wie z.B.  $f(x) = \frac{1}{x}$  hat zwar keinen Grenzwert für  $x \rightarrow 0$ , allerdings ist sie trotzdem stetig, da ihr Definitionsbereich  $\mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$  die 0 ausschließt. Das ist wichtig zu wissen bei der Bestimmung der Differenzierbarkeit.




Jetzt kann es aber sein, dass wir gerne die Definitionslücken unserer Funktion definieren wollen. Das geht sogar mithilfe der stetigen Erweiterung, allerdings nicht für jede Lücke. Eine Lücke, die man bestimmen kann, nennt man (be)hebbar. Damit eine Lücke behebbar ist, müssen die Bedingungen für die Differenzierbarkeit gegeben sein, außer der, dass  $x_0$  nicht im Definitionsbereich liegt. Würde  $x$  im Definitionsbereich liegen hätten wir natürlich auch keine Lücke. Logisch. Das Kriterium, dass der Grenzwert dem Funktionswert an der Stelle  $x_0$  entspricht entfällt dementsprechend auch.

Ist eine Lücke einer Funktion *(be)hebbar*, so sind folgende Bedingungen erfüllt:

1.  $x_0 \notin \mathbb{D}$
2.  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  existiert

Für  $x \rightarrow 0$  bei  $f(x) = \frac{1}{x}$  haben wir keinen Grenzwert, somit ist die Funktion an der Stelle  $x = 0$  nicht stetig erweiterbar. Es folgt noch ein Beispiel einer stetig erweiterbaren Lücke.





Diese Funktion verhält sich jetzt wie eine Normalparabel. Leider ist sie für  $x = 0$  nicht definiert, da wir nicht durch 0 teilen dürfen, also schauen wir, ob wir sie an dieser Stelle stetig erweitern können. In diesem Fall können wir uns den Test für links- und rechtsseitigen Grenzwert sparen, denn ich denke, man erkennt hier, dass wir einen Grenzwert haben.

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x} - 5 &= \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - 5) \\ &= -5\end{aligned}$$

Mit dem Grenzwert können wir jetzt eine zusammengesetzte Funktion aufstellen.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{x} & \text{falls } x \neq 0 \\ -5 & \text{falls } x = 0 \end{cases}$$

## 9.4 Tangentengleichung


Wenn man Extremal- und Wendepunkte untersucht, kann es vorkommen, dass man eine Tangente für diese Punkte bestimmen soll. Das ist nicht schwer, denn man muss nur zwei Konstanten bestimmen. Da eine Tangente eine lineare Funktion ist, hat sie die grundlegende Form  $T(x) = mx + n$ . Sagen wir, wir wollen die Tangentengleichung an der Stelle  $x = 2$  der Funktion  $f(x) = x^2 + 4$  aufstellen. Um  $m$  zu bestimmen brauchen wir den Anstieg an der Stelle  $x$ . Diesen können wir mit der ersten Ableitung an der Stelle  $x$  ermitteln.

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2 + 4 \\ f'(x) &= 2x \\ f'(2) &= 4\end{aligned}$$

Das können wir schon mal in unsere Gleichung einsetzen und erhalten  $T(x) = 4x + n$ . Jetzt fehlt uns noch  $n$ , welches wir durch Umstellen bestimmen können, nachdem wir  $x$  und  $T(x)$  eingesetzt haben. Gesucht ist ja die Tangente an der Stelle  $x = 2$ . Den  $x$ -Wert haben wir also schon mal und  $f(x)$  bzw.  $T(x)$  (Punkt existiert auf beiden Funktionen) können wir ganz einfach durch Einsetzen in die Funktion berechnen.

$$\begin{aligned}f(2) &= 8 = T(2) \\ T(2) &= 4 \cdot 2 + n \\ 8 &= 4 \cdot 2 + n \\ n &= 0\end{aligned}$$

Da  $n = 0$  ist, können wir es weglassen und haben bereits unsere vollständige Tangentengleichung. Hier nochmal eine Abbildung, um zu zeigen, dass das Ergebnis auch wirklich richtig ist.



## 9.5 Kurvendiskussion

In einer Kurvendiskussion untersucht man verschiedene Eigenschaften einer Funktion. Wie man diese Eigenschaften jeweils untersucht wird an anderen Stellen erklärt, die auch noch mal genannt werden. Im Folgenden wird einmal eine komplette Kurvendiskussion beispielhaft durchgeführt. Da man normalerweise keine Abbildung zur Verfügung hat, weil man die Funktion selber skizzieren soll, gibt es den Graphen der Funktion erst am Ende. Die zu untersuchende Funktion ist:

$$f(x) = x^5 - 3x^3 + 2x$$

### 9.5.1 Symmetrie

Für diesen Teil der Kurvendiskussion solltest du wissen, wie man die [Symmetrie](#) (S. 50) einer Funktion bestimmt.

#### Aufgabe:

Bestimme begründet, ob die Funktion gerade, ungerade oder weder noch ist.

#### Lösung:

Dazu müssen wir  $f(-x)$  betrachten. Ist es gleich  $f(x)$  haben wir eine gerade Funktion, ist es gleich  $-f(x)$  haben wir eine ungerade Funktion, ansonsten haben wir weder noch.

$$f(-x) = (-x)^5 - 3 \cdot (-x)^3 + 2 \cdot (-x)$$

$$f(-x) = -x^5 + 3x^3 - 2x$$

$$-f(x) = -(x^5 - 3x^3 + 2x)$$

$$-f(x) = -x^5 + 3x^3 - 2x$$

Da  $f(-x) = -f(x)$  gilt, liegt hier eine ungerade Funktion vor.

### 9.5.2 Nullstellen

Für diesen Teil der Kurvendiskussion solltest du wissen, wie man [Gleichungen](#) (S. 20) lösen kann.

#### Aufgabe:

Bestimme alle Nullstellen der Funktion.

#### Lösung:

$$\begin{array}{ll}
x^5 - 3x^3 + 2x = 0 & | \text{ Faktorisierung durch Ausklammern von } x \\
\Leftrightarrow x(x^4 - 3x^2 + 2) = 0 & \\
\Rightarrow x^4 - 3x^2 + 2 = 0 & | \text{ Substitution: } u = x^2 \\
\Rightarrow u^2 - 3u + 2 = 0 & | \text{ p-q-Formel} \\
\Rightarrow u_{1,2} = \frac{3}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{3}{2}\right)^2 - 2} & \\
\Rightarrow u_1 = 2 & | \text{ Resubstitution: } u = x^2 \\
\Rightarrow x^2 = 2 & \\
\Rightarrow x_{1,2} = \pm\sqrt{2} & \\
\Rightarrow u_2 = 1 & | \text{ Resubstitution: } u = x^2 \\
\Rightarrow x^2 = 1 & \\
\Rightarrow x_{3,4} = \pm 1 & 
\end{array}$$

$$\mathbb{L} = \{-\sqrt{2}; -1; 0; 1; \sqrt{2}\}$$

### 9.5.3 Schnittpunkt mit y-Achse

Den  $y$ -Achsen Schnittpunkt zu bestimmen, ist ganz einfach. Man muss nur  $x = 0$  einsetzen und das Ergebnis ausrechnen.

#### Aufgabe:

Bestimme den Schnittpunkt mit der  $y$ -Achse der Funktion.

#### Lösung:

In diesem Fall müssen wir eigentlich gar nicht rechnen, da wir bereits wissen, dass bei  $x = 0$  eine Nullstelle vorliegt. Trotzdem ist hier noch einmal der rechnerische Nachweis.

$$\begin{array}{ll}
f(x) = x^5 - 3x^3 + 2x & \\
\Rightarrow f(0) = 0^5 - 3 \cdot 0^3 + 2 \cdot 0 & \\
\Leftrightarrow f(0) = 0 & 
\end{array}$$

Damit ist der Schnittpunkt mit der  $y$ -Achse der Punkt  $S(0 \mid 0)$ .

### 9.5.4 Grenzverhalten

Für diesen Teil der Kurvendiskussion solltest du wissen, wie man den [Limes](#) (S. 70) benutzt.

#### Aufgabe:

Bestimme das Verhalten der Funktion für  $x \rightarrow \pm\infty$ .

#### Lösung:

Zunächst stellen wir die Funktion so um, dass wir den Grenzwert jedes Terms leicht einzeln betrachten können.

$$\begin{aligned}
f(x) &= x^5 - 3x^3 + 2x && | \ x^5 \text{ ausklammern} \\
\Leftrightarrow &= x^5 \left( \frac{x^5}{x^5} - \frac{3x^3}{x^5} + \frac{2x}{x^5} \right) \\
\Leftrightarrow &= x^5 \left( 1 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^4} \right)
\end{aligned}$$

Durch das Umstellen ist der Grenzwert der Funktion wesentlich einfacher zu zeigen.

$$\begin{aligned}
\lim_{x \rightarrow -\infty} x^5 \left( 1 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^4} \right) &= -\infty \\
\lim_{x \rightarrow \infty} x^5 \left( 1 - \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^4} \right) &= \infty
\end{aligned}$$

### 9.5.5 Extrema

Für diesen Teil der Kurvendiskussion solltest du wissen, wie man [Extrema](#) (S. 69) bestimmt.

#### Aufgabe:

Bestimme alle Extrempunkte der Funktion und gib an, ob es sich jeweils um Maxima oder Minima handelt.

#### Lösung:

In den folgenden Abschnitten werden wir die Ableitungen benötigen, daher hier einmal alle Funktionen gesammelt:

$$\begin{aligned}
f(x) &= x^5 - 3x^3 + 2x \\
\Rightarrow f'(x) &= 5x^4 - 9x^2 + 2 \\
\Rightarrow f''(x) &= 20x^3 - 18x \\
\Rightarrow f'''(x) &= 60x^2 - 18
\end{aligned}$$

Notwendige Bedingung für Extrempunkte:  $f'(x) = 0$

$$\begin{aligned}
f'(x) &= 5x^4 - 9x^2 + 2 \\
\Rightarrow 0 &= 5x^4 - 9x^2 + 2 && | \text{ Substitution: } u = x^2 \\
\Rightarrow 0 &= 5u^2 - 9u + 2 && | : 5 \\
\Leftrightarrow 0 &= u^2 - 1,8u + 0,4 && | \text{ p-q-Formel} \\
\Rightarrow u_{1,2} &= \frac{1,8}{2} \pm \sqrt{\left(-\frac{1,8}{2}\right)^2 - 0,4} \\
\Rightarrow u_1 &= \frac{9 + \sqrt{41}}{10} && | \text{ Resubstitution: } u = x^2 \\
\Rightarrow x^2 &= \frac{9 + \sqrt{41}}{10} \Rightarrow x_{1,2} = \pm 1,241093237 \\
\Rightarrow u_2 &= \frac{9 - \sqrt{41}}{10} && | \text{ Resubstitution: } u = x^2 \\
\Rightarrow x^2 &= \frac{9 - \sqrt{41}}{10} \Rightarrow x_{3,4} = \pm 0,5095955026
\end{aligned}$$

Durch Einsetzen der ermittelten  $x$ -Werte, bekommen wir auch die  $y$ -Werte für die Punkte.

$$\mathbb{L} = \{(-1, 241093237; 0, 3082564193), (-0, 5095955026; -0, 656550059), \\ (0, 5095955026; -0, 656550059), (1, 241093237; 0, 3082564193)\}$$

Hinreichende Bedingung für Maxima:  $f'(x) = 0 \wedge f''(x) < 0$

Hinreichende Bedingung für Minima:  $f'(x) = 0 \wedge f''(x) > 0$

$$f''(-1, 241093237) = 20 \cdot (-1, 241093237)^3 - 18 \cdot (-1, 241093237) = -15,89374835 < 0$$

$$f''(-0, 5095955026) = 20 \cdot (-0, 5095955026)^3 - 18 \cdot (-0, 5095955026) = 6,526006628 > 0$$

Da unsere Funktion ungerade ist, können wir darauf schließen, dass die Extrema auf der anderen Seite der  $y$ -Achse genau gegenteilig sind. Daher gilt also:

$$x = -1, 241093237 \Rightarrow \text{Maximalstelle}$$

$$x = -0, 5095955026 \Rightarrow \text{Minimalstelle}$$

$$x = 0, 5095955026 \Rightarrow \text{Maximalstelle}$$

$$x = 1, 241093237 \Rightarrow \text{Minimalstelle}$$

### 9.5.6 Wendepunkte

Für diesen Teil der Kurvendiskussion solltest du wissen, wie man [Wendepunkte](#) (S. 69) bestimmt.

#### Aufgabe:

Bestimme alle Wendepunkte der Funktion und gib ihr Krümmungsverhalten an.

#### Lösung:

Notwendige Bedingung für Wendepunkte:  $f''(x) = 0$

$$f''(x) = 20x^3 - 18x$$

$$\Rightarrow 0 = 20x^3 - 18x \quad | \text{Faktorisierung durch Ausklammern von } x$$

$$\Rightarrow 0 = x(20x^2 - 18) \quad | \text{Ein Wendepunkt ist } x_1 = 0$$

$$\Rightarrow 0 = 20x^2 - 18 \quad | +18$$

$$\Leftrightarrow 18 = 20x^2 \quad | :20$$

$$\Leftrightarrow \frac{9}{10} = x^2 \quad | \sqrt{\phantom{x}}$$

$$\Rightarrow x_{2,3} = \pm \sqrt{\frac{9}{10}}$$

$$\mathbb{L} = \left\{ \left( -\sqrt{\frac{9}{10}}; -0,1043551628 \right), (0; 0), \left( \sqrt{\frac{9}{10}}; 0,1043551628 \right) \right\}$$

Hinreichende Bedingung für Links-Rechts-Krümmung:  $f'(x) = 0 \wedge f'''(x) < 0$

Hinreichende Bedingung für Rechts-Links-Krümmung:  $f'(x) = 0 \wedge f'''(x) > 0$

$$f''' \left( -\sqrt{\frac{9}{10}} \right) = 60 \cdot \left( -\sqrt{\frac{9}{10}} \right)^2 - 18 = 36 > 0$$

$$f'''(0) = 60 \cdot (0)^2 - 18 = -18 < 0$$

$$f''' \left( \sqrt{\frac{9}{10}} \right) = 60 \cdot \left( \sqrt{\frac{9}{10}} \right)^2 - 18 = 36 > 0$$

$$x = -\sqrt{\frac{9}{10}} \Rightarrow \text{Rechts-Links-Krümmung}$$

$$x = 0 \Rightarrow \text{Links-Rechts-Krümmung}$$

$$x = \sqrt{\frac{9}{10}} \Rightarrow \text{Rechts-Links-Krümmung}$$

### 9.5.7 Tangentengleichungen der Wendepunkte

Für diesen Teil der Kurvendiskussion solltest du wissen, wie man eine [Tangentengleichung](#) (S. 73) aufstellt.

#### Aufgabe:

Stelle eine Tangentengleichung für die Wendestelle mit dem kleinsten  $x$ -Wert auf.

#### Lösung:


Die Grundgleichung für eine lineare Funktion ist  $T(x) = mx + n$ . Wir müssen dafür  $m$  und  $n$  bestimmen. Den Anstieg  $m$  erhalten wir aus der ersten Ableitung an der Wendestelle.

$$\begin{aligned} f'(x) &= 5x^4 - 9x^2 + 2 \\ \Rightarrow f' \left( -\sqrt{\frac{9}{10}} \right) &= 5 \left( -\sqrt{\frac{9}{10}} \right)^4 - 9 \left( -\sqrt{\frac{9}{10}} \right)^2 + 2 \\ \Leftrightarrow &= -\frac{41}{20} \end{aligned}$$

Jetzt, wo wir  $m$  bestimmt haben, können wir die Koordinaten von unserem Wendepunkt einsetzen und nach  $n$  umstellen.

$$\begin{aligned} -0,1043551628 &= -\frac{41}{20} \cdot \left( -\sqrt{\frac{9}{10}} \right) + n \\ \Leftrightarrow -0,1043551628 &= 1,944800761 + n \quad | -1,944800761 \\ \Leftrightarrow n &= -2,049155924 \end{aligned}$$

Damit ist unsere Tangentengleichung  $T(x) = -\frac{41}{20}x - 2,049155924$ . Mit den ermittelten Informationen können wir folgende Abbildung zeichnen:



### 9.5.8 Flächenberechnung

Für diesen Teil der Kurvendiskussion solltest du wissen, wie man [Integralrechnung](#) (S. 80) durchführt.

#### Aufgabe:

Berechne die Fläche, die zwischen den äußersten Nullstellen von Funktion und  $x$ -Achse eingeschlossen wird.

#### Lösung:

Zunächst müssen wir die Stammfunktion bilden. Diese lautet  $F(x) = \frac{1}{6}x^6 - \frac{3}{4}x^4 + x^2 + k$ . Anschließend bilden wir das Integral mit den Grenzen  $-\sqrt{2}$  und  $-1$ , sowie mit den Grenzen  $0$  und  $1$ . Welche Flächen wir damit berechnen, kann man an der obigen Skizze gut erkennen. Da durch die Punktsymmetrie der Funktion zum Nullpunkt diese Flächen jeweils zwei Mal vorliegen, müssen wir das Ergebnis nur verdoppeln und haben die Gesamtfläche.


$$\begin{aligned} \int_{-\sqrt{2}}^{-1} (x^5 - 3x^3 + 2x) dx &= \left[ \frac{1}{6}x^6 - \frac{3}{4}x^4 + x^2 + k \right]_{-\sqrt{2}}^{-1} \\ &= \frac{1}{6}(-1)^6 - \frac{3}{4}(-1)^4 + (-1)^2 + k - \left( \frac{1}{6}(-\sqrt{2})^6 - \frac{3}{4}(-\sqrt{2})^4 + (-\sqrt{2})^2 + k \right) \\ &= \frac{5}{12} + k - (0, \bar{3} + k) \\ &= \frac{5}{12} + k - 0, \bar{3} - k = \underline{\underline{\frac{1}{12}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 (x^5 - 3x^3 + 2x) dx &= \left[ \frac{1}{6}x^6 - \frac{3}{4}x^4 + x^2 + k \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{6}(1)^6 - \frac{3}{4}(1)^4 + (1)^2 + k - \left( \frac{1}{6}(0)^6 - \frac{3}{4}(0)^4 + (0)^2 + k \right) \\ &= \frac{5}{12} + k - (0 + k) \\ &= \frac{5}{12} + k - 0 - k = \underline{\underline{\frac{5}{12}}} \end{aligned}$$

$$F = 2 \cdot \left( \frac{1}{12} + \frac{5}{12} \right) = 1 \text{ Flächeneinheit}$$

## 10 Integralrechnung

Ein Integral gibt den Flächeninhalt zwischen einer Funktion und der  $x$ -Achse in einem bestimmten Intervall wieder. Dabei ist zu beachten, dass die Flächen unterhalb der  $x$ -Achse negativ sind, weshalb man jeden Abschnitt einzeln berechnen und anschließend addieren sollte.



Das unbestimmte Integral ist die Menge der Stammfunktionen einer Funktion  $f(x)$ :


$$\int f(x)dx = F(x) + k$$

Für das bestimmte Integral mit den Integrationsgrenzen  $a$  und  $b$ , sowie der Integrationsvariable  $x$  und dem Differential  $dx$  gilt folgende Notation:


$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

Um das zu verstehen, müssen wir uns erst einmal angucken, was das überhaupt bedeutet. Wenn wir die Fläche unter einer linearen Gleichung berechnen wollten, wäre das ziemlich einfach, da wir schnell ein Drei- oder Viereck konstruieren können, dessen Fläche wir berechnen. Mit anderen Funktionstypen ist das aber nicht so einfach. Wir können die Fläche annähernd berechnen, wenn wir sie mit Formen füllen, deren Flächen wir einfach berechnen können. Dafür nehmen wir Rechtecke. Die breite der Rechtecke nennen wir  $\Delta x$ . Das bedeutet quasi nur  $x_2 - x_1$ .





Wenn wir unsere Rechtecke schmäler und schmäler machen, dann wird unser Ergebnis immer akkurater. Wenn wir unsere Rechtecke minimal klein machen schreiben wir anstatt  $\Delta x$  jedoch  $dx$ .



Genau diese immer kleiner werdenden Rechtecke werden durch das Integral dargestellt. Man rechnet die Stammfunktion an der oberen Grenze minus die Stammfunktion an der unteren Grenze. In der Kurvendiskussion gibt es ein rechnerisches [Beispiel](#) (S. 79) für die Anwendung des Integrals.

## 10.1 Die Stammfunktion

Das Gegenteil vom Differenzieren ist das Integrieren. Damit kann man von einer Ableitung auf die nächst niedrigere Ableitung schließen, z.B. von  $f''(x)$  auf  $f'(x)$ . Die Funktion, die man daraus erhält, nennt man Stammfunktion. Auch eine nicht abgeleitete Funktion besitzt eine Stammfunktion. Diese wird mit einem großen  $F(x)$  bezeichnet. Da das Integrieren das Gegenteil des Differenzieren ist, gelten dieselben [Regeln](#) (S. 67), jedoch umgekehrt. Anstatt z.B. den Exponenten um 1 zu reduzieren und mit ihm zu multiplizieren, wird er um 1 erhöht und durch ihn geteilt. Beim Integrieren fügt man jedoch noch  $k$  für eine beliebige Zahl hinzu, denn beim Ableiten geht diese verloren. Daher sind Stammfunktionen nicht eindeutig, wie es die Ableitungen sind. Die Stammfunktion von  $f(x) = 2x$  ist beispielsweise  $F(x) = x^2 + k$ .

## Integrationsregeln

Da es manchmal schwierig sein kann, umgekehrt zu denken, hier noch mal die wichtigsten Regeln zur Bildung der Stammfunktion:

$c$	$\rightarrow c \cdot x + k$	$\ln(x)$	$\rightarrow -x + x \cdot \ln(x) + k$
$x^n$	$\rightarrow \frac{1}{n+1}x^{n+1} + k$	$\sin(x)$	$\rightarrow -\cos(x) + k$
$\frac{1}{x}$	$\rightarrow \ln x  + k$	$\cos(x)$	$\rightarrow \sin(x) + k$
$\sqrt[n]{x}$	$\rightarrow \frac{1}{\frac{1}{n}+1}x^{\frac{1}{n}+1} + k$	$\tan(x)$	$\rightarrow -\ln \cos(x)  + k$
$e^x$	$\rightarrow e^x$	$\frac{f'(x)}{f(x)}$	$\rightarrow \ln f(x) + k$

## Die lineare Substitution

Haben wir eine verkettete Funktion deren innere Funktion eine lineare Funktion ist, so gilt folgende Integrationsregel:

$$\int f(mx+b)dx = \frac{1}{m}F(mx+b) + k$$

## 10.2 Partielle Integration

Wenn man ein Produkt integrieren möchte, braucht man die partielle Integration. Abgeleitet aus der Produktregel der Differentialrechnung, ergibt sich folgende Formel:

$$\int f'(x) \cdot g(x)dx = f(x) \cdot g(x) - \int f(x) \cdot g'(x)dx$$

Zum besseren Verständnis noch mal ein Beispiel:  $\int x \cdot e^x dx$ .

$$\begin{aligned} & \int (x \cdot e^x) dx \\ &= e^x \cdot x - \int (e^x \cdot 1) dx \\ &= e^x \cdot x - e^x + k \\ &= e^x \cdot (x - 1) + k \end{aligned}$$

## 10.3 Integration durch Substitution

$$\int_{g(a)}^{g(b)} f(x) dx = \int_a^b f(g(u)) \cdot g'(u) du$$

Möchte man eine verkettete Funktion oder besonders schwierige Funktion integrieren, wird es mit den bisherigen Regeln schwierig. Wir müssen hier substituieren, um eine Stammfunktion zu erzeugen. Die obenstehende Regel, gibt uns einige wichtige Unterregeln. Dabei ist vor allem Folgendes wichtig:

$$\begin{aligned} x &= g(u) \\ dx &= g'(u) du \end{aligned}$$

Damit können wir jetzt unsere Substitution durchführen. Als erstes ersetzen wir den Term, der uns das Integrieren so schwer macht durch eine Variable.

$$\begin{aligned} &\int_{-1}^0 \sqrt{1-2x} dx \quad | \quad u = 1-2x \\ \Rightarrow &\int_{-1}^0 \sqrt{u} du \end{aligned}$$

Da wir gerade noch nach  $x$  integrieren, müssen wir jetzt noch das  $du$  und die Grenzen ersetzen. Laut den obigen Formeln ist  $dx = g'(u) du$ . Das heißt, um auf  $dx$  zu kommen, brauchen wir nur die Ableitung  $g'(u)$ . Wir wissen, dass  $x$  gleich  $g(u)$  ist. In diesem Fall ist  $u = 1 - 2x$ . Wenn wir diese Gleichung nach  $x$  umstellen kommen wir auch auf  $g(u)$ , welches wir anschließend ableiten, um das Differential zu ersetzen.

$$\begin{aligned} u &= 1 - 2x \\ \Leftrightarrow -2x &= u - 1 \\ \Leftrightarrow x &= \frac{-u + 1}{2} = g(u) \\ \Rightarrow g'(u) &= -\frac{1}{2} \\ \Rightarrow &\int_{-1}^0 \sqrt{u} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) du \end{aligned}$$

Jetzt muss man bei einem bestimmten Integral noch die Grenzen ersetzen. Das tut man, indem man die Grenzen für  $x$  in die Gleichung von  $u$  einsetzt.

$$\begin{aligned}
& u = 1 - 2x \\
\Rightarrow & u = 1 - 2 \cdot 0 = 1 \\
\Rightarrow & u = 1 - 2 \cdot (-1) = 3 \\
\Rightarrow & \int_3^1 \sqrt{u} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) du \\
\Leftrightarrow & \left[-\frac{1}{3}u^{\frac{3}{2}}\right]_3^1 \approx 1,399
\end{aligned}$$

Hinweis: Hat man ein bestimmtes Integral, muss man nicht resubstituieren. Hat man ein unbestimmtes Integral, muss man für  $u$  wieder den ursprünglichen Wert einsetzen:

$$\int (\sqrt{1-2x}) dx = \left[-\frac{1}{3}(1-2x)^{\frac{3}{2}} + k\right]$$

In der Kurzzusammenfassung funktioniert Integration durch Substitution so:


1. Schwierigen Term durch  $u$  ersetzen
2.  $u$ -Gleichung nach  $x$  umstellen ( $x = g(x)$ )
3. Umgestellten Term ableiten ( $dx = g'(u) du$ ) und Differential ersetzen
4. **Bestimmtes Integral:** Grenzen anpassen, indem man Werte in  $u$  einsetzt
4. **Unbestimmtes Integral:** Resubstitution

## 10.4 Die Fläche zwischen zwei Graphen

Wollen wir die Fläche zwischen zwei Funktionen berechnen, bilden wir einfach das Integral der Differenzfunktion dieser zwei Funktionen.

$$\left| \int_a^b f(x) - g(x) dx \right|$$

Achtung: Wenn die Differenzfunktion Nullstellen hat, bzw. die Funktionen sich schneiden, muss die Fläche schrittweise ermittelt werden. Dazu ein Beispiel:



Gesucht ist die blau markierte Fläche im Intervall  $[0, 2]$ . Wenn wir den gezeichneten Graphen nicht vorliegen hätten, dann müssten wir erst testen, ob eine Nullstelle in diesem Intervall vorliegt. Dazu können wir z.B. eine Wertetabelle anlegen.

$x$	0	0,5	1	1,5	2
$f(x)$	-1	-0,375	0,5	0,875	0

Jetzt können wir das [Newtonverfahren](#) (S. 50) anwenden, um die Nullstelle zu finden. Dafür brauchen wir die Ableitung der Differenzfunktion  $d'(x) = -3x^2 + 4x + \frac{1}{2}$ .

$$x_1 = (0,5) - \frac{-(0,5)^3 + 2(0,5)^2 + \frac{1}{2}(0,5) - 1}{-3(0,5)^2 + 4(0,5) + \frac{1}{2}} = \frac{5}{7}$$

$$x_2 = \left(\frac{5}{7}\right) - \frac{-\left(\frac{5}{7}\right)^3 + 2\left(\frac{5}{7}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{5}{7}\right) - 1}{-3\left(\frac{5}{7}\right)^2 + 4\left(\frac{5}{7}\right) + \frac{1}{2}} = \frac{886}{1253}$$

$$x_3 = \left(\frac{886}{1253}\right) - \frac{-\left(\frac{886}{1253}\right)^3 + 2\left(\frac{886}{1253}\right)^2 + \frac{1}{2}\left(\frac{886}{1253}\right) - 1}{-3\left(\frac{886}{1253}\right)^2 + 4\left(\frac{886}{1253}\right) + \frac{1}{2}} = 0,7071067812$$

$$x_4 = (0,7071067812) - \frac{-(0,7071067812)^3 + 2(0,7071067812)^2 + \frac{1}{2}(0,7071067812) - 1}{-3(0,7071067812)^2 + 4(0,7071067812) + \frac{1}{2}} \\ = 0,7071067812$$

Der Einfachheit halber kürzen wir die Nullstelle auf  $x_0 = 0,707$ , bevor die Teilintegrale berechnen.

$$\int_0^{0,707} \left(-x^3 + 2x^2 + \frac{1}{2}x - 1\right) dx = \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - x + k\right]_0^{0,707} \approx -0,408$$

$$\int_{0,707}^2 \left(-x^3 + 2x^2 + \frac{1}{2}x - 1\right) dx = \left[-\frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{4}x^2 - x + k\right]_{0,707}^2 \approx 0,742$$


Damit ist die gesuchte Fläche  $|-0,408| + 0,742$  bzw. 1,15 Flächeneinheiten groß.

## 10.5 Rotationsvolumen

Neben der Fläche kann man mit dem Integral auch das Volumen berechnen. Dafür muss man nur eine ganz einfache Formel anwenden:

$$V = \pi \cdot \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Dazu ein Beispiel: Gesucht ist das Volumen der abgebildeten Vase, im Bereich  $-1$  bis  $3$ .



$$f(x) = \frac{1}{e^x}$$

$\Downarrow$

$$V = \pi \cdot \int_{-1}^3 \left( \frac{1}{e^x} \right)^2 dx$$

$$\Leftrightarrow = \pi \cdot \left[ -e^{-x} + k \right]_{-1}^3$$

$$\Leftrightarrow = \pi \cdot (-e^{-3} + k + e^1 - k)$$

$$\Leftrightarrow \approx 2,67 \cdot \pi$$

$$\Leftrightarrow \approx 8,38$$

Hinweis: Wenn um die  $y$ -Achse rotiert werden soll, muss man diese Formel auf die [Umkehrfunktion](#) (S. 48) anwenden!

# 11 Logik

Die Grundlagen der Logik ähneln stark der Logik in Programmiersprachen, jedoch mit andern Symbolen. Die wichtigsten Begriffe sind zunächst einmal Negation ( $\neg$ , »nicht«), Konjunktion ( $\wedge$ , »und«), Disjunktion ( $\vee$ , »oder«), Kontravalenz ( $\nleftrightarrow$ , »entweder oder«), Äquivalenz ( $\leftrightarrow$ ) und Implikation ( $\Rightarrow$ ). Außerdem redet man bei  $W$  (wahr) und  $F$  (falsch) von Wahrheitswerten. Ob Aussagen wahr oder falsch sind, wird oft in Wahrheitstafeln dargestellt. Dazu eine Übersicht:

$A$	$B$	$\neg A$	$A \wedge B$	$A \vee B$	$A \nleftrightarrow B$	$A \leftrightarrow B$	$A \Rightarrow B$
$W$	$W$	$F$	$W$	$W$	$F$	$W$	$W$
$W$	$F$	$F$	$F$	$W$	$W$	$F$	$F$
$F$	$W$	$W$	$F$	$W$	$W$	$F$	$W$
$F$	$F$	$W$	$F$	$F$	$F$	$W$	$W$

Übrigens eine Eselsbrücke, um die Zeichen für Konjunktion und Disjunktion zu unterscheiden, sind die drei O: »Oder Oben Offen«. Und noch ein Hinweis: Die Implikation hat kein genaues Äquivalent in der Programmierung. Am besten merkt man sicher, dass eine Implikation immer wahr ist, außer für den Fall  $W \Rightarrow F$ .

Wenn eine Formel in jedem Szenario (für alle Bewertungen) wahr ist, dann spricht man von einer Tautologie. Beispielsweise ist  $A \vee \neg A$  eine solche Tautologie. Anders herum nennt man  $A \wedge \neg A$  einen Widerspruch.

Man kann des weiteren Aussagen auch von Elementen einer Menge abhängig machen. Dabei unterscheidet man, für wie viele Elemente die Aussage gelten soll. Dazu noch mal eine Übersicht über die sogenannten Quantoren:

Alle $x$	Mindestens ein $x$	Genau ein $x$	Kein $x$
$\forall x \in M : A(x)$	$\exists x \in M : A(x)$	$\exists! x \in M : A(x)$	$\nexists x \in M : A(x)$

Ein Beispiel:  $A(x) = x$  ist eine natürliche Zahl

Die Aussage  $\exists x \in \mathbb{Z} : A(x)$  ist wahr, da die ganzen Zahlen die natürlichen Zahlen beinhalten. Wenn die Aussage jedoch  $\forall x \in \mathbb{Z} : A(x)$  wäre, wäre sie falsch, da z.B.  $A(-1)$  dem widerspricht. Wenn man mehrere Quantoren benutzt, kann man gleiche auch zusammen fassen. So kann man anstatt

$$\forall a \in \mathbb{N} : \forall b \in \mathbb{N} : a > b$$

auch Folgendes schreiben:

$$\forall a, b \in \mathbb{N} : a > b.$$

## 11.1 Beweise

Oft reicht es in der Mathematik nicht aus nur ein Ergebnis zu berechnen, sondern man muss auch beweisen, dass das was man da gemacht hat, stimmt. Beweise zu finden ist nicht so trivial, wie Zahlen in eine Formel einzusetzen. Man muss ein bisschen kreativ sein und viel üben. Dafür gibt es verschiedene Herangehensweisen, die man kennen sollte.

### 11.1.1 Direkter Beweis

Beim direkten Beweis versucht man über Zwischenschritte zu zeigen, dass aus  $A$  auch wirklich  $B$  folgt. Die Idee ist simpel, aber einen Beweis zu finden ist nicht immer einfach, deshalb ein Beispiel:

Zu beweisen ist, dass für ein ungerades  $n \in \mathbb{N}$  gilt, dass  $n^2 - 1$  durch 4 teilbar ist.

$n$  ungerade  $\Rightarrow$  Es gibt ein  $k \in \mathbb{N}$ , dass  $n = 2k + 1$  erfüllt.

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n^2 - 1 = (2k + 1)^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n^2 - 1 = 4k^2 + 4k$$

$$\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{N} : n^2 - 1 = 4(k^2 + k)$$

$$\Rightarrow \exists m \in \mathbb{N} : n^2 - 1 = 4m$$

$\Rightarrow n^2 - 1$  ist durch 4 teilbar, da es das Vierfache einer natürlichen Zahl  $m$  ist.

### 11.1.2 Indirekter Beweis

Anders als beim direkten Beweis zeigt man beim indirekten Beweis nicht, dass  $A \Rightarrow B$  gilt, sondern  $\neg B \Rightarrow \neg A$  oder auch  $A \wedge \neg B \Rightarrow F$ . Dass diese Ausdrücke äquivalent sind, kann man anhand einer Wahrheitstafel überprüfen, denn sind alle Bewertungen gleich, sind die Ausdrücke äquivalent.

$A$	$B$	$A \Rightarrow B$	$\neg B \Rightarrow \neg A$	$A \wedge \neg B \Rightarrow F$
$W$	$W$	$W$	$W$	$W$
$W$	$F$	$F$	$F$	$F$
$F$	$W$	$W$	$W$	$W$
$F$	$F$	$W$	$W$	$W$

Dazu nochmal ein Beispiel:  $\sqrt{2}$  ist irrational.

$\sqrt{2}$  ist irrational.  $\Rightarrow \sqrt{2} \neq \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{N}, q \neq 0, p$  und  $q$  teilerfremd.

$\Updownarrow$

$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{N}, q \neq 0, p$  und  $q$  teilerfremd.  $\Rightarrow \sqrt{2}$  ist rational.

$$\Rightarrow \sqrt{2} = \frac{p}{q}$$

$$\Leftrightarrow 2 = \frac{p^2}{q^2}$$

$$\Leftrightarrow 2q^2 = p^2$$

$\Rightarrow p^2$  ist gerade.  $\Rightarrow p$  ist gerade.

$$\Rightarrow p = 2k$$

$$\Rightarrow 2q^2 = 4k^2$$

$$\Leftrightarrow q^2 = 2k^2$$

$\Rightarrow q^2$  ist gerade.  $\Rightarrow q$  ist gerade.

$\Rightarrow \sqrt{2}$  ist irrational, da  $p$  und  $q$  beide gerade und somit beide durch zwei teilbar, also nicht teilerfremd sind.



### 11.1.3 Vollständige Induktion

Die vollständige Induktion wird oft genutzt um Aussagen der Form  $\forall n \in \mathbb{N} : A(n)$  zu beweisen. Das wird in zwei Schritten getan. Zunächst beweist man durch Einsetzen (Induktionsanfang), dass die Aussage für das kleinstmögliche  $n$  wahr ist. Wenn man dann im Induktionsschritt zeigen kann, dass die Aussage, wenn sie für  $n$  gilt auch für  $n + 1$  gilt, hat man einen Beweis. Das kommt daher, dass man für das kleinste  $n$  eindeutig durch einsetzen bewiesen hat. Dieses  $n$  beweist dann, dass  $n + 1$  die Aussage erfüllt. Dieses wiederum beweist, dass  $n + 2$  die Aussage erfüllt und so weiter. Auch das erklärt sich am besten wieder mal mit einem Beispiel:

Zu beweisen ist diese Aussage:

$$A(n) = \forall n \in \mathbb{N} : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

#### 1. Induktionsanfang

$$\sum_{k=1}^1 k = 1$$
$$\frac{1(1+1)}{2} = 1$$

Damit haben schon einmal bewiesen, dass es ein  $n$  gibt, dass diese Aussage erfüllt.

#### 2. Induktionsschritt

$$\text{Induktionsvoraussetzung: } \exists n \in \mathbb{N} : \sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\text{Zu zeigen: } \sum_{k=1}^{n+1} k = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

Um jetzt zu zeigen, dass die Aussage für  $n + 1$  ebenfalls stimmt, wenn sie für  $n$  stimmt, setzen wir sie gleich mit der Aussage für  $n$  plus den Teil, der den Unterschied zwischen den beiden bildet ( $n + 1$ ). Das ist logisch, da wir nur noch den fehlenden Summanden drauf rechnen.

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^n k + (n+1)$$

Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass die obige Gleichung allgemein-mathematisch wahr ist. Wenn wir jetzt die Summenzeichen durch unsere zu zeigenden Formeln ersetzen, müsste die Gleichung – sofern die Aussage vom Anfang wahr ist – immer noch wahr sein. Dann hätten wir gezeigt, dass die Aussage für  $n + 1$  dasselbe ist, wie die Aussage für  $n$  plus den fehlenden Teil ( $n + 1$ ).

$$\frac{(n+1)(n+2)}{2} = \frac{n(n+1)}{2} + n+1$$
$$\Leftrightarrow (n+1)(n+2) = n(n+1) + 2(n+1)$$
$$\Leftrightarrow n+2 = n+2$$

Wir sehen jetzt ganz klar, dass wir eine wahre Aussage haben. Jetzt haben wir gezeigt, dass unter der Voraussetzung, dass es ein  $n$  gibt, dass die Aussage erfüllt, auch  $n + 1$  die Aussage erfüllt. Da wir am Anfang bewiesen haben, dass  $n = 1$  die Gleichung erfüllt, ist sie somit auch für  $n = 2$  erfüllt und wenn wir wissen, dass sie für  $n = 2$  erfüllt ist, ist sie auch für  $n = 3$  erfüllt und so weiter!

## 12 Stochastik

Einem stochastischen Modell liegt zunächst die Grundmenge oder auch das Universum  $\Omega$  zu Grunde. Das ist eine Menge, die alle möglichen Ausgänge für das jeweilige Zufallsexperiment beinhaltet. Für einen Würfelwurf wäre die Grundmenge bspw.  $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ . Die Elemente in  $\Omega$  (groß Omega) werden mit  $\omega$  (klein Omega) bezeichnet und heißen Ergebnisse. Jede Teilmenge von  $\Omega$  wird als Ereignis bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit eines Ereignisses wird mit einem  $P$  für Probabilität angegeben:  $P(\{\omega\})$ . Wenn die Wahrscheinlichkeit aller Ergebnisse gleich ist und nur endliche viele mögliche Ergebnisse existieren, spricht man von einem Laplace-Experiment.

### 12.1 Kombinatorik

Von großer Bedeutung, wenn es um Kombinatorik geht, sind die Fakultät  $n!$  und der Binomialkoeffizient  $\binom{n}{k}$ . Diese sind wie folgt definiert:


#### Fakultät

$$n! := \prod_{k=1}^n k, \quad 0! = 1$$

#### Binomialkoeffizient

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{(n-k)! \cdot k!}, \quad \binom{n}{0} = 1$$

Die Kombinatorik hilft uns herauszufinden, wie viele Möglichkeiten es für Anordnungen gibt. Dabei unterscheidet man verschiedene Arten von Modellen. Im Großen und Ganzen gibt es drei Arten. Die Erste ist die Permutation. Dabei untersucht man die komplette Grundmenge. Wenn man nur eine Teilmenge untersucht, gibt es noch mal eine Unterscheidung. Wenn die Reihenfolge in der Teilmenge wichtig ist, spricht man von Variation, ansonsten von Kombination. Für diese drei Fälle gibt es jeweils zwei Möglichkeiten zur Berechnung der Anzahl der Möglichkeiten, je nachdem ob Elemente mehrfach auftreten oder nicht.



Die Kunst in der Kombinatorik ist es jetzt einer Aufgabenstellung die richtige Formel zuordnen zu können, daher folgen jetzt Beispiele für jeden Fall.

### 12.1.1 Permutation mit Wiederholung

Wenn es in der Grundmenge Elemente gibt, die nicht unterscheidbar sind, braucht man bei der Permutation diese Formel:  $\frac{n!}{m_1! \cdot m_2! \cdot \dots \cdot m_n!}$ . Im Zähler steht die Fakultät der Mächtigkeit der Grundmenge. Im Nenner werden die Mächtigkeiten aller Teilmengen mit einander multipliziert, die durch das Zusammenfassen ununterscheidbarer Elemente entstehen.

**Aufgabe 1:** Gegeben ist das Wort »EINSTEIN«. Wenn man diese Buchstaben beliebig vertauschen kann, wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es?

Lösung:

$$\frac{8!}{2! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = 5040$$

Erklärung: Das Wort hat 8 Buchstaben, wobei *E*, *I* und *N* jeweils zweimal und *S*, sowie *T* einmal vorkommen.

**Aufgabe 2:** Du musst einen Zug rangieren. Er hat 1 Lokomotive, 1 Bordrestaurant, 2 erste Klasse-Wagons und 5 zweite Klasse-Wagons. Wie viele Möglichkeiten gibt es diesen Zug anzuordnen?

Lösung:

$$\frac{8!}{1! \cdot 2! \cdot 5!} = 168$$

Erklärung: Der Zug hat 1 Bordrestaurant, 2 erste Klasse-Wagons und 5 zweite Klasse-Wagons. Insgesamt hat der Zug also 8 Wagons. Und was ist mit der Lok? Die Lokomotive muss logischerweise immer ganz vorne sein, deshalb macht sie keinen Unterschied für die Reihenfolge des Zuges insgesamt. Dein Arbeitgeber wäre sicherlich nicht begeistert, wenn du den Zug so rangierst, dass die Lok in der Mitte ist.

### 12.1.2 Permutation ohne Wiederholung

Wenn die Elemente bei der Permutation alle unterschiedlich sind, hat man eine angenehme Zeit, denn man muss nur die Fakultät von der Mächtigkeit der Grundmenge bestimmen.

**Aufgabe 1:** Gegeben ist das Wort »SCHLAFEN«. Wenn man diese Buchstaben beliebig vertauschen kann, wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es?

$$8! = 40320$$

Erklärung: Das Wort hat 8 Buchstaben, wobei keine doppelt vorkommen. Man könnte theoretisch auch die Formel für Permutation mit Wiederholung nutzen, dann würde aber im Nenner einfach 1 stehen, also reicht es einfach die Fakultät aus dem Zähler zu bestimmen.

**Aufgabe 2:** Wie viele Möglichkeiten gibt es die Karten in einem Pokerkartendeck anzuordnen?

Lösung:

$$52! = 8,065817517 \cdot 10^{67}$$

Erklärung: Im Poker gibt es insgesamt 52 Karten: Von 2 bis 10, sowie von Bube, Dame, König und Ass in vier Farben ohne Joker.

### 12.1.3 Variation mit Wiederholung

Wenn man eine Teilmenge mit teilweise nicht unterscheidbaren Elementen aus der Grundmenge entnimmt, braucht man unter Beachtung der Reihenfolge die Formel  $n^k$ , wobei  $n$  die Mächtigkeit der Grundmenge und  $k$  die der Teilmenge ist.

**Aufgabe 1:** Jeden Morgen wird im Büro eine Name aus einem Hut mit 12 Namen gezogen, um zu bestimmen, wer an diesem Morgen den Kaffee holen muss. Anschließend wird der gezogene Name wieder für den nächsten Tag in den Hut gelegt. Wie viele Möglichkeiten gibt es von Montag bis Freitag für die Ernennung des Kaffeeholers unter Beachtung der Reihenfolge?

Lösung:

$$12^5 = 248832$$

Erklärung: Die Grundmenge hat eine Mächtigkeit von 12. Es wird von Montag bis Freitag fünfmal eine Person gezogen, die auch mehrfach gezogen werden kann, da der Name wieder zurückgelegt wird.

**Aufgabe 2:** In der Schifffahrt werden bunte Flaggen benutzt, um auf optischem Wege zu kommunizieren. Wenn man 4 Flaggen aufhängen möchte und man für die Buchstaben von A bis Z und die Ziffern 0 bis 9 verschiedene Flaggen hat, in wie vielen verschiedenen Reihenfolgen kann man diese aufhängen, wenn Flaggen mehrfach vorkommen dürfen?

Lösung:

$$36^4 = 1679616$$

Erklärung: Insgesamt hat man 36 Flaggen (26 fürs Alphabet und 10 für die Zahlen) und aus diesen sollen 4 (auch gleiche) ausgesucht werden.

### 12.1.4 Variation ohne Wiederholung

Wenn man einzigartige Elemente in der Grundmenge hat bzw. nicht zurücklegt, nutzt man für die Betrachtung einer Teilmenge die Formel  $\frac{n!}{(n-k)!}$ .

**Aufgabe 1:** Da bei einem Marathon 7 Personen gleichzeitig die Ziellinie erreicht haben, sollen die ersten drei Plätze per Los ermittelt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es dafür?

Lösung:

$$\frac{7!}{(7-3)!} = 210$$

Erklärung: Unsere Grundmenge sind die 7 Personen, die gleichzeitig das Ziel erreicht haben. Aus diesen sollen jetzt drei Leute gezogen werden, wobei die Reihenfolge wichtig ist, um zu wissen, ob sie erster, zweiter oder dritter Platz sind.

**Aufgabe 2:** Du entschärfst eine Bombe, dabei hast du 6 verschiedenfarbige Kabel, von denen du 3 in der richtigen Reihenfolge durchschneiden musst. Wie hoch ist die Chance, dass du

das richtig machst?

Lösung:

$$\frac{6!}{(6-3)!} = 120 \text{ Möglichkeiten} \Rightarrow P = \frac{1}{120} \hat{=} 0,8\bar{3}\%$$

Erklärung: Von 6 Kabeln sollen 3 in der richtigen Reihenfolge durchgeschnitten werden. Natürlich kannst du ein Kabel, dass du bereits durchgeschnitten hast nicht noch einmal durchschneiden. Damit kommst du auf 120 Möglichkeiten drei Kabel durchzutrennen, wovon jedoch nur eine richtig ist. Damit ist die Chance das richtig zu machen bei unter einem Prozent. Viel Glück!

### 12.1.5 Kombination mit Wiederholung

Wenn eine Teilmenge betrachtet wird, deren Reihenfolge egal ist und in der Elemente mehrfach vorkommen können, benutzt man die Formel  $\binom{n+k-1}{k}$ . Hinweis: Dafür brauchst du den Binomialkoeffizienten.

**Aufgabe 1:** Eine Firma eröffnet 3 neue Zweigstellen und schaut sich dafür die Standorte Tokyo, Seoul, Hong Kong, Peking und Taipei an. Wie viele Möglichkeiten gibt es die neuen Zweigstellen zu verteilen, wenn auch mehrere in einer Stadt sein können?

Lösung:

$$\binom{5+3-1}{3} = \binom{7}{3} = \frac{7!}{(7-3)! \cdot 3!} = 35$$

Erklärung: Bei dieser Aufgabe darf man sich nicht verwirren lassen, denn die Grundmenge sind die 5 Städte. Im Grunde genommen Ziehen wir aus den 5 Städten dreimal eine und legen sie wieder zurück, sodass sie noch mal gezogen werden kann.

**Aufgabe 2:** Auf einer Wiese wachsen Tulpen, Rosen und Margeriten. Wenn ich zufällig 5 Blumen pflücke, wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es?

Lösung:

$$\binom{3+5-1}{5} = \binom{7}{5} = \frac{7!}{(7-5)! \cdot 5!} = 21$$

Erklärung: Hier ist die Anzahl der Ziehungen mit 5 größer als die Anzahl der Blumen mit 3, was allerdings in Ordnung ist, da es von jeder Blumenart beliebig viele gibt, was sich genauso verhält, als würden wir die Blumen nach dem Pflücken wieder zurück legen.

### 12.1.6 Kombination ohne Wiederholung

Wenn man eine Teilmenge der Grundmenge ohne Beachtung der Reihenfolge betrachtet, die keine gleichen Elemente hat bzw. nichts zurückgelegt wird, benutzt man den einfachen Binomialkoeffizienten  $\binom{n}{k}$  zur Berechnung der Möglichkeiten.

**Aufgabe 1:** Im klassischen deutschen Lotto werden 6 Zahlen aus 49 und eine Superzahl von 0 bis 9 gezogen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mit einmal spielen, bei diesem Lotto alles richtig zu raten?

Lösung:

$$\binom{49}{6} = \frac{49!}{(49-6)! \cdot 6!} = 13983816 \text{ Möglichkeiten} \Rightarrow P = \frac{1}{13983816} \cdot \frac{1}{10} = 1 : 139.838.160$$

Erklärung: Es gibt ca. 14 Millionen Möglichkeiten die Zahlen 6 aus 49 zu wählen. Da immer nur eine Möglichkeit richtig ist, beträgt die Wahrscheinlichkeit 1 zu 14 Million. Wenn man noch die 1 in 10 Chance, die Superzahl richtig zu haben dazu multipliziert, erhält man eine Gewinnchance von 1 zu 140 Millionen. Achtung: Glücksspiel kann süchtig machen!

**Aufgabe 2:** Eine Firma sucht zwei neue Software-Entwickler. Unter 52 Bewerbern sollen 2 ausgewählt werden. Wie viele Möglichkeiten gibt es für die Besetzung dieser beiden Posten?

Lösung:

$$\binom{52}{2} = \frac{52!}{(52-2)! \cdot 2!} = 1326$$


Erklärung: Es sollen 2 aus 52 Personen ausgesucht werden, wobei die Reihenfolge keine Rolle spielt, da beide dieselbe Art von Stelle antreten sollen. Es ist also egal, wer Software-Entwickler Nummer 1 und wer Software-Entwickler Nummer 2 wird.

## 12.2 Diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilungen

Mithilfe der Binomialverteilung und der hypergeometrischen Verteilung kann man die Wahrscheinlichkeit ermitteln, bei mehrfacher Durchführung eines Experimentes das gleiche Ergebnis eine bestimmte Anzahl von Malen zu erhalten. Dabei nutzt man die Binomialverteilung für Experimente mit Zurücklegen und die hypergeometrische Verteilung für Experimente ohne.


### 12.2.1 Binomialverteilung

Mithilfe der Binomialverteilung ermittelt man die Wahrscheinlichkeit, ein Ergebnis mit der Wahrscheinlichkeit  $p$  bei  $n$  Durchführungen eines Zufallsexperimentes mit Zurücklegen genau  $k$ -mal zu erhalten. Alle Wahrscheinlichkeiten addiert, ergeben am Ende wieder 1.




### 12.2.2 Hypergeometrische Verteilung

Man hat eine Menge mit  $A$  Elementen, von denen  $B$  Elemente eine bestimmte Eigenschaft haben, die die anderen nicht haben. Man entnimmt eine Anzahl  $n$  von Elementen aus der Menge ohne sie zurückzulegen. Um jetzt zu ermitteln, wie wahrscheinlich es ist, genau  $k$ -mal Elemente der Gruppe  $B$  zu erhalten, nutzt man die hypergeometrische Verteilung. Alle Wahrscheinlichkeiten addiert, ergeben am Ende wieder 1.




### 12.3 Bedingte Wahrscheinlichkeit

Wir stellen uns vor, wir haben eine Grundmenge von Menschen. 20% der Leute in dieser Gruppe haben ein Auslandsjahr in einem französischsprachigen Land absolviert. Diese Teilmenge nennen wir . Außerdem ordnen wir alle Menschen, die Französisch sprechen in der Gruppe , sodass wir zwei Teilmengen von haben. Wir wissen weiterhin, dass ein Mensch aus der Teilgruppe mit einer Wahrscheinlichkeit von 70% Französisch spricht. Die Menschen, die kein Auslandsjahr gemacht haben und damit nicht in der Gruppe sind, sprechen mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% Französisch.




Um jetzt nachzuvollziehen, wie viele Menschen der Grundmenge insgesamt Französisch sprechen, müssen wir die beiden Pfade  $P(\text{FR} \cap \bar{\text{B}})$  und  $P(\text{FR} \cap \text{B})$  addieren und erhalten damit die Wahrscheinlichkeit  $P(\text{FR}) = 0,34$ . Um jetzt nicht jedes Mal ein Baumdiagramm zeichnen zu müssen uns solche Aufgaben schnell lösen zu können, können wir ein paar allgemeine Formeln aufstellen. Dazu verallgemeinern wir auch das Diagramm noch mal. Übrigens:  $P(B | A)$  spricht man als »P von B unter der Bedingung A« und das kann auch mal als  $P_A(B)$  geschrieben werden.



#### Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B) \\ &= P(A) \cdot P(B | A) + P(\bar{A}) \cdot P(B | \bar{A}) \end{aligned}$$

Wenn wir jetzt das Baumdiagramm noch mal anders herum aufzeichnen, können wir noch eine tolle Formel herleiten.



Die Äste  $P(A \cap B)$  und  $P(B \cap A)$  sind ja genau das Gleiche, weshalb wir sie gleichsetzen können.



### Satz von Bayes

$$\begin{aligned}P(A \cap B) &= P(B \cap A) \\ \Leftrightarrow P(A) \cdot P(B | A) &= P(B) \cdot P(A | B) \\ \Leftrightarrow \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(B)} &= P(A | B)\end{aligned}$$

Zu den beiden obigen Sätzen jetzt ein Beispiel: Von allen Patienten haben 0,1% eine Krankheit, die sich »Blubber« ( $B$ ) nennt. Des Weiteren existiert ein Test, um zu überprüfen, ob jemand den Blubber hat. Dieser findet den Blubber in einer erkrankten Person mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% (+). Gleichzeitig gibt der Test aber auch bei 1% der nicht Erkrankten ein falsch positives Ergebnis aus. Stell dir vor du wurdest positiv getestet. Wie wahrscheinlich ist es dann, dass du den Blubber hast? Man könnte zunächst denken 99%. Das stimmt aber nicht, denn das ist die Wahrscheinlichkeit  $P(+ | B)$ , wir suchen aber die Wahrscheinlichkeit  $P(B | +)$ . Wir stellen also mit dem Satz von Bayes eine Gleichung auf.

$$\begin{aligned}P(B) \cdot P(+ | B) &= P(+ ) \cdot P(B | +) \\ \Leftrightarrow P(B | +) &= \frac{P(B) \cdot P(+ | B)}{P(+)} \\ \Rightarrow P(B | +) &= \frac{0,001 \cdot 0,99}{P(+)}\end{aligned}$$

Dummerweise fehlt uns die Wahrscheinlichkeit, positiv getestet zu werden, unabhängig davon, ob man krank ist oder nicht. Mit dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit finden wir jedoch auch diese Wahrscheinlichkeit heraus und können weiter rechnen.


$$\begin{aligned}P(+ ) &= P(B) \cdot P(+ | B) + P(\bar{B}) \cdot P(+ | \bar{B}) \\ \Rightarrow P(B | +) &= \frac{0,001 \cdot 0,99}{P(B) \cdot P(+ | B) + P(\bar{B}) \cdot P(+ | \bar{B})} \\ \Rightarrow P(B | +) &= \frac{0,001 \cdot 0,99}{0,001 \cdot 0,99 + 0,999 \cdot 0,01} = \frac{11}{122} \approx \underline{\underline{9\%}}\end{aligned}$$

Damit wissen wir jetzt, dass aufgrund des falsch positiven Ergebnisse deine Chance, tatsächlich den Blubber zu haben gerade mal 9% ist. Um dir sicher zu sein, lässt du jetzt einen zweiten Test machen. Dieser kommt auch positiv zurück. Wenn du jetzt die 9% Wahrscheinlichkeit nimmst, krank zu sein und sie noch einmal in die obige Formel einsetzt, kannst du jetzt auch die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass du nach dem zweiten Test den Blubber hast.


$$\begin{aligned}P(+ ) &= P(B) \cdot P(+ | B) + P(\bar{B}) \cdot P(+ | \bar{B}) \\ \Rightarrow P(B | +) &= \frac{0,09 \cdot 0,99}{0,09 \cdot 0,99 + 0,91 \cdot 0,01} = \frac{891}{982} \approx \underline{\underline{91\%}}\end{aligned}$$

Hier nochmal die dazugehörigen Baumdiagramme, um dass besser nachvollziehen zu können:

### Erster Test



### Zweiter Test



## 12.4 Diskrete Zufallsvariablen


Bei Zufallsexperimenten haben wir i.d.R. eine Grundmenge  $\Omega$  mit den möglichen Ergebnissen. Für einen Münzwurf z.B.:  $\Omega = \{\text{Kopf}, \text{Zahl}\}$ . Wenn wir diesen Ergebnissen jetzt Werte zuordnen sprechen wir von einer Zufallsvariable, da diese einen Wert annimmt, der auf dem zufälligen Ausgang des Experimentes basiert. Man könnte beispielsweise sagen, bei Kopf bekommt man fünf Euro und bei Zahl verliert man fünf Euro.

$$X(\omega) = \begin{cases} 5, & \text{wenn } \omega = \text{Kopf} \\ -5, & \text{wenn } \omega = \text{Zahl} \end{cases}$$

Eine Zufallsvariable ist eine **Abbildung** (S. 6), die jedem Wert aus der Grundmenge genau einen Wert aus den reellen Zahlen zuordnet. Dabei unterscheidet man zwischen diskreten und stetigen Zufallsvariablen. Diskret ist ein Zufallsvariable, wenn sie eine abzählbare Menge an Werten annehmen kann, z.B.  $X := \text{»Gewürfelte Augenzahl«}$ . Stetig ist sie, wenn sie eine nicht abzählbare Menge von Werten haben kann, z.B.  $X := \text{»Körpergewicht einer beliebigen Person«}$ . Dabei können reelle Zahlen mit theoretisch uneingeschränkt vielen Nachkommastellen entstehen.

#### 12.4.1 Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung

Stellen wir uns vor, wir haben das unten gezeichnete Glücksrad mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten und Gewinnen und gehen davon aus, dass man 5 Euro Einsatz bezahlen muss, um zu drehen. Wir wollen jetzt wissen, ob dieses Spiel fair ist oder nicht. Dazu berechnet man den Erwartungswert. Er beschreibt die Zahl, die die Zufallsvariable im Mittel annimmt. Man kann ihn sich auch als Mittelwert einer Zufallsvariable vorstellen. Das bedeutet, dass wenn der Erwartungswert genau Null ist, ein für beide Seiten faires Spiel vorliegt. Ansonsten macht die eine Seite Gewinn und die andere Verlust.



Den Erwartungswert berechnet man, indem man jeden Wert der Zufallsvariable mit ihrer Wahrscheinlichkeit multipliziert und anschließend alles zusammenrechnet.

##### Erwartungswert

$$E(x) = \sum_{i=1}^n x_i \cdot P(X = x_i) \text{ auch mit } \mu \text{ bezeichnet}$$

##### Erwartungswert einer Binomialverteilung

$$E(x) = np$$

Dieser Sachverhalt lässt sich auch sehr gut in einer Wertetabelle darstellen.

$x_i$		-4	-3	+10
$P(X = x_i)$		$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{10}$

$$E(X) = \sum_{i=1}^3 x_i \cdot P(X = x_i) = -4 \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{2}{5} + 10 \cdot \frac{1}{10} = \underline{\underline{-2,2}}$$

Damit ist das Spiel nicht fair und man muss davon ausgehen, als Spieler Geld zu verlieren. Wenn man das Spiel fair machen will, muss man die obige Formel mit Null gleichsetzen und dann einen beliebigen Wert durch eine Variable ersetzen. Durch Umstellen findet man dann eine Lösung, um das Spiel fair zu machen.

$$\begin{aligned} -4 \cdot \frac{1}{2} - 3 \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{10}x &= 0 \\ \Leftrightarrow \frac{1}{10}x &= 3,2 \\ \Leftrightarrow x &= 32 \end{aligned}$$

Das Spiel wäre z.B. fair, wenn der Gewinn auf dem gelben Feld 37 Euro betragen würde. Hinweis: Als Wert haben wir zwar 32 bekommen, aber man darf nicht vergessen die 5 Euro Einsatz wieder drauf zu rechnen.

Wenn man den Erwartungswert errechnet hat, kann man auch die Varianz und die Standardabweichung errechnen. Varianz und Standardabweichung geben an, wie Groß die durchschnittliche Entfernung bzw. die Streuung vom Mittelwert ist. Zur Erinnerung: Der Mittelwert errechnet sich, indem man alle Werte addiert und durch die Anzahl aller Werte teilt und wird als  $\bar{x}$  geschrieben. Für diskrete Zufallsvariablen unterscheidet sich die Rechnung ein wenig: Man rechnet hier mit dem Erwartungswert und der Wahrscheinlichkeit, da man keine Daten aus einer eigentlichen Ausführung des Experimentes hat.

### **Varianz einer Zufallsvariable**

$$V(X) = \sum_{i=1}^n (x_i - E(X))^2 \cdot P(X = x_i) \text{ auch mit } \sigma^2 \text{ bezeichnet}$$

### **Varianz einer Binomialverteilung**

$$V(X) = np(1 - p)$$


### **Standardabweichung einer Zufallsvariable**

$$S(X) = \sqrt{V(X)} \text{ auch mit } \sigma \text{ bezeichnet}$$

Wenn wir diese Werte jetzt für unser Beispiel oben ausrechnen, erhalten wir Folgendes:

$$\begin{aligned} V(X) &= \sum_{i=1}^3 (x_i - E(X))^2 \cdot P(X = x_i) \\ &= (-4 - (-2,2))^2 \cdot \frac{1}{2} + (-3 - (-2,2))^2 \cdot \frac{2}{5} + (10 - (-2,2))^2 \cdot \frac{1}{10} \\ &= \underline{\underline{16,76}} \\ S(X) &= \underline{\underline{\sqrt{16,76}}} \end{aligned}$$

Das bedeutet, dass Ergebnisse der Zufallsvariable im Schnitt ungefähr 4 vom Erwartungswert entfernt wären, wenn man das Experiment ausführen würde. Was ist der Unterschied zwischen Varianz und Standardabweichung? Meistens errechnet man die Varianz nur, um die Standardabweichung zu kriegen. Da die Varianz immer eine quadratische Einheit beschreibt, ist es oft nicht möglich, sie mit dem Erwartungswert zu vergleichen. Wichtig zu verstehen ist nur, dass je kleiner Varianz und Standardabweichung sind, desto besser beschreibt der Erwartungswert das Experiment. Hier einmal Varianz und Standardabweichung für einen sechsseitigen Würfel:



## 13 Modul: Lineare Algebra

Kommt irgendwann

## 14 Modul: Analysis I

Kommt irgendwann

# **15 Modul: Angewandte Mathematik für die Informatik**

Kommt irgendwann



## 16 Übungsaufgaben

### 16.1 Beweise

Beweise sind besonders knifflig, denn zu verstehen, was Beweise sind und wie sie funktionieren ist sehr einfach. Einen eigenen Beweis zu führen ist jedoch extrem schwierig und erfordert viel Übung. Deshalb lohnt es sich so viele Beweise wie möglich auszuprobieren und auch, wenn man scheitert, die Lösung nachzuvollziehen.

#### 16.1.1 Aufgabe A

Z.z.: Wenn  $n \in \mathbb{N}$  eine ungerade Zahl ist, dann ist auch  $n^2$  eine ungerade Zahl.

Wenn  $n$  eine ungerade Zahl sein soll, hat sie die Form  $n = 2k \pm 1$ . Diese Zahl quadrieren und untersuchen wir jetzt.

$$\begin{aligned} n^2 &= (2k - 1)^2 \\ &= 4k^2 - 4k + 1 \\ &= 2(2k^2 - 2k) + 1 \quad | \quad x = 2k^2 - 2k \\ &= 2x + 1 \end{aligned}$$

Man sieht dank den Umformungsschritten, dass auch  $n^2$  eine ungerade Zahl ist.

*q.e.d.*

#### 16.1.2 Aufgabe B

Z.z.:  $\forall a, b, c \in \mathbb{R}$  mit  $a, b, c > 0 : ab = c \Rightarrow a \leq \sqrt{c} \vee b \leq \sqrt{c}$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow a > \sqrt{c} \wedge b > \sqrt{c} \\ &\Rightarrow ab > \sqrt{c} \cdot \sqrt{c} \\ &\Leftrightarrow ab > c \quad \text{Widerspruch zu } ab = c \\ &\quad \text{q.e.d.} \end{aligned}$$

#### 16.1.3 Aufgabe C

Z.z.:  $\nexists a, b \in \mathbb{Z} : 6a + 3b = 1$

Die beiden Zahlen 6 und 3 auf der linken Seite sind beide durch 3 teilbar, was auch bedeutet ihre Summe, also der komplette Linke Teil, ist durch 3 teilbar. Die 1 ist allerdings nicht durch 3 teilbar, was einen Widerspruch darstellt. Somit gilt die Gleichung nicht und die Aussage, dass keine ganzen Zahlen  $a$  und  $b$  für diese existieren, ist korrekt.

*q.e.d.*

# Stichwortverzeichnis

- Abbildung, 6
- Abgeschlossenes Intervall, 16, 23
- Ableitung, 48, 50, 67, 69, 73, 76, 78, 85
- Ableitungsregel, 67, 69
- Abstand, 35
- Abszisse, 48, 65
- Achsenschnittpunkt, 75
- Achsensymmetrisch, 50
- Additionsverfahren, 29
- Annähern, 50, 61
- Anstieg, 67, 73
- Argument, 11, 13, 48, 65
- Ausklammern, 58, 60
- Aussage, 52, 87
- Ausschließen, 57
- Basis, 63
- Behebbar, 72
- Bestimmtes Integral, 80
- Betrag, 53, 55
- Betragsfunktion, 53
- Betragsgleichung, 53, 54
- Betragsstrich, 54
- Betragsungleichung, 23
- Bijektiv, 7, 8, 49
- Binomialkoeffizient, 90, 93
- Binomialverteilung, 94
- Binomische Formel, 16, 18, 59
- Bogenlänge, 33
- Bogenmaß, 64
- Bruch, 51, 61
- Definitionsbereich, 6, 49, 50, 52, 72
- Definitionslücke, 62, 72
- Dekadischer Logarithmus, 19
- Differential, 83
- Differentialquotient, 67
- Differenz, 5
- Differenzenquotient, 68
- Differenzfunktion, 84, 85
- Differenzierbar, 71
- Differenzieren, 81
- Direkter Beweis, 88
- Disjunktion, 87
- Diskret, 99
- Diskriminante, 16
- Dividend, 15
- Divisor, 15, 60, 68
- Dreieck, 33
- Dritte Ableitung, 69
- Durchschnitt, 5
- Ebenengleichung, 42
- Einsetzen, 52, 56, 73, 75, 77, 78
- Ereignis, 90
- Ergebnis, 52, 53, 60, 61, 73, 75, 90
- Erwartungswert, 99
- Erweiterbar, 72
- Euklidischer Algorithmus, 16
- Exponent, 57, 60, 63, 67
- Exponentialgleichung, 63
- Extremalpunkt, 73
- Extrempunkt, 76
- Extremstelle, 65
- Faktor, 20
- Faktorisieren, 20, 58
- Fakultät, 90, 91
- Fall, 25, 30, 53, 55
- Fallen, 48
- Fallunterscheidung, 23, 29, 54
- Fläche, 33, 79, 80
- Formel, 51
- Freier Vektor, 36
- Funktion, 48–50, 54, 58, 62, 67, 69, 73
- Ganze Zahl, 6, 51
- Ganzrationale Funktion, 56
- Gauß-Verfahren, 29
- Gaußsche Zahlenebene, 9
- Gebrochenrationale Funktion, 61
- Gebundener Vektor, 36
- Gegenvektor, 36
- Gekürzt, 19
- Geometrie, 64
- Gerade, 50, 51, 57, 74
- Gerader Kegel, 35
- Gerader Zylinder, 34
- Gleichsetzen, 54
- Gleichung, 20, 21, 29, 30, 74
- Gleichungssystem, 27, 43
- Global, 49
- Gradmaß, 64
- Graph, 51, 53, 55, 74
- Grenzwert, 70, 72, 73, 75
- Grundfläche, 34, 35

Grundflächenumfang, 34  
 Grundmenge, 90–93, 95  
 Grundseite, 33  
 Größter gemeinsamer Teiler, 16  
  
 Halboffenes Intervall, 16  
 Hebbar, 72  
 Hinreichende Bedingung, 69, 77, 78  
 Hypergeometrische Verteilung, 94, 95  
 Hypotenuse, 32, 36  
 Hypotenusenabschnitt, 32  
 Höhe, 33–35  
  
 Identität, 7  
 Imaginäre Einheit, 9  
 Imaginäre Zahl, 9  
 Imaginärteil, 9  
 Implikation, 87  
 Indirekter Beweis, 88  
 Injektiv, 7, 8  
 Injektivität, 48  
 Innere Funktion, 65  
 Integrieren, 81  
 Intervall, 22, 49, 85  
 Irrationale Zahl, 6  
  
 Kartesische Form, 9, 11  
 Kathete, 32  
 Kegel, 35  
 Kehrwert, 15  
 Koeffizient, 30, 56  
 Kombination, 90  
 Kombinatorik, 90  
 Komplement, 5  
 Komplexe Konjugation, 9  
 Komplexe Zahlen, 9  
 Konjunktion, 87  
 Kontravalenz, 87  
 Koordinate, 78  
 Koordinatenform, 39, 40, 44, 66  
 Koordinatensystem, 65  
 Koordinatenursprung, 36  
 Kosinus, 64  
 Kreis, 33, 65  
 Kreislinie, 35  
 Kreissegment, 33  
 Kreissektor, 33  
 Kreuzprodukt, 38  
 Krümmungsverhalten, 77  
 Kurvendiskussion, 74  
 Kürzen, 16  
  
 Laplace-Experiment, 90  
 Limes, 61, 68, 70, 75  
 Lineare Abhängigkeit, 46  
 Lineare Funktion, 73, 78  
 Lineare Gleichung, 80  
 Lineares Gleichungssystem, 29  
 Linearkombination, 45  
 Links-Rechts-Krümmung, 78  
 Linksoffen, 16  
 Linksseitiger Grenzwert, 70, 72  
 Logarithmus, 19, 63  
 Logarithmusfunktion, 63  
 Logarithmusgesetz, 64  
 Lokal, 49  
 Lotto, 93  
 Lösungsmenge, 15, 21–23, 29, 30, 52, 55, 56  
  
 Mantelfläche, 34  
 Maximalstelle, 49  
 Menge der natürlichen Zahlen, 6  
 Mengen, 6  
 Minimalstelle, 49  
 Mittelwert, 100  
 Monom, 56, 57  
 Monoton, 48  
 Monotonieverhalten, 48, 67  
 Mächtigkeit, 5, 91  
  
 n-ter Grad, 57  
 Nachkommastelle, 51  
 Natürliche Zahl, 6  
 Natürlicher Logarithmus, 19  
 Negation, 87  
 Negativ, 24, 55  
 Nenner, 24, 61, 62  
 Newtonverfahren, 50  
 Normalenform, 40, 41  
 Normalenvektor, 41  
 Normalform, 15, 20  
 Notation, 19, 28, 70  
 Notwendige Bedingung, 69, 76, 77  
 Nullpunkt, 50  
 Nullstelle, 20–23, 50, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 74, 75, 85  
 Nullvektor, 36, 37, 46  
  
 Oberfläche, 34, 35  
 Offenes Intervall, 16, 23  
 Ordinate, 48, 65  
 Orthogonal, 37, 40, 41  
 Ortsvektor, 36

p-q-Formel, 16, 21, 22, 53, 57  
 Parameter, 29  
 Parameterform, 39, 40  
 Permutation, 90  
 Pfeilklassse, 36  
 Polarform, 11  
 Polynom, 56, 57, 59–61  
 Polynomdivision, 50, 59  
 Polynomfunktion, 56  
 Positiv, 24, 52  
 Potenz, 51, 56, 57, 60  
 Potenzfunktion, 51, 67  
 Potenzgesetz, 13, 17, 64  
 Potenzieren, 52  
 Potenzmenge, 5  
 Potenzrechnung, 19  
 Prisma, 34  
 Probe, 52  
 Produkt, 20  
 Produktregel, 82  
 Punkt, 68, 73, 77  
 Punktsymmetrisch, 50  
 Pyramide, 34  
  
 Quadrat, 32  
 Quadratisch, 15  
 Quadratische Ergänzung, 20  
 Quadratische Funktion, 22  
 Quadratische Gleichung, 20  
 Quadratische Ungleichung, 22  
 Quantor, 87  
 Quotient, 68  
  
 Radikand, 52  
 Radius, 33–35  
 Rationale Funktion, 61  
 Rationale Zahl, 6, 17  
 Realteil, 9  
 Rechengesetz, 67  
 Rechenregel, 24  
 Rechteck, 32, 81  
 Rechts-Links-Krümmung, 78  
 Rechtsöffnen, 16  
 rechtsseitige Grenzwert, 70  
 Rechtsseitiger Grenzwert, 70, 72  
 Rechtwinkliges Dreieck, 32  
 Reelle Zahl, 6, 22, 52  
 Repräsentant, 6  
 Repräsentantenunabhängig, 6  
 Resubstitution, 21  
 Richtung, 36  
 Richtungsvektor, 39, 40, 44  
  
 Satz der totalen Wahrscheinlichkeit, 96  
 Satz des Pythagoras, 38  
 Satz von Bayes, 97  
 Satz von de Moivre, 12  
 Satz von Viëta, 21  
 Scheinlösung, 52  
 Schnittgerade, 44  
 Schnittpunkt, 53, 54, 56  
 Sekante, 68  
 Signum, 11  
 Sinus, 64  
 Skalar, 37, 39, 40, 46  
 skalare Multiplikation, 37  
 Skalarmultiplikation, 45  
 Skalarprodukt, 37  
 Spaltenvektor, 36  
 Spannvektor, 40  
 Spurpunkt, 40  
 Stammfunktion, 81  
 Standardabweichung, 100, 101  
 Steigung, 68  
 Stetig, 71, 99  
 Stetige Erweiterung, 72  
 Streng, 48  
 Streuung, 100  
 Strickt, 49  
 Stufenform, 29  
 Stützvektor, 39, 40  
 Substitution, 21, 57  
 Summand, 56  
 Surjektiv, 7, 8, 49  
 Symmetrie, 50, 57  
 Symmetrische Differenz, 5  
  
 Tangens, 64  
 Tangente, 67, 68, 73  
 Tangentengleichung, 73, 78  
 Taschenrechner, 64  
 Tautologie, 87  
 Teilmenge, 5, 92  
 Term, 19–21, 75  
 Transformieren, 65  
 Trigonometrische Funktion, 33, 64  
  
 Umfang, 33  
 Umformen, 63, 67  
 Umkehrfunktion, 86  
 Umstellen, 22, 27, 73, 75, 78, 100  
 Unbestimmtes Integral, 80

Unendlich, 22, 60, 61, 70  
Ungerade, 50, 51, 57, 74, 77  
Ungleichung, 22, 24  
Universum, 5, 90

Variable, 64  
Varianz, 100, 101  
Variation, 90  
Vektoraddition, 45  
Vereinfachen, 19, 21, 33  
Vereinigung, 5  
Vergleichszeichen, 22  
Verkettung, 65  
Vollständige Induktion, 89  
Volumen, 34, 35  
Vorzeichen, 24, 50

Wachsen, 48  
Wahrheitstafel, 87  
Wahrheitswert, 87  
Wendepunkt, 73, 77, 78  
Wendestelle, 78  
Wertetabelle, 50, 85, 99  
Widerspruch, 87  
Windschief, 43, 44  
Winkel, 33  
Winkelfunktion, 64  
Wohldefiniert, 6  
Wurzel, 52  
Wurzelexponent, 52  
Wurzelfunktion, 51  
Wurzelgesetz, 18  
Wurzelgleichung, 52, 53

Zielbereich, 6  
Zufallsexperiment, 90  
Zufallsvariable, 98  
Zusammengesetzte Funktion, 73  
Zweite Ableitung, 69  
Zylinder, 34  
Zähler, 62

Äquivalenz, 87  
Äquivalenzumformung, 10, 20, 52  
Äußere Funktion, 65  
Überprüfen, 52, 55