

Лабораторная работа №3: "Организация циклов". Задание 1

Цель работы

Дать студентам практический навык в использовании базовых конструкций структурного программирования - операторов цикла. Работа составлена из трёх заданий.

Постановка задачи

Вычислить и вывести на экран или в файл в виде таблицы значения функции, заданной графически (см. лабораторная работа № 2, задание 1), на интервале от $X_{нач}$ до $X_{кон}$ с шагом dx . Интервал и шаг задать таким образом, чтобы проверить все ветви программы. Таблицу снабдить заголовком и шапкой.

Теоретическое введение

Для решения задачи использована программа, подготовленная в лабораторной работе №2, задание 1 и оператор цикла с предусловием:

```
<Начальное значение>
while <Условие>:
    <Инструкции>
    <Приращение>
[else:
    <Блок, выполняемый, если не использовался break>
]
```

Для обмена с консолью (вывод сообщений и ввод начальных данных) использованы стандартные процедуры `print()` и `input()`. Результаты работы программы записываются в текстовый файл.

Описание алгоритма

1. Ввести значения переменных X_{beg} , X_{end} , Dx .
2. Присвоить текущему значению X_t начальное значение: $X_t = X_{нач}$.
3. Вычислить значение функции и вывести в виде строки таблицы.
4. Вычислить новое значение аргумента $X_t = X_t + Dx$.
5. Если значение аргумента меньше X_{end} , то перейти к пункту 3.
6. Завершить рисование таблицы и работу программы.

Описание входных и выходных данных

В предшествующей работе был принят вещественный тип данных (*real*). В этой работе тип данных сохранён. Для упрощения последующего контроля работы программы в выходной текстовый файл записываются и начальные данные.

Листинг программы

```
# -*- coding: cp1251 -*-
from math import *
print('Введите Xbeg, Xend и Dx')
xb = float(input('Xbeg='))
xe = float(input('Xend='))
dx = float(input('Dx='))
print("Xbeg={0: 7.2f} Xend={1: 7.2f}".format(xb, xe))
print("    Dx={0: 7.2f}".format(dx))
xt = xb
print("+-----+-----+")
print("I      X      I      Y      I")
```

```

print("+-----+-----+")
while xt <= xe:
    if xt < -5:
        y = 1
    elif xt >=-5 and xt<0:
        y = -(3/5)*xt-2
    elif xt >= 0 and xt<2:
        y = -sqrt(4-xt**2)
    elif xt >= 2 and xt<4:
        y = xt-2
    elif xt >= 4 and xt<8:
        y = 2+sqrt(4-(xt-6)**2)
    else: y = 2
    print("I{0: 7.2f} I{1: 7.2f} I".format(xt, y))
    xt += dx
print("+-----+-----+")

```

Результат работы программы

Xbeg= -10.00 Xend= 10.00
Dx= 1.00

```

+-----+-----+
I      X      I      Y      I
+-----+-----+
I -10.00 I      1.00 I
I  -9.00 I      1.00 I
I  -8.00 I      1.00 I
I  -7.00 I      1.00 I
I  -6.00 I      1.00 I
I  -5.00 I      1.00 I
I  -4.00 I      0.40 I
I  -3.00 I     -0.20 I
I  -2.00 I     -0.80 I
I  -1.00 I     -1.40 I
I   0.00 I     -2.00 I
I   1.00 I     -1.73 I
I   2.00 I      0.00 I
I   3.00 I      1.00 I
I   4.00 I      2.00 I
I   5.00 I      3.73 I
I   6.00 I      4.00 I
I   7.00 I      3.73 I
I   8.00 I      2.00 I
I   9.00 I      2.00 I
I  10.00 I      2.00 I
+-----+-----+

```

Задание к лабораторной работе №3 "Организация циклов". Задание 1

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной графически (см. задание 1 лабораторной работы № 2, стр. 21), на интервале от $X_{нач}$ до $X_{кон}$ с шагом dx . Интервал и шаг задать таким образом, чтобы проверить все ветви программы. Таблицу снабдить заголовком и шапкой.

Лабораторная работа №3: "Организация циклов". Задание 2

Постановка задачи

Для десяти выстрелов, координаты которых задаются генератором случайных чисел, вывести текстовые сообщения о попадании в мишень (см. лабораторная работа № 2, задание 2).

Теоретическое введение

Для решения задачи использована программа, подготовленная в лабораторной работе №2, задание 2 (см. стр. 29) и оператор цикла с параметром:

```
for <Текущий элемент> in <Последовательность>:  
    <Инструкции внутри цикла>  
[else:  
    <Блок, выполняемый, если не использовался break>  
]
```

Вывод сообщения выполняется стандартной функцией `print()`.

Для формирования координат точки используется модуль генератора случайных чисел, который подключается инструкцией:

```
import random
```

или

```
from random import *
```

Для формирования случайного вещественного числа воспользуемся функцией `uniform(<Начало>, <Конец>)`

В нашей задаче значения X формируются в диапазоне $(-1, 4)$, а для Y – $(-1, 10)$.

Описание алгоритма

1. Вывести "шапку".
2. В цикле от 1 до 10.
3. Сформировать координаты точки X , Y .
4. Определить попадание точки в заданную область. Если есть попадание, то переменная `flag` получает значение 1, а иначе – 0.
5. Вывести координаты точки и маркер оставить на строке сообщения.
6. Вывести результат Yes или No в соответствии со значением переменной `flag`.
7. Изменить параметр цикла и проверить условие завершения.
8. Если условие `false`, то перейти к п. 3.
9. Завершить работу программы.

Описание входных и выходных данных

Типы переменных, использованные в предыдущей работе, не изменялись. Для организации цикла введена новая переменная целого типа (**int**).

Листинг программы

```
# -*- coding: cp1251 -*-
from math import *
from random import *
flag = 0
print("      X      Y      Res")
print("-----")
for n in range(10):
    x = uniform(-1, 4)
    y = uniform(-1, 10)
    if (x < -1) or (x > 4):
        flag = 0      #False
    if ((x>=-1) and (x< 1) and (y>=2*x+2)
        and (y<= x**3-4*x**2+x+6))
        or
        ((x>= 1) and (x<=4) and (y>=x**3-4*x**2+x+6)
        and (y<= 2*x+2))):
        flag = 1
    else:
        flag = 0
    print("{0: 7.2f} {1: 7.2f}".format(x, y), end=" ")
    if flag:
        print("Yes")
    else:
        print("No")
```

Результат тестирования программы

X	Y	Res
-0.68	7.15	No
3.53	3.44	No
-0.05	4.02	Yes
-0.24	0.01	No
2.48	5.58	Yes
0.41	4.77	Yes
0.09	0.89	No
0.68	0.98	No
-0.03	5.46	Yes
-0.73	0.73	Yes

Задание к лабораторной работе №3 "Организация циклов". Задание 2

Для десяти выстрелов, координаты которых задаются генератором случайных чисел, вывести текстовые сообщения о попадании в мишень (см. лабораторная работа № 2, задание 2, стр.31).

Лабораторная работа №3: "Организация циклов". Задание 3

Постановка задачи

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции интегрального синуса, заданной с помощью степенного ряда, на интервале от $X_{нач}$ до $X_{кон}$ с шагом dx с точностью ε .

Таблицу снабдить заголовком и шапкой. Каждая строка таблицы должна содержать значение аргумента, значение функции и количество просуммированных членов ряда.

$$Si(x) = \int_0^x \frac{\sin(x)}{x} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2 \cdot n + 1}}{(2 \cdot n + 1)! \cdot (2 \cdot n + 1)} = x - \frac{x^3}{3! \cdot 3} + \frac{x^5}{5! \cdot 5} - \dots + \quad |x| < \infty$$

Теоретическое введение

При решении задач, в которых дана общая формула вычисления элемента, очень полезно получить рекуррентную формулу. Такая формула позволяет упростить процесс программирования и ускоряет работу программы, так как получение следующего результата основывается на предыдущем. Особое внимание следует обратить на сходимость ряда. Если ряд расходится или сходится слабо, то программа может формировать сообщения о переполнении значений переменных или выводить неверный результат.

1. Будем искать рекуррентное соотношение в виде выражения: $a_{n+1} = k \cdot a_n$. Получим выражение для k :

$$k = \frac{(-1)^{n+1} \cdot x^{2 \cdot (n+1) + 1} \cdot (2 \cdot n + 1)! \cdot (2 \cdot n + 1)}{(2 \cdot (n+1) + 1)! \cdot (2 \cdot (n+1) + 1) \cdot (-1)^n \cdot x^{2 \cdot n + 1}} = - \frac{x^2 \cdot (2 \cdot n + 1)}{(2 \cdot n + 2) \cdot (2 \cdot n + 3)^2}$$

2. Для решения задачи нам потребуется два цикла. Первый цикл While (с предусловием), будет обеспечивать изменение значения переменной X от $X_{нач}$ до $X_{кон}$ с шагом dx . Второй цикл – это цикл с постусловием. Он будет обеспечивать итерационные вычисления элементов ряда, которые удовлетворяют условию $|a_n| < \varepsilon$.

В языке Python цикл с постусловием отсутствует. Для организации такого цикла воспользуемся циклом с предусловием в следующей форме:

```
while True:
    <тело цикла>
    if not <условие>:
        break;
```

Для обмена с консолью (ввод/вывод) использованы стандартные функции `input()` и `print()`.

Описание алгоритма

1. Ввести значения переменных $X_{нач}$, $X_{кон}$, dx и параметр точности ε .
2. Вывести "шапку" таблицы.
3. Инициировать Xt начальным значением ($X_{нач}$).
3. В цикле по Xt .
4. Инициировать переменную для подсчёта суммы членов ряда и переменную, которая отвечает за номер члена ряда (n).
5. В цикле по an .
6. Вычислить k , элемент ряда an , сумму элементов ряда и номер элемента.
7. Если модуль элемента ряда меньше ε , то прервать цикл (`break`) по an , иначе перейти к п.6.

6. Вывести строки таблицы: значение Xt , вычисленное значение функции и количество просуммированных членов ряда
7. Вычислить новое значение переменной $Xt = Xt + dx$.
8. Если значение аргумента меньше $Xkon$, то перейти к пункту 4.
9. Завершить рисование таблицы, и работу программы.

Описание входных и выходных данных

Поскольку тип переменных и точность представления не ограничены условием задачи, то входные переменные ($Xнач$, $Xкон$, dx и параметр точности ε) и вычисляемые значения аргумента и функции представляются переменными вещественного типа (*float*). Количество членов ряда подсчитывается переменной целого типа (*int*).

Листинг программы

```
# -*- coding: cp1251 -*-
from math import *
print('Введите Xbeg, Xend, Dx и Eps')
xb = float(input('Xbeg='))
xe = float(input('Xend='))
dx = float(input('Dx='))
eps = float(input('Eps='))
print("+-----+-----+-----+")
print("I    X        I    Y        I    N I")
print("+-----+-----+-----+")
xt = xb
while xt <= xe:
    an = xt
    n = 0
    y = an
    while True:
        k = -(xt**2)*(2*n+1)/((2*n+2)*(2*n+3)**2)
        an = an*k
        y = y + an
        n = n + 1
        if abs(an) < eps:
            break
    print("I{0: 7.2f} I{1: 7.3f} I{2: 4} I".format(xt,y,n))
    xt = xt + dx
print("+-----+-----+-----+")
```

Результат работы программы

```
Xnach=  -4.00  Xkon=   6.00
Dx=    2.00   Eps=   0.00003
+-----+-----+-----+
I    X        I    Y        I    N I
+-----+-----+-----+
I  -4.00 I -1.758 I    8 I
I  -2.00 I -1.605 I    5 I
I   0.00 I  0.000 I    1 I
I   2.00 I  1.605 I    5 I
I   4.00 I  1.758 I    8 I
I   6.00 I  1.425 I   10 I
+-----+-----+-----+
```


Задание к лабораторной работе №3 "Организация циклов". Задание 3

Вычислить и вывести на экран в виде таблицы значения функции, заданной с помощью ряда Тейлора, на интервале от $X_{нач}$ до $X_{кон}$ с шагом dx с точностью ϵ .

Таблицу снабдить заголовком и шапкой. Каждая строка таблицы должна содержать значение аргумента, значение функции и количество просуммированных членов ряда.

$$1. \ln \frac{x+1}{x-1} = 2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2 \cdot n + 1) \cdot x^{2 \cdot n + 1}} = 2 \cdot \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{3 \cdot x^3} + \frac{1}{5 \cdot x^5} + \dots \right), \quad |x| > 1.$$

$$2. e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots, \quad |x| < \infty.$$

$$3. e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots, \quad |x| < \infty.$$

$$4. \ln(x+1) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{n+1}}{n+1} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad -1 < x \leq 1.$$

$$5. \ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2 \cdot n + 1}}{2 \cdot n + 1} = 2 \cdot \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \right), \quad |x| < 1.$$

$$6. \ln(1-x) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\left(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots \right), \quad -1 \leq x < 1.$$

$$7. \operatorname{arccotg} x = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot x^{2 \cdot n + 1}}{2 \cdot n + 1} = \frac{\pi}{2} - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} + \dots, \quad x \leq 1.$$

$$8. \operatorname{arctg} x = \frac{\pi}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2 \cdot n + 1) \cdot x^{2 \cdot n + 1}} = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3 \cdot x^3} - \frac{1}{5 \cdot x^5} + \dots, \quad x > 1.$$

$$9. \operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot x^{2 \cdot n + 1}}{(2 \cdot n + 1)} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots, \quad |x| \leq 1.$$

$$10. \operatorname{Arth} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2 \cdot n + 1}}{2 \cdot n + 1} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \dots, \quad |x| < 1.$$

$$11. \operatorname{Arth} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2 \cdot n + 1) \cdot x^{2 \cdot n + 1}} = \frac{1}{x} + \frac{1}{3 \cdot x^3} + \frac{1}{5 \cdot x^5} + \dots, \quad |x| > 1.$$

$$12. \operatorname{arctg} x = -\frac{\pi}{2} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2 \cdot n + 1) \cdot x^{2 \cdot n + 1}} = -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3 \cdot x^3} - \frac{1}{5 \cdot x^5} + \dots, \quad x < -1.$$

$$13. e^{-x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2 \cdot n}}{n!} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^8}{4!} - \dots, \quad |x| < \infty.$$

$$14. \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2 \cdot n}}{(2 \cdot n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots, \quad |x| < \infty.$$

$$15. \frac{\sin x}{x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot x^{2 \cdot n}}{(2 \cdot n + 1)!} = 1 - \frac{x^2}{3!} + \frac{x^4}{5!} - \frac{x^6}{7!} + \dots, \quad |x| < \infty.$$

16. $\ln x = 2 \cdot \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n+1}}{(2 \cdot n + 1) \cdot (x+1)^{2n+1}} = 2 \cdot \left(\frac{x-1}{x+1} + \frac{(x-1)^3}{3 \cdot (x+1)^3} + \frac{(x-1)^5}{5 \cdot (x+1)^5} + \dots \right), \quad x > 0.$
17. $\ln x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{n+1}}{(n+1) \cdot (x+1)^{n+1}} = \frac{x-1}{x} + \frac{(x-1)^2}{2 \cdot x^2} + \frac{(x-1)^3}{3 \cdot x^3} + \dots, \quad x > \frac{1}{2}.$
18. $\ln x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (x-1)^{n+1}}{(n+1)} = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \dots, \quad 0 < x \leq 2.$
19. $\arcsin x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2 \cdot n - 1) \cdot x^{2n+1}}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2 \cdot n \cdot (2 \cdot n + 1)} = x + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3 \cdot x^5}{2 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} + \dots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot x^9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} + \dots, \quad |x| < 1.$
20. $\arccos x = \frac{\pi}{2} - \left(x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2 \cdot n - 1) \cdot x^{2n+1}}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2 \cdot n \cdot (2 \cdot n + 1)} \right) = \frac{\pi}{2} - \left(x + \frac{x^3}{2 \cdot 3} + \frac{1 \cdot 3 \cdot x^5}{2 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 7} + \dots + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot x^9}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8 \cdot 9} + \dots \right), \quad |x| < 1.$
21. $\operatorname{sh} x = \frac{1}{2} \cdot (e^x - e^{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2 \cdot n + 1)!} = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + \dots \quad [x^2 < \infty].$
22. $\operatorname{ch} x = \frac{1}{2} \cdot (e^x + e^{-x}) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2 \cdot n)!} = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots \quad [x^2 < \infty].$
23. $\ln \left(\frac{x+1}{x} \right) = 2 \cdot \left[\frac{1}{2x+1} + \frac{1}{3 \cdot (2x+1)^3} + \frac{1}{5 \cdot (2x+1)^5} + \dots \right] \quad (2x+1)^2 > 1.$
24. $(1+x)^{\frac{1}{4}} = 1 + \frac{1}{4} \cdot x - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{8} \cdot x^2 + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{7}{12} \cdot x^3 - \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{8} \cdot \frac{7}{12} \cdot \frac{11}{16} \cdot x^4 + \dots \quad |x| \leq 1.$
25. $(1-x)^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2} \cdot x - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot x^2 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{6} \cdot x^3 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{8} \cdot x^4 - \dots \quad |x| \leq 1.$
26. $(1+x)^{-\frac{1}{3}} = 1 - \frac{1}{3} \cdot x + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6} \cdot x^2 - \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{7}{9} \cdot x^3 + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{7}{9} \cdot \frac{10}{12} \cdot x^4 - \dots \quad |x| \leq 1.$
27. $(1+x)^{-3} = 1 - \frac{1}{1 \cdot 2} (2 \cdot 3 \cdot x - 3 \cdot 4 \cdot x^2 + 4 \cdot 5 \cdot x^3 - 5 \cdot 6 \cdot x^4 + \dots) \quad |x| \leq 1.$
28. $(1-x)^{-4} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} (2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot x + 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot x^2 + 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot x^3 + 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot x^4 + \dots) \quad |x| \leq 1.$
29. $(1+x)^{-5} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} (2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot x - 3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot x^2 + 4 \cdot 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot x^3 - 5 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 8 \cdot x^4 + \dots) \quad |x| \leq 1.$
30. $\sin x = x \cdot \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{n^2 \pi^2} \right) = x \cdot \left(1 - \frac{x^2}{\pi^2} \right) \cdot \left(1 - \frac{x^2}{2^2 \pi^2} \right) \cdot \left(1 - \frac{x^2}{3^2 \pi^2} \right) \cdot \dots \quad |x| < \infty.$