



Especificación y wp

En búsqueda del camino

13 de septiembre de 2024

Algoritmos y estructuras de datos

Grupo datapath

Integrante	LU	Correo electrónico
Andreone, Joaquin	122/24	jandreone06@gmail.com
Comerci, Lucas	818/24	lukicomerci@gmail.com
Luis, Theo	130/23	theoluis44@gmail.com
Zea, Marcos	405/09	zea.marcos@gmail.com



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Universidad de Buenos Aires

Ciudad Universitaria - (Pabellón I/Planta Baja)

Intendente Güiraldes 2610 - C1428EGA

Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Rep. Argentina

Tel/Fax: (+54 +11) 4576-3300

<http://www.exactas.uba.ar>

1. Especificaciones

```

proc grandesCiudades (in ciudades : seq⟨Ciudad⟩) : seq⟨Ciudad⟩
  requiere {sinRepetidos(ciudades)}
  asegura {|res| ≤ |ciudades| ∧ sinRepetidos(res)}
  asegura {(∀i : Z) (0 ≤ i < |ciudades| ∧L ciudades[i]1 ≥ 50000 →L ciudades[i] ∈ res)}

proc sumaDeHabitantes (in menoresDeCiudades: seq⟨Ciudad⟩, in mayoresDeCiudades: seq⟨Ciudad⟩) : seq⟨Ciudad⟩
  requiere {sinRepetidos(menoresDeCiudades), sinRepetidos(mayoresDeCiudades),
    mismasCiudades(menoresDeCiudades, mayoresDeCiudades)}
  asegura {|res| = |menoresDeCiudades|}
  asegura {(∀i, j : Z) ((0 ≤ i < |menoresDeCiudades| ∧ 0 ≤ j < |mayoresDeCiudades|) ∧L
    menoresDeCiudades[i]0 = mayoresDeCiudades[j]0 →L (∃k : Z) (0 ≤ k < |res| ∧
    (res[k]0 = menoresDeCiudades[k]0 ∧ res[k]1 = menoresDeCiudades[i]1 + mayoresDeCiudades[j]1)))})

proc hayCamino (in distancias : seq⟨seq⟨Z⟩⟩, in desde: Z, in hasta: Z) : Bool
  requiere {0 ≤ desde, hasta < |distancias| ∧ esSimetrica(distancias) ∧ tieneDiagonalNula(distancias)}
  asegura {res = true ↔ (∃camino : seq⟨Z⟩) (esCamino(distancias, desde, hasta, camino))}

proc cantidadCaminosNSaltos (inout conexion : seq⟨seq⟨Z⟩⟩, in n: Z)
  requiere {esMatrizDeConexion(conexion) ∧ n ≥ 1 ∧ conexion = Conexion0}
  asegura {mismasDimensiones(conexion, Conexion0)}
  asegura {(∃potenciasDeConexion : seq⟨seq⟨seq⟨Z⟩⟩⟩) (|potenciasDeConexion| = n ∧
    potenciasDeConexion[0] = Conexion0 ∧ todasMismasDimensiones(potenciasDeConexion, Conexion0) ∧
    sonTodasPotenciasDe(potenciasDeConexion, Conexion0) ∧ conexion = potenciasDeConexion[n - 1])}

proc caminoMinimo (in origen : Z, in destino: Z, in distancias: seq⟨seq⟨Z⟩⟩) : seq⟨Z⟩
  requiere {0 ≤ origen < |distancias| ∧ 0 ≤ destino < |distancias| ∧ esSimetrica(distancias)}
  asegura {esCamino(distancias, origen, destino, res) ∨ res = seq⟨⟩}
  asegura {(∀camino : seq⟨Z⟩) (esCamino(distancias, origen, destino, camino) →L
    longitudDeCamino(res, distancias) ≤ longitudDeCamino(camino, distancias))}

```

1.1. Predicados y funciones auxiliares globales

```

pred sinRepetidos (lista: seq⟨Ciudad⟩) {
  (∀i : Z) (0 ≤ i < |lista| →L (∀j : Z) (0 ≤ j < |lista| ∧ Ciudad[i] = Ciudad[j] →L j = i))
}

pred esSimetrica (matriz: seq⟨seq⟨Z⟩⟩) {
  (∀i : Z) (0 ≤ i < |matriz| →L |matriz[i]| = |matriz|) ∧ (∀i, j : Z) (0 ≤ i, j < |matriz| ∧L matriz[i][j] = matriz[j][i])
}

pred tieneDiagonalNula (matriz: seq⟨seq⟨Z⟩⟩) {
  (∀i, j : Z) (0 ≤ i, j < |matriz| ∧ i = j →L matriz[i][j] = 0)
}

pred mismasCiudades (in ciudades: seq⟨Ciudad⟩, in otrasCiudades: seq⟨Ciudad⟩) {
  (∀i : Z) (0 ≤ i < |ciudades| →L (∃j : Z) (0 ≤ j < |otrasCiudades| ∧L ciudades[i]0 = otrasCiudades[j]0))
}

pred esCamino (distancias: seq⟨seq⟨Z⟩⟩, desde: Z, hasta: Z, camino: seq⟨Z⟩) {
  desde ∈ camino ∧ hasta ∈ camino ∧ desde ≠ hasta ∧ (∀i : Z) (0 ≤ i < |camino| →L 0 ≤ camino[i] < |distancias|) ∧
  (∀i : Z) (0 ≤ i < |camino| - 1 →L distancias[camino[i]][camino[i + 1]] ≠ 0)
}

pred esMatrizDeConexion (matriz: seq⟨seq⟨Z⟩⟩) {
  esSimetrica(matriz) ∧ tieneDiagonalNula(matriz) ∧ (∀i, j : Z) (0 ≤ i, j < |matriz| ∧ i ≠ j →L
    (matriz[i][j] = 1 ∨ matriz[i][j] = 0))
}

pred esProductoDe (matrizA: seq⟨seq⟨Z⟩⟩, matrizB: seq⟨seq⟨Z⟩⟩, matriz: seq⟨seq⟨Z⟩⟩) {
  mismasDimensiones(matrizA, matrizB) ∧ mismasDimensiones(matrizA, matriz) ∧
  (∀i, j : Z) (0 ≤ i, j < |matriz| →L matriz[i][j] = ∑k=0|A|-1 matrizA[i][k] · matrizB[k][j])
}

pred mismasDimensiones (matrizA: seq⟨seq⟨Z⟩⟩, matrizB: seq⟨seq⟨Z⟩⟩) {
  |matrizA| = |matrizB| ∧ (∀i : Z) (0 ≤ i < |matrizA| →L |matrizA[i]| = |matrizB[i]|)
}

pred todasMismasDimensiones (matrices: seq⟨seq⟨seq⟨Z⟩⟩⟩, matriz: seq⟨seq⟨Z⟩⟩) {
  (∀i : Z) (0 ≤ i < |matrices| →L mismasDimensiones(matrices[i], matriz))
}

```

```

}
pred sonTodasPotenciasDe (matrices: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩, matriz: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩) {
  (∀i : ℤ) (1 ≤ i < |matrices| → esProductoDe(matriz, matrices[i - 1], matrices[i]))
}
aux longitudDeCamino (camino: seq⟨ℤ⟩, distancias: seq⟨seq⟨ℤ⟩⟩) : ℤ =
  |camino|-2
  ∑i=0 distancias[camino[i]][camino[i + 1]];

```

2. Demostraciones de correctitud

```

1 | S1: res := 0;
2 | S2: i := 0;
3 | S3: while (i < ciudades.length) do
4 |   S4:   res := res + ciudades[i].habitantes
5 |   S5:   i = i + 1
6 |   endwhile

```

Como se ve en la implementacion de la especificacion, el programa consta solo de un ciclo while, por lo que para demostrar su correctitud debemos usar el “Teorema del Invariante” y el “Teorema de terminación de un ciclo”. Se tienen que cumplir estas condiciones:

1. $P_c \implies I$
2. $\{I \wedge B\}S\{I\}$
3. $I \wedge \neg B \implies Q_c$
4. $\{I \wedge B \wedge v_0 = fv\}S\{fv < v_0\}$
5. $I \wedge fv \leq 0 \implies \neg B$

Basado en la especificacion y la implementacion propongo:

- $P_c \equiv res = 0 \wedge i = 0$
- $B \equiv i < |ciudades|$
- $S_1 \equiv res := res + ciudades[i]_1$
- $S_2 \equiv i := i + 1$
- $Q_c \equiv res = \sum_{j=0}^{|ciudades|-1} ciudades[j]_1 \wedge res > 50000$
- $I \equiv 0 \leq i \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j]_1$
- $fv = |ciudades| - i$

2.1. $P_c \implies I$

Reemplazo:

$$\begin{aligned}
 res = 0 \wedge i = 0 &\implies 0 \leq i \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j]_1 \\
 0 \leq i \leq |ciudades| &\equiv 0 \leq 0 \leq |ciudades| \equiv True \\
 res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j]_1 &\equiv 0 = \sum_{j=0}^{0-1} ciudades[j]_1 = 0 \equiv True
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, se cumple $P_c \implies I$

2.2. $\{I \wedge B\}S\{I\}$

Para que la tripla de Hoare sea valida, la precondition debe implicar la “Weakest precondition” del código y la postcondición. Es decir:

$$\{I \wedge B\}S\{I\} \iff \{I \wedge B\} \implies_L wp(S, I)$$

$$\begin{aligned} wp(S, I) &\equiv wp(S_1, wp(S_2, I)) \equiv wp(S_1, wp(i := i + 1, 0 \leq i \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j]_1)) \\ &\equiv wp(S_1, def(i + 1) \wedge_L 0 \leq i + 1 \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i+1-1} ciudades[j]_1) \\ &\equiv wp(res := res + ciudades[i]_1, 0 \leq i + 1 \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^i ciudades[j]_1) \\ &\equiv def(res) \wedge_L def(ciudades[i]_1) \wedge 0 \leq i + 1 \leq |ciudades| \wedge res + ciudades[i]_1 = \sum_{j=0}^i ciudades[j]_1 \\ &\equiv 0 \leq i < |ciudades| \wedge_L 0 \leq i + 1 \leq |ciudades| \wedge res + ciudades[i]_1 = \sum_{j=0}^i ciudades[j]_1 \end{aligned}$$

Combino los intervalos de i y resto en ambas partes de la igualdad $ciudades[i]_1$ para transformar el rango de la sumatoria

$$\equiv 0 \leq i < |ciudades| \wedge_L res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j]_1$$

Como $I \wedge B \equiv wp(S, I)$, por lo tanto $\{I \wedge B\} \implies wp(S, I)$ que era lo que necesitaba para probar que la tripla de Hoare sea válida.

2.3. $I \wedge \neg B \implies Q_c$

Reemplazo:

$$I \wedge \neg B \equiv 0 \leq i \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j]_1 \wedge i \geq |ciudades|$$

Si $i \geq |ciudades| \wedge i \leq |ciudades|$ entonces $i = |ciudades|$

$$i = |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j]_1 \implies res = \sum_{j=0}^{|ciudades|-1} ciudades[j]_1 \wedge res > 50000 \equiv Q_c$$

Esto se cumple, ya que por especificación al menos una de ellas es grande, es decir, supera los 50.000 habitantes.

2.4. $\{I \wedge B \wedge v_0 = fv\}S\{fv < v_0\}$

Para que la tripla de Hoare sea válida, la precondition debe implicar la “Weakest precondition” del programa y la postcondición. Es decir:

$$\{I \wedge B \wedge v_0 = fv\}S\{fv < v_0\} \iff \{I \wedge B \wedge v_0 = fv\} \implies wp(S, fv < v_0)$$

Calculo wp:

$$\begin{aligned} wp(S, fv < v_0) &\equiv wp(S_1, wp(S_2, fv < v_0)) \equiv wp(S_1, wp(i := i + 1, |ciudades| - i < v_0)) \\ &\equiv wp(res := res + ciudades[i]_1, def(i + 1) \wedge_L |ciudades| - (i + 1) < v_0) \\ &\equiv def(ciudades[i]_1) \wedge_L |ciudades| - i - 1 < v_0 \\ &\equiv 0 \leq i < |ciudades| \wedge_L |ciudades| - i - 1 < v_0 \end{aligned}$$

Y desarrollo la precondition:

$$\{I \wedge B \wedge v_0 = fv\} \equiv 0 \leq i \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j]_1 \wedge i < |ciudades| \wedge |ciudades| - i = v_0$$

Ignoro lo que corresponde a res porque no lo necesito para la demostración, y combino los rangos de i :

$$0 \leq i < |ciudades| \wedge |ciudades| - i = v_0$$

Entonces:

$$\begin{aligned} \{I \wedge B \wedge v_0 = fv\} &\Longrightarrow wp(S, fv < v_0) \Longleftrightarrow \\ 0 \leq i < |ciudades| \wedge |ciudades| - i = v_0 &\Longrightarrow 0 \leq i < |ciudades| \wedge_L |ciudades| - i - 1 < v_0 \Longleftrightarrow \\ |ciudades| - i - 1 < |ciudades| - i &\Longleftrightarrow -1 < 0 \equiv True \end{aligned}$$

Por lo tanto, la tripla de Hoare es válida.

2.5. $I \wedge fv \leq 0 \Longrightarrow \neg B$

Desarrollo:

$$I \wedge fv \leq 0 \equiv 0 \leq i \leq |ciudades| \wedge res = \sum_{j=0}^{i-1} ciudades[j]_1 \wedge |ciudades| - i \leq 0 \Longrightarrow \neg B$$

Ignoro lo que corresponde a *res* porque no lo necesito para la demostración:

$$\begin{aligned} 0 \leq i \leq |ciudades| \wedge |ciudades| - i \leq 0 &\Longrightarrow i \geq |ciudades| \equiv \\ 0 \leq i \leq |ciudades| \wedge |ciudades| \leq i &\Longrightarrow i \geq |ciudades| \equiv \\ i = |ciudades| &\Longrightarrow i \geq |ciudades| \equiv True \end{aligned}$$