

**Analysis IV**  
**Uebung 09**  
*Michael Kopp*  
June 21, 2010

Anna 9  
Michael  
Kopp

11  
(a)  $f(z) = \frac{e^{izA}}{z}$  Polst. bei  $z=0$  mit  $\operatorname{Res}_0 f = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{z e^{izA}}{z} = 1$

$\int_{\Gamma} f(z) dz = 0$  (Residuensatz)

$\left| \int_{\Gamma} f(z) dz \right| = \left| \int_0^\pi \frac{1}{R} e^{-i\varphi} e^{i(R e^{i\varphi})A} R i e^{i\varphi} d\varphi \right| \leq \int_0^\pi e^{-R \sin \varphi} d\varphi \xrightarrow{R \rightarrow \infty} 0$  da  $\varphi \in (0, \pi) \Rightarrow \sin \varphi > 0$

$\int_{-\infty}^0 \frac{e^{izA}}{z} dz + \int_0^{+\infty} \frac{e^{izA}}{z} dz + \int_{+\infty}^0 \frac{e^{izA}}{z} dz = 0$

$\int_{+\infty}^0 \frac{e^{-izA}}{z} dz = -\pi i$  (Induktionslemma)

$\Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{e^{-izA}}{z} dz + \frac{e^{izA}}{z} dz = +i\pi$

$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{izA}}{z} dz = +i\pi$  (Sym.)

$\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{izA}}{z} dz = \pi$

$e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$

$e^{-i\varphi} = \cos \varphi - i \sin \varphi$

$2 \cos \varphi = e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}$

$2i \sin \varphi = e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}$

□

(b)  $\int_{-\infty}^{+\infty} = \int_{-N_\varepsilon}^{-N_\varepsilon} + \int_{-N_\varepsilon}^{N_\varepsilon} + \int_{N_\varepsilon}^{+\infty}$

(\*)  $\int_{-N_\varepsilon}^{+N_\varepsilon} \frac{f(x_0+x) - f(x_0)}{x} g(x) dx \xrightarrow{L \rightarrow \infty} 0$  (Leibniz-Formel von Riemann)

f mindestens  $\frac{1}{x}$ -mal diff.-bar. f' ist beschränkt und damit  $\int_{-N_\varepsilon}^{+N_\varepsilon} \frac{f(x_0+x) - f(x_0)}{x} dx$   $\leq C$  da  $\frac{1}{x} \in L^1$ .

(i)



$$\boxed{2} \quad S_n(t) = \int_{-\pi}^{\pi} f(x+t) D_n(x) dx$$

$$D_n(x) = \frac{n^{-1} [(\sin \frac{1}{2})x]}{2\pi \sin(\frac{x}{2})}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} D_n(x) dx = \int_{-\pi}^0 D_n(x) dx = \frac{1}{2}$$

$$\left( S_n - \frac{1}{2} [f(t+0) + f(t-0)] \right) = \left( \int_{-\pi}^{\pi} [f(x+t) - f(t+0)] D_n(x) dx + \int_{-\pi}^0 [f(x+t) - f(t-0)] D_n(x) dx \right)$$

$$\left( \int_{-\pi}^{\pi} \frac{f(x+t) - f(t+0)}{x} x D_n(x) dx \right) =$$

$$\left( \int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{\frac{f(x+t) - f(t+0)}{x}}_{\in L^1} \underbrace{\frac{x}{\sin \frac{x}{2}}}_{\in L^1} dx \right) \quad \left| \frac{x}{\sin \frac{x}{2}} \right| \leq \pi \quad \text{für } x \in [-\pi, \pi]$$

und beschränkt! [Eigentlich ist Beschränktheit hinreichend & notwendig,  $L^1$  ist Frage...]  $\tilde{f}(x,t) \in L^1$

Wende Lemma von Riemann an. Für  $n \rightarrow \infty$  versch.

(1) Analog 2. Integral  $\square$

Woche vom 29. März - 2. April 2010

Freitag	Donnerstag	Mittwoch	Dienstag	Montag	14 Uhr
Ferien	Ferien			XXXXXX	XXXXXX
				XXXXXX	XXXXXX
				XXXXXX	XXXXXX
			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
			XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX
		XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX



$$\boxed{13} \quad (a) \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-i\lambda x} dx = \hat{f}(\lambda) = \lambda \cdot f(\lambda)$$

$$\lambda \neq 0$$

$$\tilde{f}: f \mapsto \lambda \cdot f$$

$$f = f^* \text{ da } f \in \mathbb{R}$$

$$\left( \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-i\lambda x} dx \right)^* = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\lambda x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{\lambda} \hat{f}(\lambda) e^{i\lambda x} dx =$$

$$\tilde{f}^{-1} \left[ \frac{1}{\lambda} \hat{f} \right] = \frac{1}{\lambda} f = \hat{f}^* = \cancel{\hat{f}(\lambda)} (\lambda \neq 0)^* = \lambda^* f$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\lambda} = \lambda^*$$

$$\lambda = r e^{i\varphi} \quad \lambda^* = r e^{-i\varphi} \quad \frac{1}{\lambda} = \frac{1}{r} e^{-i\varphi}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{r} e^{-i\varphi} = r e^{-i\varphi} \Rightarrow \boxed{r=1}$$

$$\Rightarrow |\lambda| = 1$$

$$(b) \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{x^2}{2}} e^{-i\lambda x} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2} \overbrace{[x^2 + 2i\lambda x + (-\lambda^2) + \lambda^2]}^{(x+i\lambda)^2}} dx$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\lambda^2}{2}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy \quad \ominus$$

$$\zeta = x + i\lambda \quad d\zeta = dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{\zeta^2}{2}} d\zeta = 2 \int_0^{\infty} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 2 \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot y^{\frac{1}{2}-1} dy = \sqrt{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{2\pi}$$

$$\zeta^2/2 = y \quad dy = \zeta d\zeta \rightarrow d\zeta = \frac{1}{\zeta} dy = \frac{1}{\sqrt{2}y} dy = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot y^{-\frac{1}{2}}$$

$$\ominus \quad \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\lambda^2}{2}} \cdot \sqrt{2\pi} = e^{-\lambda^2/2} \quad \square$$



