講義ノート：物理に現れるモジュライ

小武

2026 年 11 月 3 日

目次

第 I 部　共通する数学的構造 5

第 1 章　モジュライ問題の定義：分類問題として理解する 7
1.1 モチベーション：なぜ「空間の空間」を考えるのか 7
1.2 やりたいこと：分類問題の定式化 7
1.3 具体例：2 次元トーラスのモジュライと共形同値 8
1.4 局所的な変形と大域的なトポロジーの概観 8
1.5 まとめ：物理学における役割 9

第 2 章　群作用と商空間：ゲージ対称性との関係を理解する 11
2.1 ゲージ対称性と物理的冗長性 11
2.2 群作用の数学的定式化：軌道と商空間 12
2.3 良い商空間が得られる条件：自由かつ固有な作用 14
2.4 固定部分群と商空間の特異点（オービフォールド） 16
2.5 大域的な障害：Gribov 問題と大域的定義の困難 18
2.6 まとめと次章への展望 19

第 3 章　接空間・特異点・次元：モジュライの自由度を理解する 21
3.1 零モードと集団座標：接空間はなぜ物理的に重要か 21
3.2 ゲージ接続のモジュライと楕円型複体 22
3.3 複素幾何における変形理論（小平・スペンサー理論） 25
3.4 コホモロジーの高次項：自己同型と変形の障害 27
3.5 指数定理とモジュライの仮想次元 29

第 4 章　束・接続・曲率：ゲージ理論の数学的基礎を理解する 33
4.1 ファイバー束と大域的トポロジー：Dirac モノポールの教訓 33
4.2 主束と接続（Connection）：水平部分空間の分離 34
4.3 曲率と可積分条件：並行移動の経路依存性 36
4.4 特性類とトポロジカル不変量（Chern–Weil 理論） 38

第 II 部　物理に現れるモジュライ 41

第 5 章　Yang–Mills 理論：インスタントンのモジュライ 43
5.1 ユークリッド化と Bogomol’nyi 限界 43

5.2 BPST インスタントンと集団座標 45
5.3 ADHM 構成法 46
5.4 指数定理とモジュライの次元 48
5.5 小インスタントン極限と Uhlenbeck コンパクト化 48

第 6 章 真空のモジュライ：自発的対称性の破れ 51
6.1 スカラー場のポテンシャルと平坦な方向 51
6.2 自発的対称性の破れとコセット空間 G/H 52
6.3 非線形シグマ模型の標的空間としてのモジュライ 53
6.4 超対称ゲージ理論とシンプレクティック商空間 54
6.5 量子効果とモジュライ空間の運命 58

第 7 章 弦理論・Calabi–Yau 多様体：複素構造・Kähler 構造 59
7.1 超対称性の保存と Calabi–Yau 多様体 59
7.2 計量の変形とモジュライの分解 61
7.3 特殊幾何学（Special Geometry）と有効理論 63
7.4 モジュライ空間の特異点：コニフォールド 64
7.5 ミラー対称性の予兆 65

第 8 章 一般相対論・幾何構造：計量や曲面の分類 67
8.1 計量の空間と微分同相群による商 67
8.2 作用の変形と物理的自由度の数え上げ 68
8.3 2 次元重力と Weyl 不変性：局所自由度の消失 68
8.4 大域的なモジュライと Teichmüller 空間への帰着 69

第 I 部

共通する数学的構造

第 1 章

モジュライ問題の定義：分類問題として理解する

1.1　モチベーション：なぜ「空間の空間」を考えるのか

物理学において、ある系を完全に理解することは「その系が取り得る状態や構造をすべて見つけ出し、分類すること」に帰着することが多い。古典論においては、運動方程式の特定の解（例えば平坦な時空や 1 つのソリトン解）を一つ見つければ系のダイナミクスを決定できた。しかし、場の量子論や弦理論といった非摂動的な効果を考慮すべき現代的な枠組みでは、単一の解や状態を個別に調べるだけでは不十分である。

例えば、経路積分量子化においては、作用を最小化する古典解（真空やインスタントン）だけでなく、その周辺のあらゆる配位を足し合わせる必要がある。系に連続的な対称性や平坦な方向（flat direction）が存在する場合、作用を最小にする解は 1 つではなく、連続的なパラメータの組で指定される「解の集合」を形成する。この「条件を満たす解の全体集合」がどのような幾何学的・位相的構造を持っているかを知ることが不可欠になる。

このように、ある条件を満たす数学的対象（多様体、ベクトル束、微分方程式の解など）を同値関係で割った商空間を**モジュライ空間（Moduli space）**と呼ぶ。モジュライ空間自体がひとつの幾何学的な空間（多様体やその拡張）となり、そのトポロジーや幾何学が元の物理系の性質（非摂動効果、双対性、アノマリーなど）を決定づけるのである。

【注】 超対称ゲージ理論などにおける「パラメータ空間」も一種のモジュライ空間である。スカラー場のポテンシャルが平坦な谷を持つ場合、連続的な真空期待値（例えば $u = \langle \mathrm{Tr}\Phi^2 \rangle$）を変化させることは、真空のモジュライ空間 $\mathcal{M}_{\mathrm{vac}}$ 上を移動することに対応する（第 6 章で詳述）。Seiberg–Witten 理論では、このモジュライ空間上の特殊 Kähler 幾何学とモノドロミーを調べることで、低エネルギー有効作用を非摂動的に完全決定している。

1.2　やりたいこと：分類問題の定式化

本講義全体の目的は、「対象の分類」という素朴なアイデアを厳密な数学的言語で記述し、物理へ応用することである。分類問題を定式化するためには、以下のステップを踏む必要がある。

1. **対象（Objects）の決定**：何を分類したいのか。物理的文脈に応じて、考えるべき対象はリーマン面（弦理論）、ベクトル束やゲージ接続（Yang–Mills 理論）、あるいは計量（一般相対論）など多岐にわたる。

2. **同値関係（Equivalence）の導入**：いつ 2 つの対象を「物理的に同じ状態」とみなすか。例えば、時空の座標変換（微分同相写像）やゲージ変換で移り合う 2 つの配位は、物理的には全く同一の状態を表す。ゲージ対称性は物理的冗長性であり、これを正しく割り引く（商をとる）操作が不可欠となる（第 2 章）。
3. **族（Families）の概念と局所的変形**：対象が連続パラメータ（モジュライ・パラメータ）に依存して滑らかに変化するとはどういうことかを定義する。これにより、モジュライ空間の局所的な座標が張る「接空間」が定義される。接空間の自由度は、しばしばコホモロジー群によって数え上げられる（第 3 章）。
4. **モジュライ空間の構成とコンパクト化**：同値類の全体からなる集合 $\mathcal{M}$ に位相や幾何構造を導入する。さらに、空間が「退化」する極限（例えば弦がちぎれる極限など）を付け加えて空間を閉じる「コンパクト化」の作業が、弦の散乱振幅の境界での振る舞いを理解する上で重要となる（第 10 章）。

1.3　具体例：2 次元トーラスのモジュライと共形同値

最も基本的かつ物理的に重要な例として、2 次元トーラス（種数 $g = 1$ のリーマン面）の分類を考えよう。平坦な計量を持つトーラスは、複素平面 $\mathbb{C}$ を 2 つの離散的な並進ベクトルで作られる格子 Λ で割った商空間 $\mathbb{C}/\Lambda$ として表される。

2 次元の計量は局所的に 3 つの自由度を持つが、微分同相変換（2 自由度）と Weyl 変換 $g_{ab} \to e^{2\omega} g_{ab}$（1 自由度）を用いて、計量を平坦な形に「ゲージ固定」することができる。スケール変換と回転の全体的な自由度を使って一方の並進ベクトルを 1 に固定すると、もう一方のベクトルを複素上半平面の点 $\tau \in \mathbb{H} = \{\tau \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Im}\,\tau > 0\}$ として選ぶことができる。この τ がトーラスの複素構造を決定するモジュライ・パラメータである。

しかし、同じ格子 Λ を張る基底の選び方には冗長性がある。$SL(2,\mathbb{Z})$ によるモジュラー変換

$$\tau \to \frac{a\tau + b}{c\tau + d} \quad \left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in SL(2,\mathbb{Z}) \right) \tag{1.1}$$

で移り合う τ たちは、全く同じ格子（同じトーラス）を与える。したがって、トーラスのモジュライ空間 $\mathcal{M}_{g=1}$ は、上半平面 $\mathbb{H}$ をモジュラー群で割った商空間

$$\mathcal{M}_1 = \mathbb{H}/SL(2,\mathbb{Z}) \tag{1.2}$$

となる。これは基本領域としてよく知られる「鍵穴型」の領域をなす。

【注】 弦理論の摂動論（1 ループ振幅）において、トーラスのモジュライ空間上の積分が実行される。このとき、ゲージ固定に伴う Faddeev–Popov 行列式（ゴースト場の寄与）と物質場の寄与が相殺し、モジュラー不変性が保たれるためには、系の中心電荷が特定の条件を満たす必要がある。例えばボソン弦の場合、ヴィラソロ代数のゴーストの寄与 $c = -26$ を打ち消すために、時空の次元が臨界次元 $D = 26$ であることが要求される。モジュライ空間の幾何学は、このように量子論の無矛盾性と直結している（第 9 章・第 11 章）。

1.4　局所的な変形と大域的なトポロジーの概観

モジュライ空間の構造は、局所的な性質と大域的な性質の 2 つの側面に分けて調べられる。

局所的には、ある状態をわずかに変形したときに、それが物理的に新しい状態（モジュ

ライの別な点）を与えるか、それとも単なるゲージ変換（あるいは座標変換）に過ぎないかが問題になる。量子論の経路積分においては、モジュライ空間の接空間方向への変形は作用を変えない「零モード（ゼロ・モード）」に対応する。モジュライ空間の次元は、系に存在する物理的な零モードの数に等しく、これを数え上げるのが Atiyah–Singer の指数定理である。

一方、大域的には、モジュライ空間の境界や特異点が問題となる。前述のトーラスの例では、$\mathrm{Im}\,\tau \to \infty$ の極限でトーラスは無限に細長く退化し、円柱に近づく。物理的には、これは弦理論における赤外発散（あるいは双対チャネルでの紫外極限）に対応しており、モジュライ空間を適切に「コンパクト化」して境界を制御しなければならない。

【注】 相対論において計量を扱う際、本講義では $(-+++)$ の符号系を採用する。ローレンツ多様体の計量のモジュライを考える場合、空間成分と時間成分で許容される位相幾何学的性質（スピン構造や因果構造）が異なるため、Riemann 多様体（正定値計量）のモジュライとは異なる困難が生じる。弦理論では通常、Wick 回転によって Euclid 化された世界面や余剰次元の空間（Calabi–Yau 多様体など）のモジュライを扱う（第 7 章・第 8 章）。

1.5　まとめ：物理学における役割

本章の総括として、モジュライ空間の概念が物理学の各分野でどのような役割を果たし、それが本講義のどの章に対応するかを整理しておく。

- **ゲージ理論（第 5 章・第 11 章）**：Yang–Mills 方程式のインスタントン解のモジュライ空間。モジュライ上の積分は、非摂動的な相関関数や量子異常（アノマリー）を記述する。
- **共形場理論とリーマン面（第 9 章）**：Teichmüller 空間と写像類群の商としてのリーマン面のモジュライ $\mathcal{M}_g$。弦の散乱振幅の導出の基礎となる。
- **弦理論の余剰次元（第 7 章）**：超弦理論のコンパクト化における Calabi–Yau 多様体のモジュライ空間（複素構造と Kähler 構造の変形）。これは低エネルギー有効理論におけるスカラー場（モジュライ場）として現れる。

次章では、この「物理的冗長性を割って真の自由度を取り出す」という手続きを数学的に定式化する「群作用と商空間」について詳しく見ていく。

第 2 章

群作用と商空間：ゲージ対称性との関係を理解する

第 1 章では、モジュライ空間を「対象の集合を同値関係で割ったもの」として導入した。物理において同値関係の大部分は、ゲージ変換や座標変換といった**群の作用**によって与えられる。本章では、群作用と商空間の理論を整理し、商空間が良い空間になるための条件と、それが破れたときに現れる特異点や大域的障害を、具体例を通して調べる。

2.1　ゲージ対称性と物理的冗長性

物理系において「ゲージ対称性がある」という言明は、時空の並進対称性や回転対称性のような自然界に存在する「真の力学的な対称性」を意味するものではない。それは、我々が系を局所的かつ共変的に記述するために導入した力学変数（ゲージ場やベクトルポテンシャルなど）に、**物理的冗長性（Physical Redundancy）**が存在することを意味している。

例えば、非可換ゲージ理論（Yang–Mills 理論）におけるゲージ場 $A_\mu(x) = A_\mu^a(x) T^a$ を考えよう。局所ゲージ変換

$$A_\mu(x) \to A'_\mu(x) = U(x) A_\mu(x) U^{-1}(x) - \frac{i}{g} (\partial_\mu U(x)) U^{-1}(x) \tag{2.1}$$

（共変微分 $D_\mu = \partial_\mu - i g A_\mu$ が共変的に変換されるように符号を選んだ）を施しても、系を規定する電磁場強度（曲率テンソル）

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - i g [A_\mu, A_\nu] \tag{2.2}$$

は $F_{\mu\nu} \to U(x) F_{\mu\nu} U^{-1}(x)$ と共変的に変換され、ヤン・ミルズ作用 $S_{\mathrm{YM}} \propto \int d^4x \, \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu})$ は完全に不変に保たれる。

この変換全体のなす群が**ゲージ変換群**である。G をコンパクトなリー群（$U(1)$、$SU(N)$ など）とし、簡単のため時空 M 上の自明な主 G 束を考えると、ゲージ変換群は滑らかな写像 $U : M \to G$ 全体

$$\mathcal{G} = \mathrm{Map}(M, G) \tag{2.3}$$

に各点ごとの積 $(U_1 U_2)(x) = U_1(x) U_2(x)$ を入れたものであり、式 (2.1) によってゲージ接続全体の空間 $\mathcal{A}$ に作用する。

したがって、数学的に許容されるすべてのゲージ接続のなす空間（アフィン空間 $\mathcal{A}$）の中には、物理的に全く同一の状態を表す配位が無数に含まれていることになる。真に独立な物理的自由度からなる空間（モジュライ空間）は、無限次元のリー群 $\mathcal{G}$ の作用によって $\mathcal{A}$ を割った商空間として定義されなければならない。

$$\mathcal{M} = \mathcal{A}/\mathcal{G} \tag{2.4}$$

最も簡単な電磁気学（$G = U(1)$）の場合、ゲージ変換は見慣れた $A_\mu \to A_\mu + \frac{1}{g}\partial_\mu \lambda$ となり、2 つのポテンシャルが同じ軌道に属するのは、その差が完全形式であるときに限る。

【注】 $U(x) = e^{i\lambda(x)}$ を式 (2.1) に代入する。$U(1)$ は可換なので $UAU^{-1} = A$ であり、$(\partial_\mu U)U^{-1} = i\partial_\mu \lambda$ より

$$A_\mu \to A_\mu - \frac{i}{g}(i\partial_\mu \lambda) = A_\mu + \frac{1}{g}\partial_\mu \lambda$$

を得る。したがって $A' - A = \frac{1}{g} d\lambda$ は完全形式である。

ここで商空間 $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ の構造は、時空のトポロジーに依存する。$M = \mathbb{R}^4$ のように可縮な時空では、Poincaré の補題により「$dF = 0$ を満たす F は必ず $F = dA$ と書け、F が同じなら A はゲージ同値」であるから、$\mathcal{A}/\mathcal{G}$ は閉 2 形式 F の空間と同一視され、場の強さ F がすべての物理的情報を持つ。一方、M が非自明なループ（例えば S^1 方向）を持つ場合はそうではない。$F = 0$ でもホロノミー $e^{ig\oint A}$ が非自明な配位は、自明な配位 $A = 0$ とゲージ同値ではない。これが Aharonov–Bohm 効果であり、第 3 章ではこれを Wilson ラインのモジュライとして再び扱う。

【注】 この「物理的冗長性を割る」という幾何学的な要請は、量子論の経路積分において極めて具体的な手続きを要求する。分配関数においてゲージ軌道の体積で割る操作を行う際、ゲージ固定条件のヤコビアンとして Faddeev–Popov 行列式が現れる。これを局所的な作用に持ち上げるために導入されるのが、反交換関係を満たすグラスマン偶奇性を持ったゴースト場・反ゴースト場である。ゴースト場は、商空間 $\mathcal{M} = \mathcal{A}/\mathcal{G}$ 上の積分測度を正しく定義し、量子論レベルでの BRST 不変性を保証するための代数的な要請として不可欠である。

2.2　群作用の数学的定式化：軌道と商空間

前節で見たモジュライ空間 $\mathcal{M}$ を構成する数学的基盤として、群作用の理論を整理しておく。以下、M は物理においては「すべての許容される場の配位空間」や「計量の空間」、G は「ゲージ群」や「微分同相群」を念頭に置いている。

2.2.1　群作用・軌道・商空間

Definition 2.2.1: 群作用

群 G と集合 M に対し、写像 $\Phi : G \times M \to M$、$(g, x) \mapsto g \cdot x$ が

1. $e \cdot x = x$　　（e は単位元）
2. $g \cdot (h \cdot x) = (gh) \cdot x$　　$(g, h \in G)$

を満たすとき、Φ を G の M への**（左）作用**という。G がリー群、M が滑らかな多様体で Φ が滑らかなとき、**滑らかな作用**という。

各 $g \in G$ に対して $x \mapsto g \cdot x$ は逆写像 $x \mapsto g^{-1} \cdot x$ を持つので、滑らかな作用の場合、これは M の微分同相写像である。

Definition 2.2.2: 軌道・固定部分群・商空間

1. $x \in M$ の**軌道（Orbit）**を $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\} \subset M$ で定める。
2. $x \in M$ の**固定部分群（等方部分群、スタビライザー）**を $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$ で定める。
3. M 上の関係 $\sim$ を「$x \sim y \iff$ ある $g \in G$ が存在して $y = g \cdot x$」で定義し、その同値類の集合を**商空間** M/G、x をその同値類に写す写像を**射影** $\pi : M \to M/G$ と呼ぶ。M/G には**商位相**（$V \subset M/G$ が開集合 $\iff$ $\pi^{-1}(V)$ が M の開集合）を入れる。

固定部分群は、物理的には配位 x を変えない「残された対称性」を表している。

定義の中で $\sim$ を同値関係と呼んだが、これは実際に同値関係であり、したがって M は互いに交わらない軌道の和に分割され、M/G は「軌道の集合」と同一視される。

証明. 反射律は $x = e \cdot x$ から、対称律は $y = g \cdot x \Rightarrow x = g^{-1} \cdot y$ から、推移律は $y = g \cdot x,\ z = h \cdot y \Rightarrow z = (hg) \cdot x$ から従う。 □

また、作用が連続ならば射影 $\pi : M \to M/G$ は連続な開写像である。この性質は後でハウスドルフ性を調べる際に用いる。

証明. 連続性は商位相の定義から従う。$V \subset M$ を開集合とすると、

$$\pi^{-1}(\pi(V)) = \bigcup_{g \in G} g \cdot V$$

であり、各 $g \cdot V$ は（$x \mapsto g \cdot x$ が同相写像なので）開集合である。よって $\pi(V)$ は開集合である。 □

2.2.2　固定部分群と軌道の構造

軌道と固定部分群の間には、次の基本的な関係がある。

Proposition 2.2.1: 軌道・固定部分群定理

1. G_x は G の部分群である。
2. 写像 $G/G_x \to G \cdot x$、$gG_x \mapsto g \cdot x$ は well-defined な全単射である。
3. 同じ軌道上の点の固定部分群は互いに共役である：$G_{g \cdot x} = g\, G_x\, g^{-1}$。

証明. (1) $g, h \in G_x$ ならば $(gh^{-1}) \cdot x = g \cdot (h^{-1} \cdot x) = g \cdot x = x$。(2) $g \cdot x = h \cdot x \iff h^{-1}g \in G_x \iff gG_x = hG_x$ より、well-defined 性と単射性が同時に従う。全射性は軌道の定義から明らか。(3) $k \in G_x$ ならば $(gkg^{-1}) \cdot (g \cdot x) = g \cdot (k \cdot x) = g \cdot x$ であり、逆も同様。 □

G がリー群で作用が滑らかなとき、G_x は閉部分群（したがってリー部分群）であり、(2) から

$$\dim(G \cdot x) = \dim G - \dim G_x \tag{2.5}$$

が成り立つ。すなわち、固定部分群が大きい点ほど軌道は「小さく」なる。また (3) により、軌道ごとに固定部分群の共役類が定まる。これを軌道の**型**と呼ぶ。以下、いくつかの例でこれらの概念を確認しよう。

■例：平面の回転 $U(1) \curvearrowright \mathbb{C}$　$U(1)$ を $e^{i\theta}\cdot z = e^{i\theta}z$ によって $\mathbb{C}$ に作用させる。$z \neq 0$ の軌道は半径 $|z|$ の円周で固定部分群は自明（$G_z = \{1\}$）、原点の軌道は 1 点 $\{0\}$ で固定部分群は $G_0 = U(1)$ 全体である。軌道の次元はそれぞれ $1-0=1$ と $1-1=0$ で、上の公式と整合している。不変量 $r = |z|$ によって商空間は

$$\mathbb{C}/U(1) \cong [0, \infty) \tag{2.6}$$

となる。これは境界を持つ半直線であり、境界点 $r=0$ がちょうど固定部分群の大きい点に対応している。物理的には、$U(1)$ 対称性を持つ複素スカラー場 ϕ の配位を対称性で割ると不変量 $|\phi|$ だけが残り、$\phi = 0$ で対称性が回復することに対応する（第 6 章）。

■例：円周 $\mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{R}$　$\mathbb{Z}$ を $n\cdot x = x+n$ によって $\mathbb{R}$ に作用させる。$n \neq 0$ ならば $x+n \neq x$ なので固定部分群はすべて自明であり、商空間は $\mathbb{R}/\mathbb{Z} \cong S^1$ という滑らかな多様体となる。周期的境界条件を課すことは、この商をとることに他ならない。

■例：複素射影空間と Hopf 束　$\mathbb{C}^\times = \mathbb{C}\setminus\{0\}$ を $\lambda\cdot z = \lambda z$ によって $\mathbb{C}^{n+1}\setminus\{0\}$ に作用させると、商空間は複素射影空間 $\mathbb{CP}^n = (\mathbb{C}^{n+1}\setminus\{0\})/\mathbb{C}^\times$ である。$|z|=1$ と正規化すれば、同じ空間は $S^{2n+1}/U(1)$ とも表される。$n=1$ の場合 $S^3/U(1) \cong \mathbb{CP}^1 \cong S^2$ であり、射影 $S^3 \to S^2$ は **Hopf 束**と呼ばれる。これは第 4 章で扱う Dirac モノポール（磁荷 $n=1$）の主 $U(1)$ 束そのものである。

2.3　良い商空間が得られる条件：自由かつ固有な作用

任意の群作用に対して、商空間 M/G が良い幾何学的性質（滑らかな多様体の構造やハウスドルフ性）を持つとは限らない。実際、平面の回転の例では商に境界が現れた。本節では、商空間が滑らかな多様体となるための条件を定式化する。

Definition 2.3.1: 自由な作用・固有な作用

1. 作用が**自由（free）**であるとは、すべての $x \in M$ に対して $g\cdot x = x \implies g = e$ が成り立つこと、すなわちすべての固定部分群が自明（$G_x = \{e\}$）であることをいう。
2. 写像 $\Psi : G\times M \to M\times M$ を $\Psi(g,x) = (g\cdot x, x)$ で定める。Ψ が**固有写像**（コンパクト集合の逆像が常にコンパクト）であるとき、作用は**固有（proper）**であるという。

軌道・固定部分群定理より、自由な作用ではすべての軌道 $G\cdot x$ が G と全単射で対応し、すべての軌道が同じ次元 $\dim G$ を持つ。一方、固有性は直感的には「無限遠に逃げていく群の元 $g_n \to \infty$ が、点を有限の領域に留め続けることはない」ことを意味する。

固有性はしばしば自動的に満たされる。実際、G がコンパクトならば、任意の連続な作用は固有である。

証明. $K \subset M\times M$ をコンパクトとし、K_2 をその第 2 成分への射影とする。$\Psi^{-1}(K)$ は

Ψ の連続性から閉集合であり、コンパクト集合 $G \times K_2$ に含まれる。コンパクト集合の閉部分集合はコンパクトである。 □

固有性が重要なのは、それが商空間のハウスドルフ性を保証するからである。すなわち、M がハウスドルフかつ局所コンパクトで作用が固有ならば、商空間 M/G はハウスドルフである。

証明の概略. 固有写像は局所コンパクト・ハウスドルフ空間の間では閉写像なので、「同じ軌道に属する点の組」の集合 $R = \Psi(G \times M) \subset M \times M$ は閉集合となる。π が開写像であることと合わせると、$[x] \neq [y]$ ならば $(x, y) \notin R$ の近傍 $U \times V$ で R と交わらないものがとれ、$\pi(U)$ と $\pi(V)$ が $[x], [y]$ を分離する。 □

固有性はハウスドルフ性の十分条件であって必要条件ではないが、実際上は「商が健全な空間になるための標準的な条件」として用いられる。自由性と固有性を組み合わせると、次の基本定理が得られる。

Theorem 2.3.1: 商多様体定理

滑らかな多様体 M にリー群 G が滑らかに、**自由かつ固有**に作用しているとする。このとき次が成り立つ。

1. M/G には、射影 π が滑らかな沈め込み（submersion）となるような滑らかな多様体の構造がただ一つ存在する。
2. $\dim(M/G) = \dim M - \dim G$。
3. $\pi : M \to M/G$ は主 G 束である。

証明は、各軌道に横断的な部分多様体（スライス）を構成し、それを M/G の局所座標として用いることで行われる（例えば J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, Thm. 21.10）。

前節の例に当てはめてみよう。$\mathbb{Z} \curvearrowright \mathbb{R}$ は自由で、離散群の平行移動なので固有であり、$\dim S^1 = 1 - 0 = 1$ を与える。$U(1) \curvearrowright S^{2n+1}$ は、$U(1)$ がコンパクトなので固有、また $|z| = 1$ では $e^{i\theta} z = z \Rightarrow e^{i\theta} = 1$ なので自由であり、$\dim \mathbb{CP}^n = (2n+1) - 1 = 2n$ を与える。一方、$U(1) \curvearrowright \mathbb{C}$ は固有だが原点で自由でなく、実際に商 $[0, \infty)$ は境界のない多様体にはならない。

次の 2 つの例は、逆に固有性が失われると、たとえ自由であっても商空間がハウスドルフ性を失うことを示している。

■例：無理数回転（自由だが固有でない作用）　トーラス $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ に、$\alpha \notin \mathbb{Q}$ として $\mathbb{R}$ を

$$t \cdot (\theta_1, \theta_2) = (\theta_1 + t,\ \theta_2 + \alpha t) \tag{2.7}$$

で作用させる。この作用は自由であるが、各軌道は T^2 内で稠密である（Kronecker の定理）。すると空でない不変な開集合は T^2 全体しかなく、$T^2/\mathbb{R}$ の開集合は $\emptyset$ と全体のみとなって、ハウスドルフ性が完全に失われる。

【注】 自由性：$t \cdot \theta = \theta$（$\mathbb{Z}^2$ を法として）ならば $t \in \mathbb{Z}$ かつ $\alpha t \in \mathbb{Z}$ である。$t \neq 0$ なら $\alpha = (\alpha t)/t \in \mathbb{Q}$ となって矛盾するので、$t = 0$。

固有でないこと：$\{n\alpha\}$（小数部分）は $[0,1)$ で稠密なので、整数列 $t_n \to \infty$ で $t_n\alpha \to 0 \pmod 1$ となるものがとれる。このとき $t_n \cdot \theta \to \theta$ であり、$\Psi^{-1}(\{(\theta,\theta)\}$ の小さなコンパクト近傍) は非有界な t_n を含むのでコンパクトでない。

■例：双曲的スケーリング（固有でない作用）　$\mathbb{R}_{>0}$ を $t\cdot(x,y) = (tx,\ t^{-1}y)$ によって $\mathbb{R}^2$ に作用させる。軌道は、双曲線 $xy = c$（$c \neq 0$）の各分枝、4 本の開半軸（例えば $\{x > 0, y = 0\}$）、原点の 3 種類に分類される。このとき、商空間において半軸 $\{x > 0, y = 0\}$ の軌道と $\{x = 0, y > 0\}$ の軌道は開集合で分離できず、さらに原点の軌道はすべての軌道の閉包に含まれる。このような非ハウスドルフ性は、複素化されたゲージ群による商（第 6 章の GIT 商）において典型的に現れ、「安定な点」だけを残すことで解消される。

【注】 点列 $p_n = (1, 1/n)$ をとると $p_n \to (1,0)$ である。一方、$t_n = 1/n$ に対して

$$t_n \cdot p_n = \left(\frac{1}{n},\ n\cdot\frac{1}{n}\right) = \left(\frac{1}{n},\ 1\right) \to (0,1)$$

となる。p_n と $t_n\cdot p_n$ は同じ軌道（双曲線 $xy = 1/n$）に属するので、商空間では $[p_n]$ が $[(1,0)]$ と $[(0,1)]$ の両方に収束する。したがってこの 2 点は開集合で分離できない。

【注】 ゲージ理論の $\mathcal{G} \curvearrowright \mathcal{A}$ は無限次元であるため、商多様体定理をそのまま適用することはできず、Sobolev 空間による完備化が必要となる。また、G の中心に値をとる定数ゲージ変換はすべての接続を固定するので、作用は決して自由ではない。そこで、中心で割った群（あるいは 1 点での値を e に固定した基点付きゲージ群 $\mathcal{G}_0$）を用い、固定部分群が最小となる**既約接続**の空間 $\mathcal{A}^*$ に制限すると、$\mathcal{A}^*/\mathcal{G}$ は無限次元の（Banach）多様体となり、$\mathcal{A}^* \to \mathcal{A}^*/\mathcal{G}$ は主束となる。可約接続で何が起きるかは第 3 章で調べる。

2.4　固定部分群と商空間の特異点（オービフォールド）

物理的に興味深い多くの系では、群の作用は必ずしも自由ではない。固定部分群が自明でない点が存在すると、商空間 M/G は通常の意味での滑らかな多様体とはならず、その点に特異点が生じる。本節では、固定部分群が**有限群**である場合を扱う。

典型的な状況は、離散群 Γ が多様体 M に**真性不連続**に作用している場合である。これは、各点 $x \in M$ が近傍 U を持ち、$\{\gamma \in \Gamma \mid \gamma U \cap U \neq \emptyset\}$ が有限集合となることをいい、離散群に対しては固有な作用であることと同値である。このとき各点の固定部分群 Γ_x は有限群となる。このような商の局所的なモデルを与えるのが、次のオービフォールドの概念である。

Definition 2.4.1: オービフォールド（略式）

ハウスドルフ空間 X が n 次元の**オービフォールド**であるとは、各点 $p \in X$ が、ある有限群 $\Gamma_p \subset GL(n,\mathbb{R})$ に対する $\mathbb{R}^n/\Gamma_p$ と同相な近傍を持ち、これらの局所モデルが滑らかに貼り合わされていることをいう。$\Gamma_p \neq \{e\}$ である点を**オービフォールド特異点**、Γ_p をその**局所群**と呼ぶ。

Theorem 2.4.1: 有限な固定部分群を持つ商

離散群 Γ が n 次元多様体 M に滑らかかつ真性不連続に作用しているとする。このとき M/Γ はオービフォールドであり、点 $[x]$ の局所群は固定部分群 Γ_x（x における接空間 $T_xM \cong \mathbb{R}^n$ への線形作用）で与えられる。特に、$\Gamma_x = \{e\}$ となる点の近傍では M/Γ は滑らかな多様体である。

より一般に、リー群 G が固有に作用する場合も**スライス定理**により、軌道 $G\cdot x$ の近傍で M/G は局所的に S/G_x（S は軌道に横断的なスライス）と表される。G_x が有限群ならオービフォールド特異点、連続群なら錐のようなより深刻な特異点が現れる（後者は第 3 章で扱う）。

■例：錐 $\mathbb{C}/\mathbb{Z}_n$　$\zeta = e^{2\pi i/n}$ とし、$\mathbb{Z}_n = \{\zeta^k\}$ を $z \mapsto \zeta z$ によって $\mathbb{C}$ に作用させる。固定点は原点のみで、$\Gamma_0 = \mathbb{Z}_n$、それ以外の点の固定部分群は自明である。基本領域として扇形 $0 \le \arg z < 2\pi/n$ をとり、その 2 辺を貼り合わせると、商は頂角 $2\pi/n$ の**円錐**となる。

興味深いのは、位相空間としては $w = z^n$ によって $\mathbb{C}/\mathbb{Z}_n \cong \mathbb{C}$ と同相であり、特異点が見えないことである。しかし平坦な計量 $|dz|^2$ を商に降ろすと、原点のまわりを 1 周したときの角度が 2π ではなく $2\pi/n$ となり、原点に曲率が集中した円錐特異点となる。オービフォールドの構造（局所群 $\mathbb{Z}_n$）は、位相だけでは見えないこの情報を記憶している。

■例：トーラスのモジュライ空間　第 1 章のトーラスのモジュライ $\mathcal{M}_1 = \mathbb{H}/SL(2,\mathbb{Z})$ を考えよう。$-1 \in SL(2,\mathbb{Z})$ は $\tau \mapsto \tau$ と自明に作用するので、実効的に作用するのは $PSL(2,\mathbb{Z}) = SL(2,\mathbb{Z})/\{\pm 1\}$ であり、これは

$$S : \tau \mapsto -\frac{1}{\tau}, \qquad T : \tau \mapsto \tau + 1 \tag{2.8}$$

で生成され、$\mathbb{H}$ に真性不連続に作用する。固定部分群を計算すると、$\tau = i$ では $\mathbb{Z}_2 = \langle S\rangle$、$\tau = e^{i\pi/3}$（およびそれと同じ軌道の $e^{2\pi i/3}$）では $\mathbb{Z}_3$ であり、それ以外の点（基本領域の内部）では自明である。

【注】 $\tau = i : S(i) = -1/i = i$ であり、$PSL(2,\mathbb{Z})$ において $S^2 = 1$ なので、固定部分群は $\langle S\rangle \cong \mathbb{Z}_2$。
$\tau = \omega = e^{2\pi i/3} : 1 + \omega + \omega^2 = 0$ より $\omega + 1 = -\omega^2$ なので、

$$ST(\omega) = S(\omega+1) = -\frac{1}{\omega+1} = \frac{1}{\omega^2} = \omega$$

である。$(ST)^3 = 1$ より固定部分群は $\langle ST\rangle \cong \mathbb{Z}_3$。$e^{i\pi/3} = \omega + 1 = T(\omega)$ は ω と同じ軌道に属するので、その固定部分群は共役な $T\langle ST\rangle T^{-1} \cong \mathbb{Z}_3$ である（軌道・固定部分群定理の (3)）。
$SL(2,\mathbb{Z})$ の中で数えれば、-1 を含めてそれぞれ位数 4 と位数 6 の巡回群となる。

したがって定理より、$\mathcal{M}_1$ は $\tau = i$ に頂角 π、$\tau = e^{i\pi/3}$ に頂角 $2\pi/3$ の円錐特異点を持つオービフォールドである。これは基本領域 $\{|\tau| \ge 1,\ |\mathrm{Re}\,\tau| \le 1/2\}$ の境界を貼り合わせたときに、$\tau = i$ では円弧が折り返されて角度 π、2 つの角 $e^{i\pi/3}, e^{2\pi i/3}$（それぞれ内角 $\pi/3$）が貼り合わされて角度 $2\pi/3$ となることと一致している。

■例：$T^2/\mathbb{Z}_2$（枕カバー）　トーラス $T^2 = \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$ に $\mathbb{Z}_2$ を $z \mapsto -z$ で作用させる。固定点は $-z \equiv z$、すなわち $2z \in \mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z}$ を満たす点であり、

$$z = 0, \quad \frac{1}{2}, \quad \frac{\tau}{2}, \quad \frac{1+\tau}{2} \tag{2.9}$$

の 4 点である。それぞれ局所群 $\mathbb{Z}_2$（頂角 π の円錐点）を持ち、商は位相的には球面 S^2 で、平坦な計量を持つ「4 つの角を持つ枕」の形をしている。

【注】 この結果の整合性を Gauss–Bonnet の定理で確かめよう。平坦な曲面の全曲率は円錐点の角度欠損 $2\pi - (\text{頂角})$ の和で与えられ、

$$\sum_{\text{円錐点}} (2\pi - \pi) = 4\pi = 2\pi\chi(S^2)$$

となって、確かに球面の Euler 数 $\chi = 2$ と一致する。

より一般に、オービフォールドには**オービフォールド Euler 数**

$$\chi^{\mathrm{orb}}(X) = \chi(X) - \sum_{p} \left(1 - \frac{1}{|\Gamma_p|}\right)$$

が定義され、有限群 Γ による商では $\chi^{\mathrm{orb}}(M/\Gamma) = \chi(M)/|\Gamma|$ が成り立つ。枕カバーでは $2 - 4 \cdot \frac{1}{2} = 0 = \chi(T^2)/2$ である。トーラスのモジュライ空間に適用すると、カスプを除いた下部空間は $\mathbb{C}$（$\chi = 1$）なので

$$\chi^{\mathrm{orb}}(\mathbb{H}/PSL(2,\mathbb{Z})) = 1 - \left(1 - \frac{1}{2}\right) - \left(1 - \frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{6}$$

となり、すべての点に共通する自己同型 -1（$z \mapsto -z$）も数えると $\chi^{\mathrm{orb}}(\mathcal{M}_{1,1}) = -\frac{1}{12} = \zeta(-1)$ を得る（Harer–Zagier）。

【注】 超弦理論の余剰次元のコンパクト化において、このオービフォールド特異点は極めて重要な物理的役割を果たす。時空を有限群の作用で割ったオービフォールド（例えば $T^2/\mathbb{Z}_2$ や $\mathbb{C}^2/\mathbb{Z}_2$）を考えると、固定点のまわりを回る閉弦の境界条件として「ねじれたセクター（twisted sector）」が許容される。これにより、特異点上に質量ゼロの新しい粒子が局所的に出現し、低エネルギーでのゲージ対称性の拡大や対称性の破れなどを決定づける。このような特異点を含む空間上の幾何学や場の理論を矛盾なく扱うための強力な枠組みが、後の章で扱う「モジュライスタック」である。

2.5　大域的な障害：Gribov 問題と大域的定義の困難

前節までは局所的な特異点の問題であったが、商空間を構成する際には大域的なトポロジーの障害も立ちはだかる。局所的なゲージ固定条件を導入してモジュライ空間 $\mathcal{A}/\mathcal{G}$ を構成しようとするとき、数学的に深刻な大域的障害に直面することがある。これが**Gribov 問題（Gribov ambiguity）**である。

写像 $F : \mathcal{A} \to V$（V はベクトル空間）による条件 $F(A) = 0$ を**ゲージ固定条件**という。理想的には、零点集合 $F^{-1}(0)$ が各ゲージ軌道とちょうど 1 点で横断的に交わり、各軌道 $[A]$ にその交点を対応させる写像 $s : \mathcal{A}/\mathcal{G} \to \mathcal{A}$ が連続になることが望ましい。このような s（$\pi \circ s = \mathrm{id}$ を満たす連続写像）は、主束 $\pi : \mathcal{A} \to \mathcal{A}/\mathcal{G}$ の**大域的切断**に他ならない。これに対し、同一のゲージ軌道上の異なる 2 点 $A \neq A^U$ がともにゲージ固定条件を満たすとき、これらを互いの **Gribov コピー**と呼ぶ。

■例：有限次元の玩具模型　$SO(2)$ を回転によって $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ に作用させる。軌道は原点を中心とする円周であり、商は動径 $r > 0$ で完全に記述される。ここに「ゲージ固定条件」$F(x, y) = y = 0$ を課すと、半径 r の軌道は $y = 0$ と $(r, 0)$、$(-r, 0)$ の **2 点**で交わり、これらは互いに Gribov コピーとなる。さらに、2 つのコピーでは Faddeev–Popov 行列式の符号が逆になり、絶対値をとらずに Faddeev–Popov の処方を適用すると、「軌道の体積で割る」ための規格化因子がちょうどゼロになってしまう。条件 $\Delta_{\mathrm{FP}} > 0$（すなわち $x > 0$）に制限すれば、各軌道との交点はちょうど 1 つになる。これが **Gribov 領域**への制限の玩具版である。

【注】 点 $(r, 0)$ を角度 θ だけ回転させると $F(\theta) = r \sin\theta$ であり、その零点は $\theta = 0, \pi$ である。Faddeev–Popov 行列式（今は 1×1）は

$$\Delta_{\mathrm{FP}} = \left.\frac{\partial F}{\partial \theta}\right|_{\text{零点}} = r\cos\theta = \begin{cases} +r & (\theta = 0) \\ -r & (\theta = \pi) \end{cases}$$

となる。絶対値をとらずに Faddeev–Popov の恒等式を用いると

$$\int_0^{2\pi} d\theta\, \delta(F(\theta))\, \frac{\partial F}{\partial \theta} = \sum_{\text{零点}} \mathrm{sign}\left(\frac{\partial F}{\partial \theta}\right) = (+1) + (-1) = 0$$

となり、規格化因子が消える。一方、$x > 0$ に制限すれば零点は $\theta = 0$ のみとなり、値は 1 に戻る。

■例：Coulomb ゲージの無限小 Gribov コピー　Coulomb（Landau）ゲージ $\partial^\mu A_\mu = 0$ を考える。A に無限小ゲージ変換を施したものが再びゲージ条件を満たすための条件は、Faddeev–Popov 演算子

$$\mathcal{M}_{\mathrm{FP}} = -\partial^\mu D_\mu, \qquad D_\mu \epsilon \equiv \partial_\mu \epsilon - ig[A_\mu, \epsilon] \tag{2.10}$$

が零モードを持つことと同値である。可換な場合（$U(1)$）は $\mathcal{M}_{\mathrm{FP}} = -\partial^2$ であり、無限遠で減衰する零モードは存在しないので、無限小の Gribov コピーはない。一方、非可換な場合は A に依存する項のため、A が十分大きくなると $\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}$ の最低固有値がゼロに達し、無限小の Gribov コピーが現れる。$\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}$ が初めて零モードを持つ境界を **Gribov 地平線**、その内側 $\Omega = \{A \mid \partial \cdot A = 0,\ \mathcal{M}_{\mathrm{FP}} > 0\}$ を **Gribov 領域**と呼ぶ。

【注】 無限小ゲージ変換 $U = e^{ig\epsilon} \simeq 1 + ig\epsilon$ を式 (2.1) に代入すると、

$$UA_\mu U^{-1} \simeq A_\mu + ig[\epsilon, A_\mu],$$
$$-\frac{i}{g}(\partial_\mu U)U^{-1} \simeq -\frac{i}{g}(ig\,\partial_\mu \epsilon) = \partial_\mu \epsilon$$

より

$$\delta A_\mu = \partial_\mu \epsilon + ig[\epsilon, A_\mu] = \partial_\mu \epsilon - ig[A_\mu, \epsilon] = D_\mu \epsilon$$

を得る。$\partial^\mu A_\mu = 0$ を満たす A に対して、変換後も $\partial^\mu(A_\mu + \delta A_\mu) = 0$ となる条件は $\partial^\mu D_\mu \epsilon = 0$、すなわち $\mathcal{M}_{\mathrm{FP}}\,\epsilon = 0$ である。

玩具模型では Gribov 領域への制限によって問題が解消したが、次の定理は、非可換ゲージ理論ではそもそも大域的切断が存在しないことを示している。

Theorem 2.5.1: Singer, 1978

$M = S^4$（あるいは S^3）、$G = SU(N)$（$N \geq 2$）とする。既約接続の空間 $\mathcal{A}^*$ と基点付きゲージ群 $\mathcal{G}_0$ に対し、主束 $\mathcal{A}^* \to \mathcal{A}^*/\mathcal{G}_0$ は自明ではない。特に、連続な大域的ゲージ固定（大域的切断）は存在しない。

証明の概略. 主束が自明ならば $\mathcal{A}^* \simeq (\mathcal{A}^*/\mathcal{G}_0) \times \mathcal{G}_0$ であり、$\mathcal{G}_0$ のホモトピー群は $\mathcal{A}^*$ のホモトピー群の直和因子となる。$\mathcal{A}$ はアフィン空間（可縮）であり、$\mathcal{A}^*$ はそこから「無限余次元」の部分集合を除いたものなので、すべてのホモトピー群が自明である。一方、S^4 上の基点付きゲージ群は $\pi_k(\mathcal{G}_0) \cong \pi_{k+4}(G)$ を満たし、例えば $G = SU(2) \cong S^3$ に対して

$$\pi_1(\mathcal{G}_0) \cong \pi_5(S^3) \cong \mathbb{Z}_2 \neq 0$$

である。これは矛盾である。 □

【注】 Gribov コピーの存在は、Faddeev–Popov の処方が摂動論的な枠組み（微小なゲージ変換の範囲）でのみ有効であり、非摂動領域では破綻することを示唆している。経路積分において Gribov 領域に積分を制限する試み（Gribov–Zwanziger の処方）などが行われているが、Singer の定理が示すように、モジュライ空間は単純な商空間 M/G として一つの座標系で大域的に書き表すことができない。このことは、複数のパッチによる貼り合わせの構造や、スタックとしての定式化が必要であることを数学的に意味している。

2.6　まとめと次章への展望

本章では、物理的冗長性としてのゲージ対称性を割り引き、真の自由度を抽出する操作が「群作用による商空間の構成」に他ならないことを見た。群作用の性質と商空間の性質の対応は、次のようにまとめられる。

- **自由かつ固有**な作用 $\Rightarrow$ M/G は滑らかな多様体で、$M \to M/G$ は主 G 束（定理 2.3.1）。
- 固有で、固定部分群が**有限群** $\Rightarrow$ M/G はオービフォールド（定理 2.4.1。錐やトーラスのモジュライ空間）。
- 固定部分群が**連続群** $\Rightarrow$ 境界や錐のような、より深刻な特異点（平面の回転の例、第 3 章）。
- **固有でない**作用 $\Rightarrow$ M/G はハウスドルフ性を失いうる（無理数回転、双曲的スケーリング、第 6 章の GIT 商）。
- 局所的には良い商でも、**大域的切断が存在しない**ことがある $\Rightarrow$ Gribov 問題（Singer の定理）。

次章では、モジュライ空間の局所的な形状や次元を決定づける**接空間・特異点・次元**の解析手法、およびそれを変形理論とコホモロジー群の言葉でどのように定式化するかについて詳しく見ていく。

第 3 章

接空間・特異点・次元：モジュライの自由度を理解する

モジュライ空間の大域的な構造（トポロジーや特異点）を完全に理解することは一般に困難であるが、ある解の近傍における局所的な構造は、線形化された方程式とコホモロジー理論を用いて系統的に調べることができる。本章では、モジュライ空間の接空間がどのように定義され、物理的な「零モード（ゼロ・モード）」とどのように対応するのかを、ゲージ理論および複素幾何学の変形理論（小平・スペンサー理論）を題材に詳細に解説する。

3.1　零モードと集団座標：接空間はなぜ物理的に重要か

経路積分において、ある古典解 ϕ_{cl} のまわりでの半古典近似を考えよう。場を $\phi = \phi_{\mathrm{cl}} + \delta\phi$ と分けて作用を展開すると、古典解は停留点であるから 1 次の項は消え、

$$S[\phi_{\mathrm{cl}} + \delta\phi] = S[\phi_{\mathrm{cl}}] + \frac{1}{2}\int d^d x\, \delta\phi\, \Delta\, \delta\phi + \mathcal{O}(\delta\phi^3) \tag{3.1}$$

となる。ここで $\Delta = \left.\frac{\delta^2 S}{\delta\phi\,\delta\phi}\right|_{\phi_{\mathrm{cl}}}$ は 2 次の揺らぎ演算子（Hessian）である。Δ の固有値がすべて正であれば、Gauss 積分により

$$Z \simeq e^{-S[\phi_{\mathrm{cl}}]}\,(\det \Delta)^{-1/2} \tag{3.2}$$

を得る。

しかし、古典解が連続族 $\phi_{\mathrm{cl}}(x; m^1, \dots, m^n)$ をなす場合、パラメータ m^i に関する微分

$$\delta_i \phi \equiv \frac{\partial \phi_{\mathrm{cl}}}{\partial m^i} \tag{3.3}$$

は $\Delta\, \delta_i\phi = 0$ を満たす固有値ゼロの固有関数、すなわち**零モード**となる。

【注】 すべての m に対して運動方程式 $\left.\frac{\delta S}{\delta \phi}\right|_{\phi_{\mathrm{cl}}(m)} = 0$ が成り立つ。これを m^i で微分すると

$$0 = \frac{\partial}{\partial m^i}\left.\frac{\delta S}{\delta \phi(x)}\right|_{\phi_{\mathrm{cl}}(m)} = \int d^d y\, \left.\frac{\delta^2 S}{\delta\phi(x)\delta\phi(y)}\right|_{\phi_{\mathrm{cl}}} \frac{\partial \phi_{\mathrm{cl}}(y)}{\partial m^i} = (\Delta\, \delta_i\phi)(x) \tag{3.4}$$

となり、$\delta_i\phi$ が零モードであることが分かる。逆に言えば、零モードとは「線形化された運動方程式の解」であり、これはまさに解の空間の接ベクトルである。

零モード方向では作用が変化しないため、その方向の Gauss 積分は発散し、$(\det\Delta)^{-1/2}$ は意味を失う。正しい処方は、零モード方向の積分をモジュライ・パラメータ（**集団座標**

(collective coordinates)）m^i の積分に置き換えることである。

$$Z \simeq \int_{\mathcal{M}} \prod_{i=1}^{n} \frac{dm^i}{\sqrt{2\pi}} \sqrt{\det g_{ij}(m)}\, e^{-S[\phi_{\rm cl}]} \left(\det{}' \Delta\right)^{-1/2} \tag{3.5}$$

ここで $\det'$ は零固有値を除いた行列式であり、

$$g_{ij}(m) = \int d^d x\, \delta_i\phi\, \delta_j\phi \tag{3.6}$$

は零モードの内積から定まるモジュライ空間上の自然な計量（変数変換の Jacobian）である。

このように、半古典的な経路積分は「モジュライ空間 $\mathcal{M}$ 上の有限次元積分」に帰着する。したがって次の対応がある。

- モジュライ空間の**次元**は、零モード（集団座標）の数を与える。
- モジュライ空間の**計量**は、集団座標の積分測度を与える。
- モジュライ空間の**特異点や非コンパクト性**は、積分の発散や境界からの寄与として物理に現れる。

ただしゲージ理論では、ゲージ変換によって生成される Δ の零固有値（ゲージ零モード）は物理的な零モードではなく、ゲージ固定によって除去しなければならない。この「物理的零モード」と「ゲージ零モード」の分離を正確に行う道具が、以下で導入する変形複体とそのコホモロジーである。

3.2　ゲージ接続のモジュライと楕円型複体

多様体 M 上の主 G 束 P におけるゲージ接続の空間 $\mathcal{A}$ を考え、ゲージ群 $\mathcal{G}$ の作用による商空間としてモジュライ空間 $\mathcal{M} = \mathcal{A}/\mathcal{G}$ を定義した。ある特定の接続 $A \in \mathcal{A}$ が与えられたとき、モジュライ空間上の点 $[A] \in \mathcal{M}$ における接空間 $T_{[A]}\mathcal{M}$ はどのように記述されるだろうか。

接ベクトルとは、「物理的に等価でない無限小変形」のことである。接続の微小変形 $A \to A + \delta A$ を考える。接続空間 $\mathcal{A}$ はアフィン空間であるため、二つの接続の差 δA は M 上の $\mathrm{ad}(P)$ に値をとる 1 次微分形式（$\delta A \in \Omega^1(M, \mathrm{ad}(P))$）となる。

ここで、我々が興味を持つのは、運動方程式（例えば反自己双対方程式 $F^+ = 0$ や平坦接続 $F = 0$）を満たす解のモジュライである。簡単のため、平坦接続のモジュライを例にとる。

【注】 平坦条件 $F(A) = 0$ が変形後も保たれる条件を導出する。曲率の定義 $F(A) = dA + A \wedge A$ に対し、$A \to A + \delta A$ を代入すると、

$$\begin{aligned} F(A + \delta A) &= d(A + \delta A) + (A + \delta A) \wedge (A + \delta A) \\ &= dA + d(\delta A) + A \wedge A + A \wedge \delta A + \delta A \wedge A + \delta A \wedge \delta A \\ &= F(A) + d(\delta A) + [A, \delta A] + \mathcal{O}(\delta A^2) \end{aligned}$$

となる。ここで、リー代数に値をとる微分形式の交換子関係 $[\alpha, \beta] = \alpha \wedge \beta - (-1)^{|\alpha||\beta|} \beta \wedge \alpha$ を用いた。バックグラウンドが $F(A) = 0$ を満たすとし、無限小変形の一次のオーダーを取り出すと、

$$d_A(\delta A) \equiv d(\delta A) + [A, \delta A] = 0 \tag{3.7}$$

が得られる。すなわち、変形 δA は共変外微分 $d_A : \Omega^1 \to \Omega^2$ の核（kernel）に属さなければならない。

しかし、方程式 $d_A(\delta A) = 0$ を満たす変形の中には、単なるゲージ変換による物理的に自明な変形が含まれている。無限小ゲージパラメータ $\epsilon \in \Omega^0(M, \mathrm{ad}(P))$ による変換を考えよう。

【注】 有限ゲージ変換は $A \to A^U = U^{-1}AU + U^{-1}dU$ で与えられる（本講義の規約に合わせる）。$U = e^{\epsilon} \simeq 1 + \epsilon$ と展開すると、

$$\begin{aligned} A^{1+\epsilon} &= (1-\epsilon)A(1+\epsilon) + (1-\epsilon)d(1+\epsilon) + \mathcal{O}(\epsilon^2) \\ &= A - \epsilon A + A\epsilon + d\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2) \\ &= A + d\epsilon + [A, \epsilon] = A + d_A\epsilon \end{aligned}$$

したがって、ゲージ変換による純粋な冗長性は $\delta_{gauge}A = d_A\epsilon$ と書ける。これは共変外微分 $d_A : \Omega^0 \to \Omega^1$ の像（image）である。

以上より、真の物理的自由度（モジュライ空間の接空間）は、「線形化された方程式を満たす変形」を「ゲージ変換による冗長性」で割った空間として与えられる。これを定理の形でまとめておこう。

Theorem 3.2.1: 平坦接続のモジュライの接空間

A を平坦接続とし、平坦接続のモジュライ空間 $\mathcal{M}$ が点 $[A]$ の近傍で滑らかであるとする。このとき

$$T_{[A]}\mathcal{M} \cong H^1(M, d_A) = \frac{\ker(d_A : \Omega^1 \to \Omega^2)}{\mathrm{im}(d_A : \Omega^0 \to \Omega^1)}$$

が成り立つ。（滑らかであるための十分条件は、3.4 節で見るように $H^0 = H^2 = 0$ である。）

このコホモロジーの各元が、経路積分における「ゲージ不変な零モード」に 1 対 1 対応する。

3.2.1　変形複体と Hodge 理論によるゲージ固定

上の構成は、次の微分形式の系列としてまとめることができる。

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M, \mathrm{ad}P) \xrightarrow{d_A} \Omega^1(M, \mathrm{ad}P) \xrightarrow{d_A} \Omega^2(M, \mathrm{ad}P) \xrightarrow{d_A} \cdots \tag{3.8}$$

左の矢印は無限小ゲージ変換、右の矢印は線形化された平坦条件を表す。

Definition 3.2.1: 変形複体とそのコホモロジー

平坦接続 A に対し、上の系列を A の**変形複体**と呼び、そのコホモロジー

$$H^i(M, d_A) = \frac{\ker(d_A : \Omega^i(M, \mathrm{ad}P) \to \Omega^{i+1}(M, \mathrm{ad}P))}{\mathrm{im}(d_A : \Omega^{i-1}(M, \mathrm{ad}P) \to \Omega^i(M, \mathrm{ad}P))}$$

を定める（$\Omega^{-1} = 0$ とする）。H^0 は**無限小自己同型**、H^1 は**無限小変形**、H^2 は**変形の障害**の空間と解釈される（3.4 節）。

これが複体（$d_A \circ d_A = 0$）をなすことは、背景が平坦であることと同値である。

【注】 $\epsilon \in \Omega^0(M, \mathrm{ad}P)$ に d_A を 2 回作用させる。A が 1 次形式であることに注意して $d[A, \epsilon] = [dA, \epsilon] -$

$[A, d\epsilon]$ を用いると、

$$\begin{aligned} d_A d_A \epsilon &= d(d\epsilon + [A,\epsilon]) + [A, d\epsilon + [A,\epsilon]] \\ &= [dA,\epsilon] - [A, d\epsilon] + [A, d\epsilon] + [A,[A,\epsilon]] \\ &= [dA,\epsilon] + [A\wedge A,\epsilon] = [F,\epsilon] \end{aligned}$$

ここで次数付き Jacobi 恒等式より $[A,[A,\epsilon]] = \frac{1}{2}[[A,A],\epsilon] = [A\wedge A,\epsilon]$ を用いた。したがって $d_A^2 = [F,\cdot]$ であり、$F=0$ のときに限り複体となる。一般の p 形式に対しても同様に $d_A^2\alpha = [F,\alpha]$ が成り立つ。

商空間 $\ker d_A/\mathrm{im}\, d_A$ を具体的に扱うには、各同値類から代表元を 1 つ選ぶ（ゲージ固定する）必要がある。M 上に Riemann 計量を、$\mathrm{ad}P$ 上に不変内積（例えば $-\mathrm{Tr}$）を入れ、d_A の形式的随伴 d_A^* を定義しよう。変形 δA がゲージ軌道に直交するという条件

$$\langle d_A\epsilon, \delta A\rangle = \langle \epsilon, d_A^*\delta A\rangle = 0 \quad (\forall \epsilon) \iff d_A^*\delta A = 0 \tag{3.9}$$

は、背景場 Lorenz ゲージ $D^\mu \delta A_\mu = 0$ に他ならない。これを線形化方程式と組み合わせた

$$d_A\delta A = 0, \qquad d_A^*\delta A = 0 \tag{3.10}$$

は楕円型の連立方程式である。楕円型作用素に対する一般論から、次が成り立つ。

Theorem 3.2.2: Hodge 分解と有限次元性

M をコンパクトな Riemann 多様体、A を平坦接続とする。このとき

1. 各コホモロジー類はただ 1 つの調和代表元を持つ：

$$H^1(M, d_A) \cong \mathcal{H}^1_A \equiv \{\delta A \in \Omega^1(M,\mathrm{ad}P) \mid d_A\delta A = d_A^*\delta A = 0\}$$

2. $\mathcal{H}^1_A$（したがって $H^1(M,d_A)$）は**有限次元**である。

無限次元の空間 $\mathcal{A}$ を無限次元の群 $\mathcal{G}$ で割ったにもかかわらずモジュライ空間が有限次元となるのは、このためである。

【注】 物理的には、ゲージ直交条件 $d_A^*\delta A = 0$ を課した零モードが「物理的零モード」であり、$\mathrm{im}\, d_A$ に属する零モードは前節で述べた「ゲージ零モード」である。Hodge 分解

$$\Omega^1(M,\mathrm{ad}P) = \mathrm{im}\, d_A \oplus \mathcal{H}^1_A \oplus \mathrm{im}\, d_A^* \tag{3.11}$$

において、第 1 項がゲージ方向、第 2 項がモジュライ方向、第 3 項が作用を実際に増加させる（質量を持つ）揺らぎに対応する。前節の計量 g_{ij} は、ゲージ固定された零モードの L^2 内積

$$g(\delta_1 A, \delta_2 A) = -\int_M \mathrm{Tr}(\delta_1 A \wedge *\delta_2 A) \tag{3.12}$$

として与えられる。

3.2.2　例：トーラス上の平坦 $U(1)$ 接続と Wilson ライン

最も簡単な例として、n 次元トーラス T^n（座標 $x^i \sim x^i + 2\pi$）上の $U(1)$ 平坦接続を考える。$U(1)$ の場合 $A = ia$（a は実 1 次形式）と書けて交換子は消えるので、$d_A = d$ であり、変形複体は de Rham 複体そのものになる。したがって

$$T_{[A]}\mathcal{M} \cong H^1_{\mathrm{dR}}(T^n) \cong \mathbb{R}^n \tag{3.13}$$

であり、調和代表元は定数係数の 1 次形式 $a = \theta_i\, dx^i$ である。各サイクルに沿ったホロノミー（Wilson ライン）は

$$W_i = \exp\left(i\oint_{S^1_i} a\right) = e^{2\pi i\theta_i} \tag{3.14}$$

で与えられる。

ここで、$U = e^{im_i x^i}$（$m_i \in \mathbb{Z}$）というゲージ変換を考えると、これは T^n 上で一価な関数であるから正当なゲージ変換であり、$a \to a + m_i\, dx^i$、すなわち $\theta_i \to \theta_i + m_i$ を引き起こす。よって θ_i は周期 1 で同一視され、

$$\mathcal{M}_{\mathrm{flat}}(T^n, U(1)) \cong \mathbb{R}^n/\mathbb{Z}^n \cong T^n \tag{3.15}$$

を得る。一般に平坦接続はホロノミーで完全に決まるので、$\mathcal{M}_{\mathrm{flat}}(M, G) \cong \mathrm{Hom}(\pi_1(M), G)/G$ が成り立つ。

【注】 この例は、モジュライ空間の局所構造（$H^1 \cong \mathbb{R}^n$）と大域構造（T^n）の違いをよく示している。接空間の計算は無限小のゲージ変換 $\mathrm{im}\, d$ による商しか見ないが、大域的には巻き付き数を持つ「大きなゲージ変換」による同一視が加わり、モジュライ空間はコンパクトなトーラスになる。弦理論では、コンパクト化された方向に沿った Wilson ライン θ_i は低エネルギーでスカラー場（モジュライ場）として振る舞い、T 双対性のもとで D ブレーンの位置座標に移る。モジュライ空間として「双対トーラス」が現れるのはこのためである。

3.3　複素幾何における変形理論（小平・スペンサー理論）

モジュライ空間の接空間をコホモロジーで捉える枠組みは、ゲージ理論に限らず、弦理論における余剰次元（Calabi–Yau 多様体など）の分類でも中心的な役割を果たす。多様体の「複素構造」のモジュライ空間を記述する小平・スペンサー（Kodaira-Spencer）理論を概観しよう。

複素多様体 X の複素構造を変形するとは、局所的な正則座標の取り替え方（推移関数）をわずかにずらすこと、あるいは同値な言い方として、概複素構造 J（$J^2 = -1$ を満たすテンソル）を可積分条件を保ちながら変形することに等しい。複素座標 $(z^i, \bar{z}^{\bar{\jmath}})$ において、正則ベクトル束 T_X に値をとる反正則微分形式、すなわち Beltrami 微分 $\mu \in \Omega^{0,1}(X, T_X)$ を導入する。局所的には $\mu = \mu^i_{\bar{\jmath}} \frac{\partial}{\partial z^i} d\bar{z}^{\bar{\jmath}}$ と書ける。

【注】 複素構造を変形するということは、新しい「正則な微分」$\bar{\partial}'$ を定義することである。変形された構造のもとでの反正則微分を $\bar{\partial}' = \bar{\partial} - \mu$ とする。これが正当な複素構造を定義するためには、Newlander-Nirenberg の定理より可積分条件 $(\bar{\partial}')^2 = 0$ を満たさなければならない。

$$\begin{aligned}(\bar{\partial} - \mu)^2 &= \bar{\partial}^2 - \bar{\partial}\mu - \mu\bar{\partial} + \mu \wedge \mu \\ &= -(\bar{\partial}\mu) + \frac{1}{2}[\mu, \mu] = 0\end{aligned}$$

ここで $\bar{\partial}^2 = 0$ を用いた。無限小変形（μ の 1 次のみ）を考える場合、非線形項 $[\mu, \mu]$ を無視できるため、線形化された可積分条件は

$$\bar{\partial}\mu = 0 \tag{3.16}$$

となる。すなわち、μ は $\bar{\partial}$-閉形式でなければならない。

一方で、単なる座標変換（微分同相写像）による複素構造の変化は物理的な変形（モジュライの移動）ではない。複素ベクトル場 $V = V^i \frac{\partial}{\partial z^i}$ に沿った微小な座標変換を行うと、Beltrami 微分は $\delta\mu = \bar{\partial} V$ だけシフトする。したがって、物理的に意味のある複素構造の微小変形は、$\bar{\partial}$-閉である μ を、$\bar{\partial}$-完全である $\bar{\partial} V$ で割った空間の元となる。これはまさに Dolbeault コホモロジー群に他ならない。

Theorem 3.3.1: 小平・スペンサー

X をコンパクト複素多様体とする。X の複素構造の無限小変形は、座標変換による自明な変形を除いて $H^1(X, T_X)$ の元と 1 対 1 に対応する。特に、複素構造のモ

ジュライ空間 $\mathcal{M}_{\mathrm{cx}}$ が $[X]$ の近傍で滑らかならば

$$T_{[X]}\mathcal{M}_{\mathrm{cx}} \cong H^1(X, T_X)$$

であり、$H^0(X, T_X)$ は無限小自己同型（正則ベクトル場）、$H^2(X, T_X)$ は変形の障害を与える。

X が n 次元 Calabi–Yau 多様体の場合には、正則 n 形式 Ω との縮約によって $T_X \cong \Lambda^{n-1}T_X^*$ という同型があるので、

$$T_{[X]}\mathcal{M}_{\mathrm{cx}} \cong H^1(X, T_X) \cong H^{n-1,1}(X) \tag{3.17}$$

となる。超弦理論のコンパクト化において、有効理論に現れるモジュライ・スカラー場の数がこのコホモロジー群の次元 $h^{n-1,1}$ によって与えられるのは、まさにこれが複素構造のモジュライ空間の接空間の次元を表しているからである。

3.3.1　例：トーラスとリーマン面の変形

第 1 章で扱ったトーラス $E_\tau = \mathbb{C}/(\mathbb{Z} + \tau\mathbb{Z})$ に小平・スペンサー理論を適用してみよう。E_τ の接束は自明（大域的なベクトル場 ∂_z が存在し $T_E \cong \mathcal{O}$）であるから、

$$H^0(E, T_E) \cong H^0(E, \mathcal{O}) \cong \mathbb{C}, \qquad H^1(E, T_E) \cong H^{0,1}(E) \cong \mathbb{C} \tag{3.18}$$

となる。H^1 が 1 次元であることは、モジュライ・パラメータが τ ただ 1 つの複素数であることと一致している。

【注】 $\tau \to \tau + \delta\tau$ という変形に対応する Beltrami 微分を求めよう。E_τ 上の座標 z を用いて、

$$w = z + \varepsilon(z - \bar{z}), \qquad \varepsilon = \frac{\delta\tau}{\tau - \bar{\tau}} = \frac{\delta\tau}{2i\,\mathrm{Im}\,\tau} \tag{3.19}$$

とおく。$z \to z+1$ のとき $w \to w+1$、$z \to z+\tau$ のとき $w \to w+\tau+\varepsilon(\tau-\bar{\tau}) = w+(\tau+\delta\tau)$ となるから、w は変形後のトーラス $E_{\tau+\delta\tau}$ の正則座標である。新しい複素構造の正則関数 f は $(\partial_{\bar{z}} - \mu^z{}_{\bar{z}}\,\partial_z)f = 0$ を満たすので、$f = w$ を代入して

$$\mu^z{}_{\bar{z}} = \frac{\partial_{\bar{z}} w}{\partial_z w} = -\frac{\varepsilon}{1+\varepsilon} \simeq -\frac{\delta\tau}{2i\,\mathrm{Im}\,\tau} \tag{3.20}$$

を得る。これは定数であり明らかに $\bar{\partial}\mu = 0$ を満たす。一方、$\mu = \bar{\partial}V$ と書けたとすると、V の周期性から $\int_E \mu^z{}_{\bar{z}}\, d^2z = \int_E \partial_{\bar{z}} V^z\, d^2z = 0$ となるが、左辺は $\delta\tau \neq 0$ ならば非ゼロである。よって μ は $\bar{\partial}$-完全ではなく、$H^1(E, T_E)$ の非自明な元として $\delta\tau$ と 1 対 1 に対応する。

一方、$H^0(E, T_E) \cong \mathbb{C}$ は並進 $z \to z + c$ という連続的な自己同型を表している。この自己同型を取り除くために 1 点（原点）を固定したものが楕円曲線であり、第 1 章の $\mathcal{M}_1 = \mathbb{H}/SL(2,\mathbb{Z})$ は、正確にはこの 1 点付きトーラスのモジュライ空間 $\mathcal{M}_{1,1}$ である。

一般の種数のリーマン面についても、同様の計算から次が得られる。

Proposition 3.3.1: リーマン面の変形と自己同型

種数 g のコンパクトなリーマン面 Σ_g に対して、

$$\left(\dim_{\mathbb{C}} H^0(\Sigma, T_\Sigma),\ \dim_{\mathbb{C}} H^1(\Sigma, T_\Sigma)\right) = \begin{cases} (3, 0) & (g = 0) \\ (1, 1) & (g = 1) \\ (0, 3g-3) & (g \geq 2) \end{cases}$$

である。特に $g \geq 2$ のリーマン面のモジュライ空間 $\mathcal{M}_g$ の複素次元は $3g-3$ で

ある。

【注】 接束 $T_\Sigma = K^{-1}$（K は標準束）の次数は $\deg T_\Sigma = 2 - 2g$ である。Riemann–Roch の定理

$$\dim H^0(\Sigma, L) - \dim H^1(\Sigma, L) = \deg L - g + 1$$

を $L = T_\Sigma$ に適用すると、$\dim H^0 - \dim H^1 = 3 - 3g$ を得る。

- $g \geq 2$：$\deg T_\Sigma < 0$ なので正則な切断は存在せず $H^0 = 0$。よって $\dim H^1 = 3g - 3$。
- $g = 1$：$T_\Sigma \cong \mathcal{O}$ なので $H^0 \cong \mathbb{C}$。よって $\dim H^1 = 1$（上で計算した τ の変形）。
- $g = 0$：Serre 双対性より $H^1(T_\Sigma) \cong H^0(K^2)^*$ であり、$\deg K^2 = -4 < 0$ なので $H^1 = 0$。よって $\dim H^0 = 3$（$PSL(2,\mathbb{C})$ の生成子 ∂_z, $z\partial_z$, $z^2\partial_z$）。球面には変形の自由度がない。

【注】 Serre 双対性により $H^1(\Sigma, T_\Sigma) \cong H^0(\Sigma, K^2)^*$ であり、モジュライの余接空間は正則 2 次微分 $\phi = \phi_{zz}\, dz^2$ の空間と同一視される。弦理論の Polyakov 経路積分では、ゲージ固定で現れる b ゴーストの零モードがまさにこの正則 2 次微分であり、c ゴーストの零モードは正則ベクトル場 $H^0(\Sigma, T_\Sigma)$ に対応する。したがって $g \geq 2$ では $3g - 3$ 個の b 零モードが存在し、それを Beltrami 微分と対にすることで $\mathcal{M}_g$ 上の積分測度が構成される（第 9 章）。$g = 0, 1$ では c 零モード（共形 Killing ベクトル）が現れ、頂点演算子の位置を固定することでこれを処理する。

3.4　コホモロジーの高次項：自己同型と変形の障害

前節では、モジュライ空間の接空間（真の無限小変形の自由度）が 1 次のコホモロジー群 H^1 によって記述されることを見た。しかし、モジュライ空間の完全な局所構造を理解するためには、楕円型複体を構成する他の次数のコホモロジー、H^0 と H^2 の物理的・幾何学的意味を解明しなければならない。

3.4.1　0 次コホモロジー H^0：自己同型と特異点の発生

ゲージ接続の変形複体における 0 次コホモロジー $H^0(M, d_A) = \ker d_A$ は、方程式 $d_A \epsilon = 0$ を満たす大域的なゲージ変換パラメータ ϵ の空間である。物理的にこれは何を意味するだろうか。$d_A \epsilon = 0$ を満たす非自明な ϵ が存在するということは、背景接続 A を全く変化させないゲージ変換が存在すること、すなわち A が連続的な自己同型（対称性）を持つことを意味する。このような接続を**可約な接続（reducible connection）**と呼ぶ。

【注】 ゲージ群 G の作用 $A \to A + d_A\epsilon$ において、$\epsilon \in \ker d_A$ となる元は、作用の固定部分群 G_A のリー代数をなす。可約な接続においては固定部分群が連続群となるため、モジュライ空間 $\mathcal{M} = \mathcal{A}/\mathcal{G}$ の該当点において商空間の構造が特異性を持つ。複素構造のモジュライの場合も同様に、$H^0(X, T_X)$ は大域的な正則ベクトル場、すなわち X の連続的な自己同型の無限小生成子の空間を表す。

ここで、自己同型に起因する 2 種類の特異性を区別しておく必要がある。

- 自己同型群が**有限群**である場合：H^0 はリー代数（無限小の自己同型）しか見ないため $H^0 = 0$ のままであるが、モジュライ空間は局所的に有限群による商となり、**オービフォールド特異点**を持つ。第 2 章で見たトーラスの $\tau = i,\ e^{i\pi/3}$ がこの例である。
- 自己同型群が**連続群**である場合（$H^0 \neq 0$）：特異性はより深刻になる。ゲージ理論の可約接続の近傍では、モジュライ空間は局所的に H^1/G_A という形の**錐（cone）**となる。例えば $G_A = U(1)$ が $H^1 \cong \mathbb{C}^{m+1}$ に位相回転として作用する場合、商は複素射影空間 $\mathbb{CP}^m$ 上の錐であり、頂点が特異点となる。複素構造のモジュライでは商がハウスドルフ性を失うこともあり、これがスタックによる定式化を必要とす

る理由の一つである。

弦理論において、このような特異点は単なる数学的困難ではなく、物理的な新現象（ゲージ対称性の回復や、特異点に局在する質量ゼロの粒子の出現）の兆候として捉えられる。

3.4.2　2 次コホモロジー H^2：変形の障害（Obstruction）と倉西写像

1 次コホモロジー H^1 は「無限小の変形」を保証するに過ぎない。コホモロジーの元として非自明な微小変形を見つけたとして、それを積分して「有限の大きさを持つ変形（実際のモジュライ空間上の曲線）」にまで持ち上げられる保証はどこにもない。ここで立ちはだかるのが非線形項であり、その阻害要因を記述するのが H^2 である。

複素構造の変形を例に、この**変形の障害（Obstruction）**のメカニズムを計算で追ってみよう。

【注】 接空間の元である無限小変形 $\mu_1 \in H^1_{\bar\partial}(X, T_X)$ が与えられたとする（$\bar\partial\mu_1 = 0$）。これを有限の変形パラメータ t についての形式的冪級数

$$\mu(t) = t\mu_1 + t^2\mu_2 + t^3\mu_3 + \dots \tag{3.21}$$

に拡張し、厳密な可積分条件（Maurer–Cartan 方程式）$\bar\partial\mu(t) = \frac{1}{2}[\mu(t), \mu(t)]$ を満たすように各オーダーの μ_k を決定できるかを問う。両辺を t で展開すると、

$$t\bar\partial\mu_1 + t^2\bar\partial\mu_2 + \mathcal{O}(t^3) = \frac{1}{2}[t\mu_1 + t^2\mu_2, t\mu_1 + t^2\mu_2] = \frac{t^2}{2}[\mu_1, \mu_1] + \mathcal{O}(t^3) \tag{3.22}$$

オーダー t の項は $\bar\partial\mu_1 = 0$ であり、仮定より満たされている。問題はオーダー t^2 の項である：

$$\bar\partial\mu_2 = \frac{1}{2}[\mu_1, \mu_1] \tag{3.23}$$

この方程式が μ_2 について解けるための必要十分条件は、右辺が $\bar\partial$-完全（exact）であることである。一方、$\bar\partial$ は括弧積に対して（次数付き）Leibniz 則 $\bar\partial[\alpha,\beta] = [\bar\partial\alpha, \beta] \pm [\alpha, \bar\partial\beta]$ を満たすので、$\bar\partial\mu_1 = 0$ より $\bar\partial[\mu_1, \mu_1] = 0$ となり、$[\mu_1, \mu_1]$ は自動的に $\bar\partial$-閉（closed）である。（より高次のオーダーで同様の閉性を示す際には、さらに括弧積の Jacobi 恒等式が必要となる。）

したがって、非線形項 $[\mu_1, \mu_1]$ は 2 次のコホモロジー群 $H^2_{\bar\partial}(X, T_X)$ の元（コホモロジー類）を自然に定義する。もし、このコホモロジー類 $[[\mu_1, \mu_1]] \in H^2$ が非ゼロ（自明でない類）であれば、方程式 $\bar\partial\mu_2 = \frac{1}{2}[\mu_1, \mu_1]$ を満たす μ_2 は存在しない。すなわち、無限小変形 μ_1 は有限の変形に拡張できず、モジュライ空間の接ベクトルのように見えたものは「見かけ上の自由度」に過ぎなかったことになる。

このように、無限小変形 $\mu_1 \in H^1$ に対して、その変形を阻害する H^2 の元を与える非線形な写像を**倉西写像（Kuranishi map）**と呼ぶ。モジュライ空間の局所的な形状は、倉西写像の零点集合によって完全に決定される。

ゲージ理論においても全く同様の構造がある。平坦接続 A の変形 $\delta A = ta_1 + t^2 a_2 + \cdots$ に対して、平坦条件

$$F(A + \delta A) = F(A) + d_A\delta A + \delta A \wedge \delta A = 0 \tag{3.24}$$

をオーダー t^2 まで展開すると、$a_1 \wedge a_1 = \frac{1}{2}[a_1, a_1]$ より

$$d_A a_2 = -\frac{1}{2}[a_1, a_1] \tag{3.25}$$

を得る。右辺は d_A-閉であり、そのコホモロジー類 $[[a_1, a_1]] \in H^2(M, d_A)$ が障害となる。小平・スペンサー理論の場合とは符号が異なるが、これは規約の違いにすぎない。

以上をまとめると、倉西の理論は次の**局所モデル**を与える。

Theorem 3.4.1: 倉西の局所モデル

点 $[A]$（あるいは $[X]$）に対し、H^1 の原点の近傍 U 上で定義された G_A-同変な滑らかな写像（**倉西写像**）

$$\kappa : H^1 \supset U \to H^2, \qquad \kappa(x) = \frac{1}{2} P_{H^2}[x,x] + \mathcal{O}(x^3)$$

が存在し、モジュライ空間は $[A]$ の近傍で

$$\mathcal{M} \underset{\text{loc}}{\cong} \kappa^{-1}(0)/G_A$$

と同相である。ここで P_{H^2} は調和部分への射影（符号は規約による）、G_A は H^0 をリー代数に持つ自己同型群である。

この局所モデルから次のことが読み取れる。

- $H^0 = H^2 = 0$ ならば、$\mathcal{M}$ はその点の近傍で次元 $\dim H^1$ の滑らかな多様体である。
- $H^2 \neq 0$ であっても $\kappa \equiv 0$（障害がすべて消える）ならば、やはり滑らかである。
- 一般には $\mathcal{M}$ は H^1 の中の $\dim H^2$ 本の方程式の零点集合（を G_A で割ったもの）となり、その次元は少なくとも $\dim H^1 - \dim H^2 - \dim H^0$ である。

最後の下限が、次節で扱う「仮想次元」の起源である。

特筆すべき物理的応用として、超弦理論における余剰次元空間である **Calabi–Yau 多様体** の場合が挙げられる。

Theorem 3.4.2: Bogomolov–Tian–Todorov

コンパクトな Calabi–Yau 多様体 X の複素構造の変形には障害がない。すなわち、$H^2(X, T_X) \neq 0$ であっても倉西写像は恒等的に $\kappa \equiv 0$ であり、複素構造のモジュライ空間は $[X]$ の近傍で次元 $\dim_{\mathbb{C}} H^1(X, T_X) = h^{n-1,1}$ の滑らかな複素多様体である。

これは物理的に、「Calabi–Yau 空間の複素構造モジュライは常に障害を持たず、局所的に滑らかな多様体をなす」という極めて強力な事実を保証している。3 次元の場合には、このモジュライ空間はさらに特殊 Kähler 多様体の構造を持つ（第 7 章）。

3.5　指数定理とモジュライの仮想次元

ここまで、モジュライ空間の局所的な振る舞いが楕円型複体のコホモロジー (H^0, H^1, H^2) によって支配されることを見てきた。障害項や自己同型が存在する一般の状況において、モジュライ空間が滑らかであると仮定したときの「仮想的な次元（Virtual dimension）」は、コホモロジー群の次元の交代和として計算される。

ゲージ理論における反自己双対（ASD）接続（インスタントン）のモジュライ空間を例にとると、関連する複体（Atiyah–Hitchin–Singer 複体）を 1 つの楕円型作用素 $D = d_A^* \oplus d_A^+ : \Omega^1 \to \Omega^0 \oplus \Omega^2_+$ にまとめたときの指数（Index）は、コホモロジー群の次

元の交代和として以下のように与えられる。

$$\operatorname{ind}(D) = \dim \ker D - \dim \operatorname{coker} D = \dim H^1 - \dim H^0 - \dim H^2 \tag{3.26}$$

本講義では、モジュライ空間の次元が正の量として直接現れるよう、この符号の規約を採用する（複体の Euler 標数 $\dim H^0 - \dim H^1 + \dim H^2$ とは符号が逆であることに注意）。

【注】 インスタントンのモジュライ $\mathcal{M}$ において、大域的ゲージ変換を固定し（$H^0 = 0$）、変形の障害がない（$H^2 = 0$）理想的な状況を想定すれば、モジュライ空間の実次元は

$$\dim_{\mathbb{R}} \mathcal{M} = \dim H^1 = \operatorname{ind}(D) \tag{3.27}$$

となる。アティヤ＝シンガー（Atiyah–Singer）の指数定理は、この解析的な指数を、多様体 M とベクトル束 P のトポロジー（特性類）から代数的に計算できることを教えてくれる。

Atiyah–Singer の指数定理を用いると、次の公式が得られる。

Theorem 3.5.1: Atiyah–Hitchin–Singer の次元公式

M をコンパクトな向き付けられた 4 次元 Riemann 多様体、G をコンパクトな単純リー群とする。インスタントン数 k の ASD 接続のモジュライ空間の仮想次元は

$$\dim \mathcal{M}_k = 4h^\vee(G)\, k - \frac{\dim G}{2}\bigl(\chi(M) + \sigma(M)\bigr) = 4h^\vee(G)\, k - \dim G\,(1 - b_1 + b_2^+)$$

で与えられる。既約かつ障害のない点（$H^0 = H^2 = 0$）の近傍では、これが実際の次元に一致する。

ここで $h^\vee$ は双対 Coxeter 数（$SU(N)$ では N）、χ は Euler 数、σ は符号数、b_2^+ は交叉形式の正の固有値の数である。第 1 項は束のねじれ（第 2 Chern 類）からの寄与、第 2 項は底空間のトポロジーからの寄与である。

【注】 係数の構造を確認しておこう。k に依存しない部分は自明な束上の自明な接続（$k = 0$）での計算に一致する。このとき変形複体は $\dim G$ 個の自明な複体 $\Omega^0 \to \Omega^1 \to \Omega^2_+$ の直和となり、各コホモロジーの次元は $b_0 = 1,\ b_1,\ b_2^+$ であるから、

$$\operatorname{ind}(D) = \dim G\,(b_1 - 1 - b_2^+) = -\dim G\,(1 - b_1 + b_2^+) \tag{3.28}$$

となる。一方 k に比例する部分は、$\mathrm{ad}P$ の第 2 Chern 指標が随伴表現のトレースで書かれることから生じる。$SU(N)$ では $\mathrm{Tr}_{\mathrm{adj}} = 2N\,\mathrm{Tr}_{\mathrm{fund}}$ であり、これが係数 $4h^\vee = 4N$ を与える。

特に $M = S^4$（$b_1 = b_2^+ = 0$）上の $SU(N)$ インスタントンでは、既約な解が存在する範囲で

$$\dim \mathcal{M}_k = 4Nk - (N^2 - 1) \tag{3.29}$$

となる。$SU(2)$、$k = 1$ では $8 - 3 = 5$ であり、これは位置（4 個）とサイズ（1 個）の集団座標に対応する（第 5 章で具体的な解を用いて確認する）。

同じ指数定理の機構は、インスタントン背景中のフェルミオンの零モードも数え上げる。インスタントン数 k の背景中で、表現 R の Dirac 作用素 D_R の指数は Dynkin 指数 $T(R)$ を用いて $\operatorname{ind} D_R = 2T(R)\, k$ で与えられ、基本表現の Weyl フェルミオンは k 個、随伴表現の Weyl フェルミオン（ゲージーノ）は $2Nk$ 個の零モードを持つ。経路積分ではこれらの零モードを Grassmann 積分で吸収するフェルミオン演算子の挿入が必要となり、これが 't Hooft の有効頂点としてカイラル対称性を破る（カイラル・アノマリー）。さらに $\mathcal{N} = 2$ 超対称ゲージ理論では、2 つの随伴 Weyl フェルミオンの零モード $2 \times 2Nk = 4Nk$ 個がボソン的な集団座標の数（無限遠のゲージ回転も含めた $4Nk$ 個）

とちょうど一致し、超対称性がボソンとフェルミオンの零モードを対にしていることが分かる。

以上のように、接空間の無限小変形（H^1）、特異点と対称性（H^0）、非線形な変形の障害（H^2）というコホモロジー的枠組みを用いることで、モジュライ問題は「非線形微分方程式の解の空間」という捉えどころのない対象から、代数トポロジーや指数定理を駆使して厳密に計算可能な対象へと昇華されるのである。

第 4 章

束・接続・曲率：ゲージ理論の数学的基礎を理解する

場の量子論、特に標準模型を記述するゲージ理論や、弦理論における D ブレーン上の力学（非可換ゲージ理論）を深く理解するためには、ゲージ場を単なる「ベクトル場」としてではなく、「ファイバー束上の接続」として幾何学的に捉え直す必要がある。本章では、次章以降で Yang–Mills 理論のインスタントンや Calabi–Yau 多様体の計量のモジュライを扱うための数学的基礎として、ファイバー束、接続、曲率、および特性類の幾何学的意味を、物理学の言葉（ゲージポテンシャルと電磁場テンソル）と対応させながら定式化する。

本章では数学の慣習に従い、ゲージ場をリー代数 $\mathfrak{g}$（$SU(N)$ なら反エルミート行列）に値をとる 1 形式 A として扱い、共変微分を $D = d + A$ と書く。第 2 章で用いた物理の規約（エルミートな A^{phys}、$D = \partial - igA^{\mathrm{phys}}$）とは

$$A = -igA^{\mathrm{phys}}, \qquad F = -igF^{\mathrm{phys}} \tag{4.1}$$

によって対応する。

【注】 $D = d + A = d - igA^{\mathrm{phys}}$ は明らかである。曲率については

$$F = dA + A \wedge A = -ig\, dA^{\mathrm{phys}} - g^2 A^{\mathrm{phys}} \wedge A^{\mathrm{phys}} = -ig\left(dA^{\mathrm{phys}} - igA^{\mathrm{phys}} \wedge A^{\mathrm{phys}}\right) = -igF^{\mathrm{phys}}$$

であり、成分で書けば第 2 章の $F_{\mu\nu}^{\mathrm{phys}} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - ig[A_\mu, A_\nu]$ に一致する。また、第 2 章のゲージ変換 $A^{\mathrm{phys}} \to UA^{\mathrm{phys}}U^{-1} - \frac{i}{g}(dU)U^{-1}$ に $-ig$ を掛けると $A \to UAU^{-1} - (dU)U^{-1}$ となり、$g = U^{-1}$ とおけば $d(g^{-1}) = -g^{-1}(dg)g^{-1}$ より、本章で用いる形

$$A \to g^{-1}Ag + g^{-1}dg$$

を得る。

4.1 ファイバー束と大域的トポロジー：Dirac モノポールの教訓

局所的なゲージ変換不変性のみを考えるならば、ゲージ場 $A_\mu(x)$ を時空 M 上で定義された単なる 1 次微分形式とみなすことで十分であるように思える。しかし、時空のトポロジーが非自明な場合、ゲージ場を全時空で 1 つの滑らかな関数として定義することは一般に不可能となる。

その最も有名な例が Dirac モノポールである。原点に磁荷 g_m を持つ磁気モノポールが存在する場合、磁場 $\boldsymbol{B}$ のフラックスは原点を囲む球面 S^2 上で非ゼロの積分値を持つ

（$\int_{S^2} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S} = g_m$）。もしベクトルポテンシャル $\boldsymbol{A}$ が S^2 全体で滑らかに定義できるとすれば、S^2 は境界を持たないので Stokes の定理により $\int_{S^2} dA = \int_{\partial S^2} A = 0$ となり、フラックスはゼロになるはずである。この矛盾は、「ベクトルポテンシャルは全空間で単一の座標系（ゲージ）を用いて定義できない」という事実を示している。

Wu と Yang は、球面 S^2 を北半球を含む領域 U_N（$\theta < \pi$）と南半球を含む領域 U_S（$\theta > 0$）の 2 つのパッチに分け、それぞれで滑らかなベクトルポテンシャル

$$A_N = \frac{g_m}{4\pi}(1-\cos\theta)\,d\phi, \qquad A_S = -\frac{g_m}{4\pi}(1+\cos\theta)\,d\phi \tag{4.2}$$

を導入した。両者は同じ磁場 $dA_N = dA_S = \frac{g_m}{4\pi}\sin\theta\, d\theta\wedge d\phi$ を与え、重なり（赤道付近）ではゲージ変換で結ばれている。この「パッチごとのポテンシャルとその貼り合わせ」という構造から、次の量子化条件が従う。

Proposition 4.1.1: Dirac の量子化条件

電荷 e の粒子の波動関数が全空間で矛盾なく定義されるための必要十分条件は

$$e\,g_m \in 2\pi\mathbb{Z}$$

である（$\hbar = 1$）。このとき整数 $n = eg_m/2\pi$ は、推移関数 $S^1 \to U(1)$ の巻き付き数（$\pi_1(U(1)) \cong \mathbb{Z}$ の元）に等しい。

【注】 A_N は $\theta = \pi$ で、A_S は $\theta = 0$ で、それぞれ係数が消えないため $d\phi$ の特異性により定義できないが、それぞれの定義域では滑らかである。重なりでは

$$A_N - A_S = \frac{g_m}{4\pi}\big[(1-\cos\theta)+(1+\cos\theta)\big]d\phi = \frac{g_m}{2\pi}d\phi = d\chi, \qquad \chi = \frac{g_m}{2\pi}\phi$$

である。物理の規約では、ゲージ変換 $A \to A + d\lambda$ に伴って電荷 e の波動関数は $\psi \to e^{ie\lambda}\psi$ と変換するから、2 つのパッチの波動関数は

$$\psi_N = e^{ie\chi}\psi_S = \exp\left(i\frac{eg_m}{2\pi}\phi\right)\psi_S$$

で結ばれる。赤道を 1 周（$\phi \to \phi + 2\pi$）したとき ψ_N, ψ_S がともに一価であるためには、$e^{ieg_m} = 1$、すなわち $eg_m \in 2\pi\mathbb{Z}$ でなければならない。推移関数 $t_{NS}(\phi) = e^{in\phi}$ は赤道 S^1 を $U(1)$ に n 回巻き付ける写像である。

$n = 1$ の場合、この $U(1)$ 束は第 2 章で見た Hopf 束 $S^3 \to S^2$ そのものである。この Wu–Yang の辞書（dictionary）は、「ゲージ理論とは、主ファイバー束（Principal fiber bundle）上の幾何学である」という深遠な事実を物理学者に気付かせた。対応をまとめると次のようになる。

物理	数学
ゲージ群	構造群 G
ゲージ場（ポテンシャル）	主束上の接続
場の強さ（電磁場テンソル）	曲率
ゲージ変換	局所切断の取り替え・推移関数
物質場	同伴ベクトル束の切断
トポロジカル荷（磁荷・インスタントン数）	特性類

4.2　主束と接続（Connection）：水平部分空間の分離

まず、主束を正確に定義しよう。

Definition 4.2.1: 主 G 束

G をリー群、M を多様体とする。多様体 P と滑らかな全射 $\pi : P \to M$、および P への G の右作用 $(p, g) \mapsto pg$ の組が**主 G 束**であるとは、次を満たすことをいう。

1. G の作用は自由であり、各ファイバー $P_x = \pi^{-1}(x)$ を保ち、その上で推移的である。
2. （局所自明性）M の開被覆 $\{U_\alpha\}$ と、G の作用と両立する微分同相 $\varphi_\alpha : \pi^{-1}(U_\alpha) \to U_\alpha \times G$ が存在する。

重なり $U_\alpha \cap U_\beta$ 上で、局所自明化の差は**推移関数** $g_{\alpha\beta} : U_\alpha \cap U_\beta \to G$ で与えられ、コサイクル条件 $g_{\alpha\beta}\, g_{\beta\gamma} = g_{\alpha\gamma}$ を満たす。

第 2 章の言葉で言えば、主束とは「G が自由かつ固有に作用し、商が M となる多様体 P」であり、商多様体定理の状況そのものである。局所自明化 φ_α は局所切断 $s_\alpha(x) = \varphi_\alpha^{-1}(x, e)$ を与え、これは物理的には「ゲージの選択」に対応する。2 つの局所切断は推移関数を用いて $s_\beta = s_\alpha\, g_{\alpha\beta}$ と結ばれる。

■例

- **自明束** $P = M \times G$：大域的な切断 $s(x) = (x, e)$ が存在し、ゲージ場は M 上の大域的な 1 形式として書ける。第 2 章で扱った状況である。
- **Hopf 束** $S^3 \to S^2$（$G = U(1)$）：Dirac モノポール（$n = 1$）。大域的な切断は存在しない。
- **フレーム束**：M の各点の接空間の基底（フレーム）全体は主 $GL(n, \mathbb{R})$ 束をなす（計量があれば主 $O(n)$ 束）。一般相対論の Levi-Civita 接続（Christoffel 記号）は、この束上の接続である。ゲージ理論と重力は、同じ幾何学的枠組みで記述される。

P 上の点 p における接空間 T_pP には、G の作用によるファイバー方向の接ベクトルからなる**垂直部分空間（Vertical subspace）** $V_p = \ker d\pi_p \subset T_pP$ が自然に定義される。リー代数の元 $X \in \mathfrak{g}$ は、$X^\#_p = \frac{d}{dt}\big|_{t=0} p \cdot \exp(tX)$ によって垂直ベクトル場（**基本ベクトル場**）を定める。しかし、多様体 M に沿った方向の移動を定義する**水平部分空間（Horizontal subspace）** H_p はアプリオリには存在しない。この H_p を各点で滑らかに（かつ G の作用と両立するように）指定する規則こそが、幾何学における**接続（Connection）**の定義（Ehresmann 接続）である。水平部分空間は、次の接続形式の核として指定するのが便利である。

Definition 4.2.2: 接続形式

主 G 束 P 上の $\mathfrak{g}$ 値 1 形式 ω が**接続形式**であるとは、次を満たすことをいう。

1. （正規化）すべての $X \in \mathfrak{g}$ に対して $\omega(X^\#) = X$。
2. （同変性）すべての $g \in G$ に対して $R_g^* \omega = g^{-1} \omega\, g$（$R_g$ は右作用 $p \mapsto pg$）。

このとき $H_p = \ker \omega_p$ とおくと $T_pP = V_p \oplus H_p$ が成り立ち、H_p は G の作用で互いに移り合う。

物理的なゲージポテンシャル A とは、接続形式 ω の局所切断（ゲージ固定）$s_\alpha : U_\alpha \to P$ による引き戻し $A_\alpha = s_\alpha^* \omega$ として定義される。異なる局所切断に対する引き戻しは、物理で知られる非可換ゲージ変換の規則

$$A_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} A_\alpha \, g_{\alpha\beta} + g_{\alpha\beta}^{-1} d g_{\alpha\beta} \tag{4.3}$$

で結ばれる。逆に、各パッチ上の $\mathfrak{g}$ 値 1 形式 A_α の族が重なりで (4.3) を満たせば、それらは P 上の接続形式 ω に一意に貼り合わされる。すなわち、**接続とは「貼り合わせ条件を満たす局所的なゲージ場の族」に他ならない**。これが Wu–Yang の処方の正確な意味である。

【注】 (4.3) を導出しよう。$s_\beta(x) = s_\alpha(x)\, g(x)$（$g = g_{\alpha\beta}$）とし、$M$ 上の接ベクトル X に対して $ds_\beta(X)$ を計算すると、積の微分により

$$ds_\beta(X) = (R_g)_* ds_\alpha(X) + \big(g^{-1} dg(X) \big)^{\#}$$

となる。第 1 項は s_α の変化を右移動したもの、第 2 項は g の変化によるファイバー方向の成分である。ω を作用させ、同変性 $\omega((R_g)_* v) = g^{-1}\omega(v) g$ と正規化 $\omega(Y^{\#}) = Y$ を用いると、

$$\begin{aligned} A_\beta(X) &= \omega(ds_\beta(X)) = g^{-1}\omega(ds_\alpha(X))\, g + g^{-1} dg(X) \\ &= g^{-1} A_\alpha(X)\, g + g^{-1} dg(X) \end{aligned}$$

を得る。

2 つの接続形式の差 $\omega_1 - \omega_2$ は、垂直ベクトルを消し（正規化条件の差）、同変的に変換する。このような形式は M 上の随伴束 $\mathrm{ad}P = P \times_G \mathfrak{g}$ に値をとる 1 形式と同一視されるので、

$$\mathcal{A} = A_0 + \Omega^1(M, \mathrm{ad}P) \tag{4.4}$$

すなわち接続全体の空間 $\mathcal{A}$ は**アフィン空間**である。第 2 章・第 3 章で用いた事実（$\mathcal{A}$ が可縮であること、接続の変形 δA が $\Omega^1(M, \mathrm{ad}P)$ の元であること）は、ここから従う。実際、(4.3) において 2 つの接続の差をとると非斉次項 $g^{-1}dg$ が打ち消し合い、差は $g^{-1}(\cdot)g$ と斉次に変換する。

超弦理論において、D ブレーンの世界体積上には開弦の端点が張り付く。端点に Chan–Paton 因子（カラー自由度）を持たせることは、D ブレーン上にベクトル束を構成することに他ならない。このベクトル束上の接続が、D ブレーン上の非可換ゲージ場として振る舞うのである。

4.3　曲率と可積分条件：並行移動の経路依存性

接続が与えられたとき、多様体 M 上の曲線 $\gamma(t)$ に沿ってファイバーの点を水平部分空間 H_p に沿って持ち上げる（水平リフト）ことができる。これは物理的には、ゲージ場を背景とした粒子のスピンやアイソスピンの**並行移動（Parallel transport）**に対応する。局所ゲージでは、物質場 ψ が曲線に沿って並行であるという条件は

$$\frac{d\psi}{dt} + A(\dot\gamma)\, \psi = 0 \tag{4.5}$$

であり、その解は経路順序積 $\psi(1) = \mathcal{P}\exp\left(-\int_\gamma A \right) \psi(0)$ で与えられる。

閉曲線に沿って並行移動して元の点に戻ってきたとき、一般には元の状態からゲージ変換（位相やカラーの回転）を受けた状態になる。この変換

$$\mathrm{Hol}_\gamma(A) = \mathcal{P}\exp\left(-\oint_\gamma A \right) \in G \tag{4.6}$$

を**ホロノミー（Holonomy）**と呼ぶ。ゲージ変換のもとで $\mathrm{Hol}_\gamma \to g(x_0)^{-1}\,\mathrm{Hol}_\gamma\, g(x_0)$（$x_0$ は基点）と共役で変換するので、そのトレース（**Wilson ループ**）$\mathrm{Tr}\,\mathrm{Hol}_\gamma$ はゲージ不変な観測量である。無限小の閉曲線に沿ったホロノミーのズレを測るテンソル場が曲率である。

Definition 4.3.1: 曲率

接続形式 ω の**曲率形式**を

$$\Omega = d\omega + \omega \wedge \omega \quad \left(= d\omega + \tfrac{1}{2}[\omega, \omega]\right)$$

で定める（Cartan の構造方程式）。その局所切断による引き戻し $F = s^*\Omega$ を**場の強さ**と呼び、

$$F = dA + A \wedge A, \qquad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu + [A_\mu, A_\nu]$$

と書ける。F_α, F_β は重なりで $F_\beta = g_{\alpha\beta}^{-1} F_\alpha\, g_{\alpha\beta}$ と斉次に変換し、$\Omega^2(M, \mathrm{ad}P)$ の元を定める。

曲率が「無限小ループのホロノミー」であることは、次のように確かめられる。点 x から出発して、2 つの方向 u, v に沿った辺の長さ ε の小さな平行四辺形を一周すると、

$$\mathrm{Hol} = 1 - \varepsilon^2 F(u, v) + \mathcal{O}(\varepsilon^3) \tag{4.7}$$

となる（符号はループの向きと規約による）。$U(1)$ の場合、これは Stokes の定理 $\oint A = \int dA$ そのものであり、非可換な場合には $A \wedge A$ の項が A の非可換性から生じる。

曲率がゼロ（$F = 0$）である接続を**平坦接続**と呼ぶ。Frobenius の定理によれば、曲率がゼロであることは水平部分空間 H_p が可積分である（ファイバー束を水平にスライスする部分多様体が存在する）ことの必要十分条件である。このとき、ホロノミーは閉曲線をホモトピーで連続変形しても変わらず、平坦接続は基本群の表現 $\pi_1(M) \to G$ を定める。第 3 章で用いた $\mathcal{M}_{\mathrm{flat}} \cong \mathrm{Hom}(\pi_1(M), G)/G$ はこの事実に基づいている。また、第 3 章で扱った変形理論は、この可積分条件を満たしたまま接続を微小に変形する理論であった。

曲率形式は、接続によらず常に次の恒等式を満たす。

Proposition 4.3.1: Bianchi 恒等式

任意の接続に対して

$$d_A F \equiv dF + A \wedge F - F \wedge A = 0$$

が成り立つ。

【注】 曲率 F の共変外微分 $d_A F$ を計算しよう。$d(A \wedge A) = dA \wedge A - A \wedge dA$（$A$ は 1 形式）に注意すると、

$$\begin{aligned} d_A F &= dF + [A, F] = dF + A \wedge F - F \wedge A \\ &= d(dA + A \wedge A) + A \wedge (dA + A \wedge A) - (dA + A \wedge A) \wedge A \\ &= d(A \wedge A) + A \wedge dA + A \wedge A \wedge A - dA \wedge A - A \wedge A \wedge A \\ &= (dA \wedge A - A \wedge dA) + A \wedge dA - dA \wedge A \\ &= 0 \end{aligned}$$

となる。

$U(1)$ の場合 Bianchi 恒等式は $dF = 0$ となり、これは電磁気学における $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ と $\nabla \times \boldsymbol{E} + \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} = 0$ に他ならない。すなわち、Maxwell 方程式の半分は力学ではなく幾何学（F が接続の曲率であること）から自動的に従う。残りの半分（運動方程式）は作用から導かれる。

【注】 Yang–Mills 作用 $S = -\frac{1}{2g^2}\int_M \mathrm{Tr}(F \wedge *F)$（反エルミート規約では $-\mathrm{Tr}$ が正定値）を変分しよう。$A \to A + \delta A$ に対して $\delta F = d_A \delta A$（第 3 章）なので、

$$\delta S = -\frac{1}{g^2}\int_M \mathrm{Tr}(d_A \delta A \wedge *F) = \pm\frac{1}{g^2}\int_M \mathrm{Tr}(\delta A \wedge d_A *F)$$

（部分積分）となる。よって運動方程式は $d_A *F = 0$ である。$U(1)$ の場合、これは源のない Maxwell 方程式 $d*F = 0$（$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0$、$\nabla \times \boldsymbol{B} - \partial_t \boldsymbol{E} = 0$）である。

4.4　特性類とトポロジカル不変量（Chern–Weil 理論）

曲率 F はゲージ変換に対して $F \to g^{-1}Fg$ と変換するため、ゲージ不変ではない。しかし、F のトレースを用いた多項式（例えば $\mathrm{Tr}(F^k)$）は巡回不変性によりゲージ不変な微分形式となり、M 上で大域的に定義される。さらに驚くべきことに、これらは次の性質を持つ。

Theorem 4.4.1: Chern–Weil

P を M 上の主 G 束、A をその上の接続とし、f を $\mathfrak{g}$ 上の Ad-不変な多項式（例えば $f(X) = \mathrm{Tr}(X^k)$）とする。このとき

1. $f(F)$ は閉形式である：$df(F) = 0$。
2. その de Rham コホモロジー類 $[f(F)] \in H^*(M, \mathbb{R})$ は接続 A の選び方に依存しない。

【注】 $f(X) = \mathrm{Tr}(X^k)$ の場合に示す。

(1) $\mathrm{Tr}(F^k)$ はゲージ不変なので、d を共変外微分 d_A に置き換えてよい（交換子の項はトレースの巡回性で消える）。F は偶数次形式なので

$$d\,\mathrm{Tr}(F^k) = \mathrm{Tr}(d_A(F^k)) = k\,\mathrm{Tr}(d_A F \wedge F^{k-1}) = 0$$

を Bianchi 恒等式から得る。

(2) 2 つの接続 A_0, A_1 を $A_t = A_0 + t\alpha$（$\alpha = A_1 - A_0 \in \Omega^1(M, \mathrm{ad}P)$）で結ぶ。$\frac{d}{dt}F_t = d_{A_t}\alpha$ であるから、

$$\frac{d}{dt}\mathrm{Tr}(F_t^k) = k\,\mathrm{Tr}(d_{A_t}\alpha \wedge F_t^{k-1}) = k\,d\,\mathrm{Tr}(\alpha \wedge F_t^{k-1})$$

（再び Bianchi 恒等式を用いた）。これを t について 0 から 1 まで積分すると、

$$\mathrm{Tr}(F_1^k) - \mathrm{Tr}(F_0^k) = d\left(k\int_0^1 dt\,\mathrm{Tr}(\alpha \wedge F_t^{k-1})\right)$$

となり、差は完全形式である。右辺の括弧内の形式を**超越形式（transgression form）**と呼ぶ。

ゲージ理論の連続的な変形（モジュライ空間上の移動）に対して不変に保たれるこれらの量は、主束の大域的な「ねじれ」を測る**特性類（Characteristic classes）**を定義する。

Definition 4.4.1: Chern 類とインスタントン数

$G = U(N)$ または $SU(N)$ の場合、全 **Chern 類**を

$$c(P) = \det\left(1 + \frac{i}{2\pi}F\right) = 1 + c_1(P) + c_2(P) + \cdots$$

で定める。特に

$$c_1(P) = \frac{i}{2\pi}\operatorname{Tr} F, \qquad c_2(P) = \frac{1}{8\pi^2}\left[\operatorname{Tr}(F\wedge F) - \operatorname{Tr}F\wedge\operatorname{Tr}F\right]$$

である。4 次元閉多様体 M 上の $SU(N)$ 束（$\operatorname{Tr} F = 0$）に対し、

$$k = \int_M c_2(P) = \frac{1}{8\pi^2}\int_M \operatorname{Tr}(F\wedge F)$$

を**インスタントン数**（第 2Chern 数）と呼ぶ。

【注】 $X = \frac{i}{2\pi}F$ とおくと、$\det(1+X) = 1 + \operatorname{Tr}X + \frac{1}{2}\left[(\operatorname{Tr}X)^2 - \operatorname{Tr}(X^2)\right] + \cdots$ であるから、

$$c_2 = \frac{1}{2}\left[(\operatorname{Tr}X)^2 - \operatorname{Tr}(X^2)\right] = -\frac{1}{2}\left(\frac{i}{2\pi}\right)^2\left[\operatorname{Tr}(F^2) - (\operatorname{Tr}F)^2\right] = \frac{1}{8\pi^2}\left[\operatorname{Tr}(F^2) - (\operatorname{Tr}F)^2\right]$$

を得る。

特性類は整数性を持つ。その最も簡単な例が、本章冒頭の Dirac モノポールである。

■例：モノポールの第 1Chern 数　$U(1)$ の場合、(4.1) の規約で $F = -ieF^{\mathrm{phys}}$（結合定数を電荷 e とした）であるから、

$$\int_{S^2} c_1 = \frac{i}{2\pi}\int_{S^2}(-ie)F^{\mathrm{phys}} = \frac{e}{2\pi}\int_{S^2}F^{\mathrm{phys}} = \frac{eg_m}{2\pi} = n \tag{4.8}$$

となる。Dirac の量子化条件は、「第 1Chern 数が整数である」という特性類の一般的性質の特別な場合である。

■例：Gauss–Bonnet の定理　向き付けられた閉曲面 Σ の接束（構造群 $SO(2)\cong U(1)$）に Levi-Civita 接続を入れると、その曲率は Gauss 曲率 K と面積要素 dA を用いて $K\,dA$ で与えられる。Chern–Weil 理論を適用すると、その特性類（Euler 類）の積分は

$$\frac{1}{2\pi}\int_\Sigma K\,dA = \chi(\Sigma) = 2 - 2g \tag{4.9}$$

となり、古典的な Gauss–Bonnet の定理が得られる。左辺は計量に依存するように見えるが、Chern–Weil 理論により計量（接続）を連続的に変えても値は変わらず、トポロジカルな不変量 χ に等しい。第 2 章で枕カバーの検証に用いたのはこの定理である。

■例：インスタントン数と Chern–Simons 形式　物理的にもっとも重要な例が、インスタントン数を与える第 2Chern 類である。$\operatorname{Tr}(F\wedge F)$ は閉形式であるだけでなく、局所的には **Chern–Simons 3 形式**

$$\omega_{\mathrm{CS}}(A) = \operatorname{Tr}\left(A\wedge dA + \frac{2}{3}A\wedge A\wedge A\right) \tag{4.10}$$

の外微分 $\operatorname{Tr}(F\wedge F) = d\omega_{\mathrm{CS}}$ として書ける。

【注】 $d\omega_{\mathrm{CS}}$ を直接計算しよう。$d\operatorname{Tr}(A\wedge dA) = \operatorname{Tr}(dA\wedge dA)$、$d\operatorname{Tr}(A^3) = 3\operatorname{Tr}(dA\wedge A^2)$（トレースの巡回性と次数の符号による）であるから、

$$d\omega_{\mathrm{CS}} = \operatorname{Tr}(dA\wedge dA) + 2\operatorname{Tr}(dA\wedge A^2)$$

である。一方、

$$\operatorname{Tr}(F\wedge F) = \operatorname{Tr}(dA\wedge dA) + \operatorname{Tr}(dA\wedge A^2) + \operatorname{Tr}(A^2\wedge dA) + \operatorname{Tr}(A^4)$$

であり、巡回性より $\mathrm{Tr}(A^2 \wedge dA) = \mathrm{Tr}(dA \wedge A^2)$、また奇数次形式の巡回置換の符号から $\mathrm{Tr}(A^4) = -\mathrm{Tr}(A^4) = 0$ である。よって両者は一致する。

M 全体で単一のゲージが使えれば、Stokes の定理より $k = \frac{1}{8\pi^2}\int_M d\omega_{\mathrm{CS}} = 0$ となるはずである。非ゼロの k は、ゲージが大域的に取れないこと、すなわち束のトポロジーの非自明性を反映している。最も重要な $M = S^4$（$\mathbb{R}^4$ に無限遠点を加えたもの）の場合を見てみよう。S^4 を北半球と南半球の 2 つのパッチに分けると、束は赤道 S^3 上の推移関数 $g : S^3 \to SU(N)$ で決まり、そのホモトピー類は $\pi_3(SU(N)) \cong \mathbb{Z}$ で分類される。

Proposition 4.4.1: インスタントン数と巻き付き数

S^4 上の $SU(N)$ 束のインスタントン数は、赤道 S^3 上の推移関数 g の巻き付き数に（向きの規約による符号を除いて）等しい：

$$k = -\frac{1}{24\pi^2}\int_{S^3} \mathrm{Tr}\left(g^{-1}dg\right)^3 \in \mathbb{Z}$$

【注】 物理的には、$\mathbb{R}^4$ 上の有限作用の配位では無限遠で $F \to 0$ となるので、A は無限遠の球面 S^3_∞ 上で純粋ゲージ $A = g^{-1}dg$ に近づく。このとき $d(g^{-1}dg) = -g^{-1}dg \wedge g^{-1}dg$ より $dA = -A \wedge A$ であるから、

$$\omega_{\mathrm{CS}} = \mathrm{Tr}\left(-A^3 + \frac{2}{3}A^3\right) = -\frac{1}{3}\mathrm{Tr}(A^3)$$

となる。Stokes の定理を用いて

$$k = \frac{1}{8\pi^2}\int_{\mathbb{R}^4} d\omega_{\mathrm{CS}} = \frac{1}{8\pi^2}\int_{S^3_\infty} \omega_{\mathrm{CS}} = -\frac{1}{24\pi^2}\int_{S^3_\infty} \mathrm{Tr}\left(g^{-1}dg\right)^3$$

を得る。右辺の積分は写像 $g : S^3 \to SU(N)$ の写像度に比例し、適切に規格化すると整数となる（例えば $SU(2) \cong S^3$ で g が恒等写像なら $|k| = 1$）。

このように、ゲージ場（接続）と電磁場テンソル（曲率）の微分幾何学的定式化は、系の連続的なダイナミクスを記述するだけでなく、モジュライ空間の連結成分を分類する離散的なトポロジカル不変量（特性類）をも自然に導き出す。次章の「第 II 部：物理に現れるモジュライ」では、この枠組みを用いて Yang–Mills 理論におけるインスタントンのモジュライを具体的に構成し、その物理的性質を解き明かしていく。

第 II 部

物理に現れるモジュライ

第 5 章

Yang–Mills 理論：インスタントンのモジュライ

第 I 部では、モジュライ問題の一般的な枠組みと、ゲージ理論をファイバー束の幾何学として定式化する数学的基礎を学んだ。第 II 部では、これらの抽象的な枠組みが実際の理論物理学においてどのように立ち現れるのかを、具体的な物理系に即して解析していく。

本章の主題は、4 次元の非可換ゲージ理論（Yang–Mills 理論）における「インスタントン（Instanton）」のモジュライ空間である。インスタントンは、真空間のトンネル効果を記述する非摂動的な配位であり、そのモジュライ空間の幾何学は、Seiberg–Witten 理論や Donaldson 不変量など、現代の数理物理学において最も豊穣な成果をもたらした源泉である。本章では、これまでの章の道具がすべて一つの具体例の中で働く様子を見る：Bogomol'nyi 限界（第 4 章の特性類）、BPST 解と集団座標（第 3 章の零モード）、次元公式（第 3 章の指数定理）、ADHM 構成（第 2 章の商空間）、そしてコンパクト化（第 1 章）である。

5.1　ユークリッド化と Bogomol'nyi 限界

通常のミンコフスキー時空（計量符号 $(-+++)$）における場の量子論において、真空間のトンネル効果などの非摂動効果を評価するためには、時間を虚数時間 $\tau = it$ へ解析接続（Wick 回転）し、計量が正定値 $(++++)$ となる 4 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^4$ で経路積分を実行するのが定石である。

本章では物理の慣習に従い、エルミートなゲージ場 $A_\mu = A_\mu^a T^a$（$\mathrm{Tr}(T^a T^b) = \frac{1}{2}\delta^{ab}$）を、結合定数 g を作用の前に出す規格化で用いる：

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu - i[A_\mu, A_\nu], \qquad S_{YM} = \frac{1}{2g^2}\int d^4x\, \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}) \tag{5.1}$$

作用 S_{YM} を最小化する配位（古典解）を探すために、トポロジカルな不変量であるインスタントン数を導入しよう。

$$k = \frac{1}{16\pi^2}\int d^4x\, \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}\tilde{F}_{\mu\nu}) = \frac{1}{8\pi^2}\int \mathrm{Tr}(F\wedge F) \tag{5.2}$$

ここで、$\tilde{F}_{\mu\nu} \equiv \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ は Hodge 双対テンソル（微分形式の言葉では $*F$）である。

【注】 第 4 章の反エルミートな規約とは $A^{(4\text{ 章})} = -iA$、$F^{(4\text{ 章})} = -iF$ で対応する（第 4 章の式で $g=1$ とおいたもの）。このとき $\mathrm{Tr}(F^{(4\text{ 章})}\wedge F^{(4\text{ 章})}) = -\mathrm{Tr}(F\wedge F)$ であるから、本章の k は第 4 章の第 2Chern 数

と $k = -c_2(P)$ の関係にある。物理の文献で「自己双対・$k > 0$」と呼ばれる配位は、数学の文献では向きを反転して「反自己双対（ASD）・$c_2 > 0$」と呼ばれることが多い。両者は向きの規約の違いにすぎない。また、$F \wedge F = \frac{1}{2} F_{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu}\, d^4x$ より、(5.2) の 2 つの表式は一致する。

インスタントン数は整数であり（第 4 章）、配位の連続的な変形で変わらない。したがって配位空間は k によって連結成分に分かれ、各成分の中で作用を最小化することが問題となる。

Proposition 5.1.1: Bogomol'nyi 限界

任意の有限作用の配位に対して

$$S_{YM} \geq \frac{8\pi^2 |k|}{g^2}$$

が成り立ち、等号は $F_{\mu\nu} = \pm \tilde{F}_{\mu\nu}$（$\pm$ は k の符号）のとき、かつそのときに限り成立する。

【注】 任意のゲージ接続に対して、以下の不等式が常に成り立つ。

$$\begin{aligned} 0 &\leq \frac{1}{4g^2} \int d^4x \, \mathrm{Tr} \left((F_{\mu\nu} \mp \tilde{F}_{\mu\nu})(F_{\mu\nu} \mp \tilde{F}_{\mu\nu}) \right) \\ &= \frac{1}{4g^2} \int d^4x \, \mathrm{Tr} \left(F_{\mu\nu} F_{\mu\nu} \mp 2 F_{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu} + \tilde{F}_{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu} \right) \end{aligned}$$

ユークリッド空間（計量 $\delta_{\mu\nu}$）においては $\tilde{F}_{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu} = F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}$ となることを用いると、

$$0 \leq \frac{1}{2g^2} \int d^4x \, \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu} F_{\mu\nu}) \mp \frac{1}{2g^2} \int d^4x \, \mathrm{Tr}(F_{\mu\nu} \tilde{F}_{\mu\nu}) = S_{YM} \mp \frac{8\pi^2}{g^2} k$$

を得る。k の符号に合わせて複号を選べば $S_{YM} \geq 8\pi^2 |k| / g^2$ である。等号は被積分関数 $\mathrm{Tr}(F \mp \tilde{F})^2$（正定値）が恒等的にゼロ、すなわち $F = \pm \tilde{F}$ のときに限る。

Definition 5.1.1: インスタントンとそのモジュライ空間

1. $F = *F$ を**自己双対（SD）方程式**、$F = - * F$ を**反自己双対（ASD）方程式**と呼ぶ。インスタントン数 k の有限作用の SD 解を**インスタントン**（ASD 解を反インスタントン）と呼ぶ。
2. インスタントン数 k のインスタントン全体をゲージ変換で割った空間

$$\mathcal{M}_k = \{ A \mid F = *F,\ \text{インスタントン数 } k \} / \mathcal{G}$$

   を**インスタントンのモジュライ空間**と呼ぶ。
3. $\mathbb{R}^4$ 上では、無限遠で単位元に近づくゲージ変換のなす部分群 $\mathcal{G}_0$ で割った

$$\widetilde{\mathcal{M}}_k = \{ A \mid F = *F,\ \text{インスタントン数 } k \} / \mathcal{G}_0$$

   を**フレーム付き（framed）モジュライ空間**と呼ぶ。$\mathcal{M}_k = \widetilde{\mathcal{M}}_k / G$ であり、両者の次元差は無限遠での大域的ゲージ回転の自由度 $\dim G$ である。

SD/ASD 方程式は、元の Yang–Mills 運動方程式 $d_A * F = 0$ を自動的に満たす。なぜなら、Bianchi 恒等式 $d_A F = 0$（第 4 章）より、$F = \pm * F$ ならば直ちに $d_A * F = \pm d_A F = 0$ となるからである。2 階の運動方程式を解くという困難な問題が、幾何学的により自然な 1 階の SD/ASD 方程式に還元されたことになる。

5.1.1　インスタントンの物理的意味：トンネル効果と θ 真空

インスタントンの物理的意味は、Minkowski 時空での真空構造を見ると明らかになる。時間的ゲージ $A_0 = 0$ では、古典的な真空（エネルギーゼロの配位）は空間 $\mathbb{R}^3$（無限遠を 1 点とみなして S^3）上の純粋ゲージ $A_i = i\,g^{-1}\partial_i g$ であり、$g : S^3 \to SU(N)$ の巻き付き数 $n \in \pi_3(SU(N)) \cong \mathbb{Z}$ で分類される。巻き付き数の異なる真空 $|n\rangle$ は小さなゲージ変換では移り合わず、古典的には互いにエネルギー障壁で隔てられている。

ユークリッド時間 τ の $-\infty$ で真空 $|n\rangle$、$+\infty$ で真空 $|n+k\rangle$ に近づく配位を考えると、Chern–Simons 形式の議論（第 4 章）からそのインスタントン数はちょうど k である。したがって、インスタントンは**異なる真空の間のトンネル効果**を記述し、その振幅は半古典近似で

$$\langle n+k|e^{-HT}|n\rangle \propto e^{-8\pi^2|k|/g^2} \tag{5.3}$$

となる。g について非解析的なこの因子は、摂動論のどの次数にも現れない。真のエネルギー固有状態は、Bloch 波と同様の重ね合わせ $|\theta\rangle = \sum_n e^{in\theta}|n\rangle$（$\theta$ **真空**）であり、経路積分においては作用に θ 項 $-i\theta k$ を加えることと等価である。

5.2　BPST インスタントンと集団座標

$k = 1$ の $SU(2)$ インスタントン解（BPST インスタントン）は、1975 年に Belavin, Polyakov, Schwarz, Tyupkin によって具体的に書き下された。正則ゲージ（regular gauge）では

$$A^a_\mu(x) = \frac{2\eta_{a\mu\nu}(x-X)_\nu}{(x-X)^2+\rho^2} \tag{5.4}$$

で与えられる。ここで、$\eta_{a\mu\nu}$ は't Hooft 記号

$$\eta_{a\mu\nu} = \begin{cases} \epsilon_{a\mu\nu} & (\mu,\nu = 1,2,3) \\ \delta_{a\mu} & (\nu = 4) \\ -\delta_{a\nu} & (\mu = 4) \end{cases} \tag{5.5}$$

であり、$\mu\nu$ について反対称かつ自己双対なテンソルである。X_μ はインスタントンの「中心位置」、$\rho > 0$ はインスタントンの「サイズ」を表す。対応する場の強さは

$$F^a_{\mu\nu} = -\frac{4\eta_{a\mu\nu}\,\rho^2}{\left((x-X)^2+\rho^2\right)^2} \tag{5.6}$$

であり、η の自己双対性から SD 方程式を満たす。作用密度は中心 X のまわりの幅 ρ の領域に局在している。

【注】 作用が $8\pi^2/g^2$、すなわち $k = 1$ であることを確かめよう。$\mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}F_{\mu\nu}) = \frac{1}{2}F^a_{\mu\nu}F^a_{\mu\nu}$ と、't Hooft 記号の恒等式 $\eta_{a\mu\nu}\eta_{a\mu\nu} = 12$ を用いると、$r = |x-X|$ として

$$S_{YM} = \frac{1}{4g^2}\int d^4x\, F^a_{\mu\nu}F^a_{\mu\nu} = \frac{1}{4g^2}\cdot 16\cdot 12\int d^4x\,\frac{\rho^4}{(r^2+\rho^2)^4}$$

である。4 次元の極座標 $d^4x = 2\pi^2 r^3 dr$ と $u = r^2$ の置換により

$$\int d^4x\,\frac{\rho^4}{(r^2+\rho^2)^4} = 2\pi^2\cdot\frac{1}{2}\int_0^\infty du\,\frac{u\,\rho^4}{(u+\rho^2)^4} = \pi^2\cdot\frac{1}{6} = \frac{\pi^2}{6}$$

（$\int_0^\infty \frac{u\,du}{(u+a)^4} = \frac{1}{6a^2}$）。よって $S_{YM} = \frac{192}{4g^2}\cdot\frac{\pi^2}{6} = \frac{8\pi^2}{g^2}$ となり、Bogomol'nyi 限界を $k = 1$ で飽和している。作用が ρ と X に依存しないことは、これらが零モード（集団座標）であることの反映である（第 3 章）。

解 (5.4) は、作用を変えない対称性によってパラメータの族に広がる。

- **並進**（4 個）：中心位置 X_μ。
- **スケール変換**（1 個）：サイズ ρ。古典的な Yang–Mills 理論は共形不変なので、作用は ρ に依存しない。
- **大域的ゲージ回転**（3 個）：定数 $U \in SU(2)$ による $A \to UAU^{-1}$。無限遠で非自明に作用するので、$\mathcal{G}_0$ では割られず、フレーム付きモジュライの座標となる。

（回転 $SO(4)$ の作用は、解の形から大域的ゲージ回転と打ち消し合うように組み合わされ、新たなパラメータを生まない。）こうして次の結果を得る。

Proposition 5.2.1: $k=1$ の $SU(2)$ インスタントンのモジュライ空間

$$\widetilde{\mathcal{M}}_1 \cong \mathbb{R}^4 \times \frac{\mathbb{R}^4 \setminus \{0\}}{\mathbb{Z}_2}, \qquad \mathcal{M}_1(\mathbb{R}^4) \cong \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}_{>0}$$

であり、次元はそれぞれ 8 と 5 である。

【注】 フレーム付きモジュライの第 2 因子は、サイズ $\rho > 0$ とゲージの向き $U \in SU(2) \cong S^3$ を組にしたものである。ここで U と $-U$ は随伴作用 $A \to UAU^{-1}$ として同じ変換を与えるので、実質的なパラメータは $SU(2)/\mathbb{Z}_2 = SO(3)$ に値をとる。(ρ, U) を四元数 $\rho U \in \mathbb{H} \cong \mathbb{R}^4$（$\rho = |\rho U|$）とみなせば、$\rho > 0$ より原点が除かれ、$\pm$ の同一視により $(\mathbb{R}^4 \setminus \{0\})/\mathbb{Z}_2$ を得る。これは第 2 章で見た錐 $\mathbb{C}^2/\mathbb{Z}_2$ から頂点を除いたものであり、頂点 $\rho = 0$ が次節以降で扱う「小インスタントン」の特異点に対応する。

さらに、$\mathbb{R}^4$ に無限遠点を加えた S^4 上で考えると、共形変換群 $SO(5,1)$ が作用し、その固定部分群 $SO(5)$ による商として

$$\mathcal{M}_1(S^4) \cong SO(5,1)/SO(5) \cong \mathbb{H}^5 \tag{5.7}$$

（5 次元双曲空間、すなわち開いた 5 次元球体）を得る。位置 X とサイズ ρ は、上半空間モデル $\{(X,\rho) \mid \rho > 0\}$ の座標に他ならない。

【注】 第 3 章で見た集団座標の処方を適用すると、1 インスタントンの寄与は

$$Z_{k=1} \propto \int d^4X \int_0^\infty \frac{d\rho}{\rho^5} \left(\frac{8\pi^2}{g^2}\right)^{2N} e^{-8\pi^2/g^2(1/\rho)}$$

という形になる（$SU(N)$）。ρ^{-5} は次元解析から、$(8\pi^2/g^2)^{2N}$ はフレーム付きの $4N$ 個の集団座標の Jacobian（1 つあたり $\sqrt{S_{YM}}$）から生じ、1 ループ行列式の効果は結合定数を尺度 $1/\rho$ での走る結合定数 $g(1/\rho)$ に置き換える。漸近自由性 $e^{-8\pi^2/g^2(1/\rho)} = (\rho\Lambda)^{11N/3}$ を用いると、被積分関数は $\rho^{11N/3-5}$ に比例し、大きな ρ で発散する。これは、モジュライ空間の非コンパクトな方向（$\rho \to \infty$）が赤外での強結合の問題として現れていることを示している。

5.3　ADHM 構成法

一般の N と k の場合、インスタントンのモジュライ空間 $\mathcal{M}_k$ の構造は極めて複雑になる。しかし、1978 年に Atiyah, Drinfeld, Hitchin, Manin は、ツイスター理論を応用することで、自己双対方程式の一般解を有限次元の代数方程式（行列の線形代数）に帰着させることに成功した。これを **ADHM 構成法**と呼ぶ。

Theorem 5.3.1: ADHM 構成

$\mathbb{R}^4$ 上のインスタントン数 k の $U(N)$ インスタントンのフレーム付きモジュライ空間は、行列

$$B_1, B_2 \in \mathrm{Mat}(k\times k, \mathbb{C}), \quad I \in \mathrm{Mat}(k\times N, \mathbb{C}), \quad J \in \mathrm{Mat}(N\times k, \mathbb{C})$$

で、**ADHM 方程式**

$$\begin{aligned} \mu_{\mathbb{C}} &\equiv [B_1, B_2] + IJ = 0, \\ \mu_{\mathbb{R}} &\equiv [B_1, B_1^\dagger] + [B_2, B_2^\dagger] + II^\dagger - J^\dagger J = 0 \end{aligned}$$

を満たし、$U(k)$ が自由に作用するもの（正則な ADHM データ）全体を、$U(k)$ の作用

$$(B_1, B_2, I, J) \mapsto (hB_1h^{-1},\ hB_2h^{-1},\ hI,\ Jh^{-1}) \quad (h \in U(k))$$

で割った空間と同一視される：

$$\widetilde{\mathcal{M}}_{N,k} \cong \{(B_1, B_2, I, J) \mid \mu_{\mathbb{C}} = \mu_{\mathbb{R}} = 0\}^{\mathrm{reg}}/U(k)$$

これは超 Kähler 商と呼ばれる構成であり、$\widetilde{\mathcal{M}}_{N,k}$ は自然な超 Kähler 計量を持つ。

無限次元の空間 $\mathcal{A}$ を無限次元の群 $\mathcal{G}$ で割るという問題が、有限次元の空間を有限次元の群 $U(k)$ で割る問題（第 2 章）に置き換わったことに注意しよう。

【注】 ADHM 構成から次元を数えて、第 3 章の指数定理と比較しよう。実次元で数えると、

- 変数：B_1, B_2 が $2\times 2k^2 = 4k^2$、I, J が $2\times 2kN = 4kN$。
- 方程式：$\mu_{\mathbb{C}} = 0$ が $2k^2$ 本（複素 $k\times k$ 行列）、$\mu_{\mathbb{R}} = 0$ が k^2 本（エルミート $k\times k$ 行列）。
- 群：$U(k)$ が k^2 次元（自由に作用するので、そのまま差し引ける）。

したがって

$$\dim_{\mathbb{R}} \widetilde{\mathcal{M}}_{N,k} = 4k^2 + 4kN - 2k^2 - k^2 - k^2 = 4kN$$

となる。これは第 3 章の次元公式 $4Nk - (N^2-1)$ に、無限遠での大域的ゲージ回転 $\dim SU(N) = N^2-1$ を加えたものに一致している。

■例：$k=1$ の ADHM データ　$k=1$ では B_1, B_2 は複素数であり、$[B_1, B_2] = 0$、$[B_i, B_i^\dagger] = 0$ が自動的に成り立つ。$(B_1, B_2) \in \mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$ はインスタントンの位置 X_μ を表す。残りの条件は、I を行ベクトル、J を列ベクトルとして

$$IJ = 0, \qquad |I|^2 - |J|^2 = 0 \tag{5.8}$$

を $U(1)$ で割ることである。$N=2$ の場合、この「中心を除いた部分」は $\mathbb{C}^2/\mathbb{Z}_2$ と同型であることが知られており、BPST 解から直接求めた $(\mathbb{R}^4\setminus\{0\})/\mathbb{Z}_2$ に（原点 $I=J=0$ を加えて）一致する。原点は $U(1)$ が自由に作用しない点であり、小インスタントンの特異点に対応する。

【注】 ADHM 構成法は、弦理論の D ブレーンの描像を用いると非常に直感的に理解できる。N 枚の D3 ブレーンと k 枚の D(-1) ブレーンからなる系を考える。D3 ブレーン上のゲージ群は $U(N)$ であり、D(-1) ブレーンは D3 ブレーンの中に溶け込んだインスタントンとして解釈される。このとき、B_1, B_2 は D(-1)–D(-1) 弦（D(-1) ブレーンの位置）、I, J は D(-1)–D3 弦の励起であり、D(-1) ブレーン上の 0 次元の行列模型の真空条件（D 項条件 $\mu_{\mathbb{R}} = 0$ と F 項条件 $\mu_{\mathbb{C}} = 0$）が、まさに ADHM 方程式に他ならない。$U(k)$ は D(-1) ブレーン上のゲージ群である。

5.4　指数定理とモジュライの次元

第 3 章で議論した変形理論とコホモロジーの枠組みを用いて、インスタントンのモジュライ空間の次元を変形理論の側から確認しよう。以下では数学の文献に合わせて、インスタントンを ASD 接続（$F^+ \equiv \frac{1}{2}(F + *F) = 0$）として扱う（向きを反転すれば SD と ASD は入れ替わるので、一般性は失われない）。微小変形 $A \to A + \delta A$ が ASD 条件を保つための線形化方程式は、曲率の自己双対部分（自己双対 2 形式の空間 Ω^2_+）への射影を用いて記述される。

【注】 F^+ の微小変化を計算すると、$F(A+\delta A) = F(A) + d_A\delta A + \mathcal{O}(\delta A^2)$（第 3 章）より

$$(F(A+\delta A))^+ = F^+ + (d_A\delta A)^+ + \mathcal{O}(\delta A^2)$$

となる。背景は ASD であるため $F^+ = 0$。したがって、物理的な変形 δA は、線形化方程式 $d_A^+\delta A \equiv (d_A\delta A)^+ = 0$ とゲージ固定条件 $d_A^*\delta A = 0$ を満たす。

すなわち、変形は次の **Atiyah–Hitchin–Singer (AHS) 複体**

$$0 \to \Omega^0(\mathrm{ad}P) \xrightarrow{d_A} \Omega^1(\mathrm{ad}P) \xrightarrow{d_A^+} \Omega^2_+(\mathrm{ad}P) \to 0 \tag{5.9}$$

の 1 次のコホモロジー H^1_A で記述される。これが複体であることは、$d_A^+ d_A \epsilon = [F^+, \epsilon] = 0$（第 3 章の $d_A^2 = [F, \cdot]$）から従う。コホモロジー群を H^0_A, H^1_A, H^2_A とする。

- H^0_A：既約な接続（大域的ゲージ対称性を持たない接続）では $H^0_A = 0$ である。
- H^2_A：$M = S^4$ のように、Weyl 曲率の自己双対部分がゼロで正のスカラー曲率を持つ多様体上では、Weitzenböck の公式を用いた消滅定理により $H^2_A = 0$（変形の障害がない）が証明される。一般の 4 次元多様体では $H^2_A \neq 0$ となりうる。

この 2 条件が成り立つとき、モジュライ空間は滑らかで、その次元は H^1_A の次元、すなわち指数そのものである。

$$\dim \mathcal{M}_{N,k} = \mathrm{ind}(D_{AHS}) = \dim H^1_A - \dim H^0_A - \dim H^2_A \tag{5.10}$$

第 3 章の次元公式（定理 3.5.1）を S^4（$b_1 = b_2^+ = 0$）に適用すると、次の有名な公式を得る。

$$\dim \mathcal{M}_{N,k} = 4Nk - (N^2 - 1) \tag{5.11}$$

$SU(2)$、$k = 1$ の場合、$4 \times 2 \times 1 - 3 = 5$ となり、BPST 解の位置とサイズの数（$4 + 1$）に一致する。無限遠での大域的ゲージ回転（フレーミング）の自由度 $\dim SU(2) = 3$ を加えると、フレーム付きモジュライの次元 $8 = 4Nk$ となり、ADHM 構成からの数え上げとも一致する。なお、$N > 2k$ では既約なインスタントンは存在せず（すべての解が $SU(2k)$ 以下の部分群に埋め込まれる）、上の公式は既約な解が存在する範囲で意味を持つ。

5.5　小インスタントン極限と Uhlenbeck コンパクト化

モジュライ空間 $\mathcal{M}_k$ は、一般にコンパクトではない。BPST インスタントンのパラメータにおける「サイズ」ρ を思い出そう。$\rho \to 0$ の極限を考えるとどうなるだろうか。

この極限では、インスタントンの作用密度 $\mathrm{Tr}(F_{\mu\nu}F_{\mu\nu})$ が一点 X_μ にデルタ関数的に集中していく。これを**小インスタントン極限（Small instanton limit）**と呼ぶ。ゲージ場は中心点 X_μ で発散し、滑らかな接続ではなくなってしまうため、この極限の配位は本来のモジュライ空間（滑らかな接続の商空間）の外側に出てしまう。

モジュライ空間を閉じた空間（コンパクトな空間）として扱うためには、このような特異な配位をモジュライ空間の境界として「付け加える」必要がある。Karen Uhlenbeck は、エネルギーが点に集中する現象（bubbling 現象）を厳密に定式化した。

Theorem 5.5.1: Uhlenbeck のコンパクト性定理

M をコンパクトな 4 次元 Riemann 多様体とし、A_n をインスタントン数 k のインスタントンの列とする。このとき部分列をとれば、有限個の点 $x_1,\dots,x_l \in M$（重複を許す、$0 \le l \le k$）と、インスタントン数 $k-l$ のインスタントン A_∞ が存在して、

1. $M \setminus \{x_1,\dots,x_l\}$ 上で、A_n はゲージ変換を除いて A_∞ に収束する。
2. 作用密度は測度として $\mathrm{Tr}(F_{A_n}^2) \to \mathrm{Tr}(F_{A_\infty}^2) + 8\pi^2 \sum_{i=1}^{l} \delta_{x_i}$（規格化は (5.2) と同じ）に収束する。すなわち、各点には 1 単位分のインスタントン作用が集中する。

したがって、モジュライ空間の閉包を

$$\overline{\mathcal{M}}_k \subset \bigsqcup_{l=0}^{k} \mathcal{M}_{k-l} \times \mathrm{Sym}^l(M)$$

の中にとると、これはコンパクトとなる（**Uhlenbeck コンパクト化**）。

■例：S^4 上の $k=1$ インスタントン　$\mathcal{M}_1(S^4) \cong \mathbb{H}^5$（開いた 5 次元球体）であった。サイズ $\rho \to 0$ の極限では、インスタントンは位置 X の 1 点に集中し、A_∞ は自明な接続（$k=0$）となる。$\mathcal{M}_0$ は 1 点なので、付け加えられる境界は $\mathcal{M}_0 \times \mathrm{Sym}^1(S^4) = S^4$ であり、

$$\overline{\mathcal{M}}_1(S^4) \cong \overline{B^5}, \qquad \partial\overline{B^5} = S^4 \tag{5.12}$$

すなわち閉じた 5 次元球体となる。境界の各点は「どこに集中したか」を表す時空の点そのものであり、モジュライ空間の境界から時空 M が再構成される。Donaldson はこの事実を用いて、4 次元多様体のトポロジーに関する深い定理を証明した。

【注】 弦理論において、小インスタントン極限は極めて劇的な物理現象として現れる。Witten は、$SO(32)$ ヘテロティック弦理論（およびそれと双対なタイプ I 弦理論）を K3 曲面にコンパクト化した際、ゲージ群のインスタントンのサイズ ρ がゼロになる極限で、新たな $Sp(1)$ ゲージ対称性と質量ゼロのハイパー多重項が出現することを示した（タイプ I 側では、小インスタントンは D5 ブレーンとして記述される）。$E_8 \times E_8$ ヘテロティック弦理論の場合には、小インスタントンは M5 ブレーンとして解釈され、新たなテンソル多重項が出現する（小インスタントン転移）。

D3/D(-1) の描像では、$\rho \to 0$ は D(-1) ブレーンが D3 ブレーンから離れてバルクへ逃げていくことができる点（ADHM データで $I = J = 0$ となる点）に対応している。ADHM 方程式の $\mu_{\mathbb{R}} = 0$ を $\mu_{\mathbb{R}} = \zeta \cdot 1$（$\zeta > 0$ は FI パラメータ、弦理論では B 場）に変形すると、この特異点は解消され、モジュライ空間は滑らかになる（非可換インスタントン）。モジュライ空間の特異点や境界は、弦理論においては「新しい軽い自由度」が出現する物理的ポイントに他ならない。

このインスタントンのモジュライ空間上の積分（Donaldson 不変量など）は、物理的には位相的場の理論（Topological Field Theory, TFT）における経路積分の厳密な評

価に対応する。Witten は、$\mathcal{N} = 2$ 超対称 Yang–Mills 理論を「トポロジカル・ツイスト」することで、Donaldson 不変量が経路積分によって記述できることを示し、さらに Seiberg–Witten 理論を用いてそれをより計算の容易な可換ゲージ理論のモジュライ（モノポール方程式の解空間）へと双対変換してみせた。

次章では、動的なゲージ場ではなく、スカラー場のポテンシャルの平坦な方向によって生じる「真空のモジュライ」と自発的対称性の破れについて、超対称性ゲージ理論を題材に詳述していく。

第 6 章

真空のモジュライ：自発的対称性の破れ

場の量子論において、系の状態を決定する最も基本的な対象は「真空（Vacuum）」である。通常、ポテンシャルの最小値（真空）は孤立した一点として存在するが、理論に連続的な対称性がある場合、あるいは超対称性のような特殊な構造が存在する場合、同じエネルギーを持つ真空が連続的に縮退することがある。この「真空の連続的な縮退の空間」こそが、物理学に現れる最も直接的なモジュライ空間の例である。

本章では、スカラー場の真空期待値によって張られる「真空のモジュライ空間」の幾何学が、低エネルギー有効理論における南部・ゴールドストーン（Nambu–Goldstone, NG）ボソンのダイナミクスをどのように決定づけるのかを、非線形シグマ模型と超対称性の枠組みから見ていく。第 2 章の群作用と商空間の理論が、ここでは「対称性の破れ」と「ゲージ対称性による商」という 2 つの形で現れる。

6.1　スカラー場のポテンシャルと平坦な方向

D 次元ミンコフスキー時空における N 個の実スカラー場 $\phi = (\phi^1, \dots, \phi^N)$ の系を考える。計量の符号規約は $(-+++)$ を採用する。作用は以下のように書かれる。

$$S = \int d^D x \left(-\frac{1}{2} \eta^{\mu\nu} \partial_\mu \phi^i \partial_\nu \phi^j \delta_{ij} - V(\phi) \right) \tag{6.1}$$

エネルギー密度は $\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}(\nabla\phi)^2 + V(\phi)$ であるから、古典的なエネルギーを最小にする配位は、場が時空的に一様（$\partial_\mu \phi = 0$）で、かつポテンシャル $V(\phi)$ が最小値をとるものである。エネルギーの原点を調整して $V_{\min} = 0$ としよう。

Definition 6.1.1: 真空のモジュライ空間

ポテンシャル $V \geq 0$ の零点集合

$$\mathcal{M}_{\text{vac}} = \{ v \in \mathbb{R}^N \mid V(v) = 0 \}$$

を（古典的な）**真空のモジュライ空間**と呼ぶ。$\mathcal{M}_{\text{vac}}$ が正の次元を持つとき、その接方向を**平坦な方向（flat direction）**という。理論にゲージ対称性がある場合には、さらにゲージ変換で移り合う真空を同一視する（6.4 節）。

平坦な方向に沿って場を動かしてもエネルギーは変わらないので、その方向の揺らぎは質量を持たない。実際、真空 v のまわりで $\phi = v + \delta\phi$ と展開すると、質量行列は $M^2_{ij} = \partial_i \partial_j V(v)$ であり、$\mathcal{M}_{\mathrm{vac}}$ に沿った曲線 $v(t)$ を $V(v(t)) = 0$ について 2 回微分すれば $M^2_{ij} \dot{v}^i \dot{v}^j = 0$ を得る。すなわち、**真空のモジュライ空間の接方向は質量ゼロのスカラー場を与える**。これは第 3 章で見た「モジュライの接空間 = 零モード」の、最も簡単な実現である。

6.2　自発的対称性の破れとコセット空間 G/H

平坦な方向が生じる典型的な理由は、系が持つ連続的な大域的対称性 G が自発的に破れることである。ポテンシャル $V(\phi)$ がコンパクトなリー群 G の作用のもとで不変（$V(g \cdot \phi) = V(\phi)$）であるとする。このとき $V(v) = 0$ ならば $V(g \cdot v) = 0$ なので、G は真空のモジュライ空間 $\mathcal{M}_{\mathrm{vac}}$ に作用する。ある真空 v を選んだとき、その固定部分群

$$H = G_v = \{ h \in G \mid h \cdot v = v \} \tag{6.2}$$

を**未破れの対称性群**と呼ぶ。$H \neq G$ のとき、対称性 G は H に**自発的に破れている**という。

Proposition 6.2.1: 真空の軌道とコセット空間

真空 v の G-軌道は、コセット空間 G/H と微分同相である：

$$G \cdot v \cong G/H, \qquad \dim(G \cdot v) = \dim G - \dim H$$

特に、G が真空の集合に推移的に作用する（すべての真空が対称性で移り合う）ならば $\mathcal{M}_{\mathrm{vac}} \cong G/H$ である。

これは第 2 章の軌道・固定部分群定理そのものである。（H は閉部分群なので、H の G への右からの作用は自由かつ固有であり、商多様体定理により G/H は滑らかな多様体となる。）一般には、$\mathcal{M}_{\mathrm{vac}}$ は対称性で移り合わない複数の軌道の和となりうる。対称性で説明されない平坦な方向は**偶発的（accidental）**な平坦方向と呼ばれ、後述するように量子補正によって持ち上がることが多い。

Theorem 6.2.1: Goldstone の定理

Lorentz 不変な理論において、連続的な大域的対称性 G が H に自発的に破れているとき、$\dim G - \dim H$ 個の質量ゼロのスカラー粒子（**NG ボソン**）が存在する。

古典論の範囲では、これは前節の議論と命題の組み合わせから直ちに従う：軌道 $G \cdot v$ は平坦な方向であり、その次元は $\dim G - \dim H$ である。すなわち幾何学的には、**NG ボソンは真空のモジュライ空間 G/H の局所座標**に他ならない。

■例：$U(1)$ とメキシカンハット　複素スカラー場 ϕ とポテンシャル $V = \lambda(|\phi|^2 - v^2)^2$ を考える。$G = U(1)$ は位相回転 $\phi \to e^{i\alpha}\phi$ で作用する。真空は $|\phi| = v$ の円周であり、$H = \{1\}$、$\mathcal{M}_{\mathrm{vac}} \cong U(1)/\{1\} \cong S^1$ となって、NG ボソンは 1 個（位相の揺らぎ）である。一方、原点 $\phi = 0$ は固定部分群 $U(1)$ を持つ点であり（第 2 章の $U(1) \curvearrowright \mathbb{C}$ の例）、ここでは $V > 0$ なので真空ではない。

■例：$O(N)$ 模型　N 成分の実スカラー場とポテンシャル $V=\lambda(\phi^T\phi-v^2)^2$ を考える。$G=O(N)$ であり、真空は半径 v の球面 S^{N-1}、真空 $v=(0,\dots,0,v)$ の固定部分群は $H=O(N-1)$ である。

$$\mathcal{M}_{\rm vac}\cong O(N)/O(N{-}1)\cong S^{N-1},\qquad \dim G{-}\dim H=\frac{N(N-1)}{2}-\frac{(N-1)(N-2)}{2}=N{-}1 \tag{6.3}$$

であり、NG ボソンは $N-1$ 個である。

■例：QCD のパイオン　2 フレーバーの質量ゼロのクォークを持つ QCD は、カイラル対称性 $G=SU(2)_L\times SU(2)_R$ を持ち、クォーク凝縮 $\langle\bar q_L q_R\rangle\neq 0$ によって対角部分群 $H=SU(2)_V$ に破れる。

$$\mathcal{M}_{\rm vac}\cong\frac{SU(2)_L\times SU(2)_R}{SU(2)_V}\cong SU(2)\cong S^3 \tag{6.4}$$

であり、$\dim G-\dim H=6-3=3$ 個の NG ボソンが 3 つのパイオン $\pi^\pm,\pi^0$ である。$SU(2)\cong S^3$ であるから、これは $N=4$ の $O(N)$ 模型と同じ真空のモジュライ空間を持つ。

【注】 NG モードの取り出し方を具体的に見ておこう。微小な場の揺らぎを、真空 v に直交する方向（質量を持つモード χ）と、モジュライ空間の接空間方向（質量ゼロの NG モード π^a）に分解する。

$$\phi(x)=e^{i\pi^a(x)T^a}\big(v+\chi(x)\big)$$

ここで T^a は破れた対称性の生成子（$\mathfrak{g}$ のうち $\mathfrak{h}$ に含まれない部分、$\dim G-\dim H$ 個）であり、実スカラー場に対しては純虚数の反対称行列にとる。$h\in H$ は v を動かさないので、$e^{i\pi^aT^a}$ は G/H の点を指定している。低エネルギー極限において、重いモード χ は積分消去され、系は NG ボソン $\pi^a(x)$ のみで記述される。$\pi^a(x)$ を時空からモジュライ空間 G/H への写像とみなしたものが、次に述べる非線形シグマ模型である。

6.3　非線形シグマ模型の標的空間としてのモジュライ

低エネルギー有効理論において、時空の各点 x にモジュライ空間 $\mathcal{M}_{\rm vac}$ の一点を割り当てる写像を考える。

Definition 6.3.1: 非線形シグマ模型

Riemann 多様体 $(\mathcal{M},g)$ に対し、写像 $\Phi:\mathbb{R}^{1,D-1}\to\mathcal{M}$ を場とし、作用

$$S_{\rm eff}=\int d^Dx\left(-\frac{1}{2}g_{ij}(\Phi)\partial_\mu\Phi^i\partial^\mu\Phi^j\right)$$

で定まる場の理論を**非線形シグマ模型（Non-linear Sigma Model, NLSM）**、$\mathcal{M}$ をその**標的空間**と呼ぶ。

運動方程式は $\partial^\mu\partial_\mu\Phi^i+\Gamma^i_{jk}(\Phi)\partial^\mu\Phi^j\partial_\mu\Phi^k=0$ であり、これは標的空間の測地線の方程式の場の理論版（調和写像の方程式）である。弦理論における世界面上の作用も、標的空間（時空）に対する 2 次元の NLSM に他ならない。

真空のモジュライ空間の場合、計量 g_{ij} は元の高エネルギー理論の運動項から自然に誘導される。元の場を真空多様体上に制限して $\phi(\Phi(x))$ と書き、運動項に代入すればよい。

【注】 簡単のため $O(N)$ 模型を考え、球面 S^{N-1} の局所座標（NG ボソン）を θ^A $(A=1,\dots,N-1)$ とす

る。元の場を $\phi(\theta^A(x))$ と書き、連鎖律 $\partial_\mu \phi^i = \frac{\partial \phi^i}{\partial \theta^A}\partial_\mu \theta^A$ を運動項に代入すると、

$$\begin{aligned} S_{\text{kin}} &= \int d^D x \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \partial_\mu \phi^i \partial^\mu \phi^i \right) \\ &= \int d^D x \left(-\frac{1}{2} \left(\sum_{i=1}^{N} \frac{\partial \phi^i}{\partial \theta^A} \frac{\partial \phi^i}{\partial \theta^B} \right) \partial_\mu \theta^A \partial^\mu \theta^B \right) \end{aligned}$$

となる。括弧の中身が、モジュライ空間上に誘導された計量

$$g_{AB}(\theta) = \sum_{i=1}^{N} \frac{\partial \phi^i}{\partial \theta^A} \frac{\partial \phi^i}{\partial \theta^B}$$

であり、これは $\mathbb{R}^N$ の平坦な計量を半径 v の球面に制限したもの、すなわち $g = v^2\, g_{SN-1}$（g_{SN-1} は単位球面の標準計量）である。

パイオンの場合には、$U(x) = \exp(i\pi^a \sigma^a / f_\pi) \in SU(2)$ を用いて

$$S_{\text{eff}} = \int d^4 x \left(-\frac{f_\pi^2}{4} \mathrm{Tr}(\partial_\mu U^\dagger \partial^\mu U) \right) \tag{6.5}$$

と書ける。これは標的空間 $SU(2) \cong S^3$ に半径 f_π の球面の計量を入れた NLSM であり、パイオン崩壊定数 $f_\pi \simeq 92\,\text{MeV}$ がモジュライ空間の「大きさ」を与えている。

【注】 $O(4)$ 模型との対応を確認しよう。$\phi \in \mathbb{R}^4$、$|\phi| = v$ に対して $U = (\phi^4 + i\phi^a \sigma^a)/v \in SU(2)$ とおくと、$\mathrm{Tr}(\sigma^a \sigma^b) = 2\delta^{ab}$ より $\mathrm{Tr}(\partial_\mu U^\dagger \partial^\mu U) = \frac{2}{v^2} \partial_\mu \phi^i \partial^\mu \phi^i$ である。よって

$$\frac{f_\pi^2}{4} \mathrm{Tr}(\partial_\mu U^\dagger \partial^\mu U) = \frac{f_\pi^2}{2v^2} \partial_\mu \phi^i \partial^\mu \phi^i$$

であり、$f_\pi = v$ とおけば $O(4)$ 模型の運動項 $\frac{1}{2}\partial_\mu \phi^i \partial^\mu \phi^i$ に一致する。

NLSM の相互作用は、すべて標的空間の幾何学から決まる。真空の点のまわりで Riemann 正規座標をとると、計量は

$$g_{AB}(\theta) = \delta_{AB} - \frac{1}{3} R_{ACBD}\, \theta^C \theta^D + \mathcal{O}(\theta^3) \tag{6.6}$$

と展開されるので、NG ボソンの 4 点相互作用は Riemann 曲率テンソル R_{ABCD} に比例し、低エネルギーの散乱振幅は $\mathcal{O}(p^2 R)$ となる。パイオンの場合、S^3 の曲率は $1/f_\pi^2$ に比例し、これが Weinberg の低エネルギー定理 $\mathcal{A}(\pi\pi \to \pi\pi) \sim s/f_\pi^2$ を与える。つまり、「物理的な散乱」は「モジュライ空間の幾何学的な曲がり具合」によって制御されているのである。

【注】 超対称でない理論では、G/H 上のすべての点は対称性 G で互いに移り合うので、**物理的に区別できない**（どの真空を選んでも、粒子のスペクトルや相互作用は同じ）。モジュライ空間の計量も G-不変な計量に限られ、等質空間として非常に制限された形をとる。これに対し、次節で見る超対称理論の真空のモジュライ空間では、異なる点は対称性で結ばれておらず、点ごとに粒子の質量や結合定数が異なる**物理的に異なる真空**を表す。この違いが、超対称理論のモジュライ空間を豊かなものにしている。

6.4　超対称ゲージ理論とシンプレクティック商空間

対称性がゲージ化されている場合、モジュライ空間の構造ははるかに豊かになる。特に超弦理論の現象論的側面に直結する「超対称性（SUSY）ゲージ理論」における真空のモジュライ空間は、シンプレクティック商・幾何学的不変式論（GIT）商という、極めて美しい幾何学的構造を持つ。

$\mathcal{N} = 1$ 超対称性を持つ 4 次元のゲージ理論において、複素スカラー場 ϕ_i（カイラル超場のスカラー成分）のポテンシャルは F 項と D 項の和として与えられる。

$$V(\phi, \phi^\dagger) = \sum_i \left| \frac{\partial W}{\partial \phi_i} \right|^2 + \frac{1}{2} \sum_a g_a^2 (D^a)^2, \qquad D^a = \phi^\dagger T^a \phi - \xi^a \tag{6.7}$$

ここで $W(\phi)$ は正則な関数である超ポテンシャル、g_a はゲージ結合定数、ξ^a は Fayet–Iliopoulos（FI）パラメータ（ゲージ群の $U(1)$ 因子に対してのみ導入可能）である。V は 2 乗の和なので $V \geq 0$ であり、$V = 0$ は超対称性が破れていないことと同値である。したがって、超対称な真空は次の方程式系の解として与えられる。

$$F_i^* = \frac{\partial W}{\partial \phi_i} = 0 \quad \text{(F 平坦条件)} \tag{6.8}$$

$$D^a = \phi^\dagger T^a \phi - \xi^a = 0 \quad \text{(D 平坦条件)} \tag{6.9}$$

さらにゲージ変換で移り合う解は物理的に同一であるから、真空のモジュライ空間は

$$\mathcal{M}_{\text{vac}} = \{\phi \mid F_i = 0,\ D^a = 0\}/G \tag{6.10}$$

で与えられる。

このうち、D 平坦条件 $D^a = 0$ の幾何学的意味を考えよう。スカラー場 $\phi \in \mathbb{C}^N$ にゲージ群 G がユニタリに作用しているとする。$\mathbb{C}^N$ は標準的な Kähler 形式（シンプレクティック形式）を持ち、G はこれを保つ。

Definition 6.4.1: 運動量写像とシンプレクティック商

シンプレクティック多様体 (X, ω) にリー群 G が ω を保って作用しているとする。$T^a \in \mathfrak{g}$ に対応する生成ベクトル場を V^a とする。G-同変な写像 $\mu : X \to \mathfrak{g}^*$ で、各成分が

$$d\mu^a = \iota_{V^a}\omega$$

を満たすものを**運動量写像（moment map）**と呼ぶ。$\xi \in \mathfrak{g}^*$ が G-不変なとき、

$$X /\!/_\xi G = \mu^{-1}(\xi)/G$$

を**シンプレクティック商**（Kähler 商）と呼ぶ。G が $\mu^{-1}(\xi)$ に自由に作用するとき、これは $\dim X - 2\dim G$ 次元のシンプレクティック（Kähler）多様体となる。

運動量写像は、古典力学における「対称性に付随する保存量」（Noether チャージ）の幾何学的な一般化である。例えば $\mathbb{R}^6$ 上の回転に対する運動量写像は角運動量 $\boldsymbol{L} = \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{p}$ である。物理の D 項は、まさにゲージ作用の運動量写像に他ならない。

【注】 $\mathbb{C}^N$ のシンプレクティック形式を $\omega = \frac{i}{2}\sum_i d\phi_i \wedge d\bar{\phi}_i$ とする。エルミートな生成子 T^a による無限小変換 $\delta\phi = i\epsilon T^a \phi$ に対応する生成ベクトル場は、$\delta\bar{\phi}_i = -i\epsilon(\bar{\phi}T^a)_i$ より

$$V^a = i(T^a\phi)_i \frac{\partial}{\partial \phi_i} - i(\bar{\phi}T^a)_i \frac{\partial}{\partial \bar{\phi}_i}$$

である。ω との縮約を計算すると、

$$\iota_{V^a}\omega = \frac{i}{2}\sum_i \left[V^a(\phi_i)\, d\bar{\phi}_i - V^a(\bar{\phi}_i)\, d\phi_i\right] = \frac{i}{2}\sum_i \left[i(T^a\phi)_i\, d\bar{\phi}_i + i(\bar{\phi}T^a)_i\, d\phi_i\right]$$

$$= -\frac{1}{2}\, d\left(\bar{\phi}T^a\phi\right)$$

となる（T^a のエルミート性を用いた）。したがって運動量写像は

$$\mu^a = -\frac{1}{2}\,\phi^\dagger T^a \phi \quad (+\ \text{定数})$$

であり、規格化と符号の規約（ω の符号や μ の定義の符号）を除いて物理の D^a に一致する。定数の不定性がちょうど FI パラメータ ξ^a に対応している（G-同変性から、定数は $\mathfrak{g}^*$ の G-不変な元、すなわち $U(1)$ 因子に限られる）。

したがって、超ポテンシャルがない場合（$W = 0$）、真空のモジュライ空間 (6.10) はシンプレクティック商

$$\mathcal{M}_{\mathrm{vac}} = \mu^{-1}(\xi)/G = \mathbb{C}^N /\!/_\xi\, G \tag{6.11}$$

に他ならない。

6.4.1　複素化されたゲージ群による GIT 商

驚くべきことに、このシンプレクティック商は、実数の制約 $D^a = 0$ を解かずに、元の空間を**複素化されたゲージ群** $G^{\mathbb{C}}$ で直接割ることでも得られる。ここで $G^{\mathbb{C}}$ とは、例えば $G = U(1)$ なら $\mathbb{C}^\times$、$G = SU(N)$ なら $SL(N,\mathbb{C})$ のことである。超ポテンシャル W は正則でゲージ不変なので、自動的に $G^{\mathbb{C}}$ 不変であり、F 平坦条件は $G^{\mathbb{C}}$ の作用で保たれる。

$G^{\mathbb{C}}$ の軌道は一般に閉じていない（第 2 章の双曲的スケーリングの例を思い出そう：$\mathbb{C}^\times$ の作用 $t\cdot(x,y) = (tx, t^{-1}y)$ はまさに $U(1)$ の複素化である）ので、単純に $G^{\mathbb{C}}$ で割るとハウスドルフでない空間ができてしまう。これを解消するのが「安定性」の概念である。$G^{\mathbb{C}}$ の軌道が閉じている点を**多重安定（polystable）**、軌道の閉包が原点を含まない点を**半安定（semistable）**と呼び（FI パラメータがある場合は、それに応じて安定性の条件を修正する）、半安定な点の軌道を「閉包が交わるならば同一視する」ことで得られる商を GIT 商 $X/\!/G^{\mathbb{C}}$ と書く。

Theorem 6.4.1: Kempf–Ness

$X \subset \mathbb{C}^N$ を $G^{\mathbb{C}}$-不変な（F 平坦条件で定まる）アフィン代数多様体とする。このとき

1. $G^{\mathbb{C}}$ の閉じた軌道は、$\mu^{-1}(\xi)$ とちょうど 1 つの G-軌道で交わる。
2. その結果、自然な同型
$$\mu^{-1}(\xi)/G \;\cong\; X^{\mathrm{ss}}/\!/G^{\mathbb{C}}$$
が成り立つ（X^{ss} は ξ に応じた半安定点の集合）。
3. 特に $\xi = 0$ のとき、右辺はゲージ不変な正則多項式全体のなす環 $\mathbb{C}[X]^G$ によって定まるアフィン多様体であり、その座標はゲージ不変な正則多項式で与えられる。

この定理の物理的な意味は極めて大きい。我々は通常、実数の制約方程式 $D^a = 0$ を解いてから実ゲージ群 G で割るという面倒な手続きを強いられる。しかしこの定理によれば、「D 項条件の代わりに、より大きな複素化されたゲージ対称性 $G^{\mathbb{C}}$ で分類してよい」のである。これにより、超対称ゲージ理論の真空のモジュライは、**ゲージ不変な正則演算子（メソンやバリオン）の真空期待値を座標とし、それらの間の代数的関係式（および F 項条件）で定義される代数多様体**として決定される。

■例：$U(1)$ と電荷 ±1 の 2 つの場　$G = U(1)$、電荷 $+1$ と -1 の場 ϕ_+, ϕ_-、$W = 0$、$\xi = 0$ とする。D 平坦条件は $|\phi_+|^2 = |\phi_-|^2$ である。ゲージ不変な正則多項式は $M = \phi_+\phi_-$

で生成され、関係式はないので、

$$\mathcal{M}_{\mathrm{vac}} \cong \mathbb{C} \quad (\text{座標 } M = \phi_+\phi_-) \tag{6.12}$$

となる。原点 $M = 0$ では $U(1)$ が破れずに残り、そこでは質量ゼロのゲージ場という新たな自由度が現れる（第 3 章で述べた「特異点に新たな軽い自由度が現れる」ことの例）。

【注】 シンプレクティック商の側から次元を確認しよう。$\mathbb{C}^2$ は実 4 次元、D 平坦条件 $|\phi_+|^2 - |\phi_-|^2 = 0$ が実 1 本、$U(1)$ による商が実 1 次元を減らすので、$4 - 1 - 1 = 2$（複素 1 次元）となり、$M \in \mathbb{C}$ と一致する。実際、$|\phi_+| = |\phi_-| = r$ とし、ゲージ変換 $(\phi_+, \phi_-) \to (e^{i\alpha}\phi_+, e^{-i\alpha}\phi_-)$ で ϕ_+ を実正にとれば、残る自由度は r と ϕ_- の位相であり、これはちょうど $M = r^2 e^{i\arg\phi_-}$ を与える。GIT 商の側では、$\mathbb{C}^\times$ の作用 $(\phi_+, \phi_-) \to (t\phi_+, t^{-1}\phi_-)$ は第 2 章の双曲的スケーリングそのものであり、閉じた軌道は双曲線 $\phi_+\phi_- = M \neq 0$ と原点のみである。開半軸（$\phi_+ = 0$ または $\phi_- = 0$ で原点以外）は閉包が原点を含み、原点と同一視される。

■例：$\mathbb{CP}^{N-1}$ と FI パラメータ　$G = U(1)$、電荷 $+1$ の N 個の場 $\phi_1, \ldots, \phi_N$、$W = 0$ とし、FI パラメータ ξ を入れる（4 次元ではゲージ・アノマリーのため不整合であるが、2 次元の $\mathcal{N} = (2,2)$ 理論、すなわち Witten の**ゲージ化線形シグマ模型**として意味を持つ）。D 平坦条件は

$$\sum_{i=1}^{N} |\phi_i|^2 = \xi \tag{6.13}$$

である。

- $\xi > 0$：解は半径 $\sqrt{\xi}$ の球面 S^{2N-1} であり、$U(1)$ で割って $\mathcal{M}_{\mathrm{vac}} = S^{2N-1}/U(1) \cong \mathbb{CP}^{N-1}$（第 2 章の Hopf 束の例）。GIT 商の側では、$\xi > 0$ の安定性条件は「$\phi \neq 0$」であり、$(\mathbb{C}^N \setminus \{0\})/\mathbb{C}^\times = \mathbb{CP}^{N-1}$ を与える。ξ は $\mathbb{CP}^{N-1}$ の大きさ（Kähler 類）を決める。
- $\xi = 0$：解は原点のみで、$\mathcal{M}_{\mathrm{vac}}$ は 1 点。
- $\xi < 0$：解が存在せず、超対称性が自発的に破れる。

このように、FI パラメータは真空のモジュライ空間の形そのものを変える。低エネルギーでは、この理論は標的空間 $\mathbb{CP}^{N-1}$ の NLSM となる。電荷を適切に選べば、同じ構成で Calabi–Yau 多様体を標的空間とする NLSM が得られ（第 7 章）、ξ は Calabi–Yau 多様体の Kähler モジュライとなる。

■例：超対称 QCD のメソン　$G = SU(N_c)$ で、基本表現の Q^i と反基本表現の $\tilde{Q}_{\tilde{\imath}}$ をそれぞれ N_f 個持ち、$W = 0$ とする（**超対称 QCD**）。$N_f < N_c$ の場合、ゲージ不変な正則多項式は**メソン**

$$M^i{}_{\tilde{\jmath}} = \tilde{Q}_{\tilde{\jmath}} Q^i \qquad (N_f \times N_f \text{ 行列}) \tag{6.14}$$

で生成され、関係式はない。したがって古典的な真空のモジュライ空間は $\mathcal{M}_{\mathrm{vac}} \cong \mathbb{C}^{N_f^2}$ である。

【注】 次元を数えて確認しよう（複素次元）。場の数は $2N_cN_f$ である。$N_f < N_c$ のとき、一般の点でゲージ群は $SU(N_c) \to SU(N_c - N_f)$ と破れ、破れた生成子の数は

$$(N_c^2 - 1) - \big((N_c - N_f)^2 - 1\big) = 2N_cN_f - N_f^2$$

である。GIT 商では $G^{\mathbb{C}}$ の（破れた方向の）次元だけ複素次元が減るので、

$$\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{M}_{\mathrm{vac}} = 2N_cN_f - (2N_cN_f - N_f^2) = N_f^2$$

となり、メソンの成分数 N_f^2 に一致する。$N_f \geq N_c$ では、メソンに加えて**バリオン** $B = \epsilon Q^{N_c}$、$\tilde{B} = \epsilon \tilde{Q}^{N_c}$ が現れ、それらの間に関係式（例えば $N_f = N_c$ では $\det M = B\tilde{B}$）が生じる。

6.5　量子効果とモジュライ空間の運命

ここまでの議論は古典的なものであった。量子効果を取り入れると、真空のモジュライ空間は次のような運命をたどる。

- **対称性で保護された平坦方向**：G/H の方向は量子効果でも持ち上がらない（対称性によって、すべての点のエネルギーが等しいことが保証される）。ただし時空次元 $D = 2$ では、Coleman–Mermin–Wagner の定理により連続対称性の自発的破れは起こらない。NG ボソンの揺らぎが赤外で発散し、真空は G/H 上の一点に留まれず、量子論的にはモジュライ空間全体にわたって「平均化」される。
- **偶発的な平坦方向（超対称でない理論）**：対称性で保護されていない平坦方向は、一般にループ補正（Coleman–Weinberg ポテンシャル）によって持ち上がる。
- **超対称理論の平坦方向**：超ポテンシャルは摂動論では補正を受けない（**非繰り込み定理**）ため、平坦方向は摂動論の全次数で保たれる。しかし非摂動効果によって変化しうる。例えば $N_f < N_c$ の超対称 QCD では、インスタントン（第 5 章）などの効果により Affleck–Dine–Seiberg 超ポテンシャル

$$W_{\mathrm{ADS}} = (N_c - N_f)\left(\frac{\Lambda^{3N_c - N_f}}{\det M}\right)^{1/(N_c - N_f)} \tag{6.15}$$

が生成され、古典的なモジュライ空間は完全に持ち上がる（ポテンシャルが $\det M \to \infty$ に向かって転がり落ち、安定な真空が存在しない）。$N_f = N_c$ では、古典的な関係式 $\det M - B\tilde{B} = 0$ が量子的に $\det M - B\tilde{B} = \Lambda^{2N_c}$ と**変形**され、原点の特異点が解消される（Seiberg）。

- $\mathcal{N} = 2$ **超対称性**：さらに強い超対称性があると、モジュライ空間は持ち上がらず、その上の計量（有効結合定数）が厳密に決定できる。第 1 章で触れた Seiberg–Witten 理論では、$SU(2)$ 理論のクーロン枝 $u = \langle \mathrm{Tr}\Phi^2 \rangle \in \mathbb{C}$ の上で、古典的な特異点 $u = 0$ が量子的には 2 つの特異点 $u = \pm\Lambda^2$ に分裂し、そこでモノポールやダイオンが質量ゼロになる。

いずれの場合も、モジュライ空間の特異点や変形は、「新しい軽い自由度」の出現や「強結合のダイナミクス」と直結している。これは第 5 章のインスタントンのモジュライ空間で見た状況と全く同じ構造であり、モジュライ空間の幾何学が物理を支配するという本講義の主題を、もう一つの角度から示している。

次章では、超弦理論のコンパクト化において余剰次元の形そのものが真空のモジュライとなる状況、すなわち Calabi–Yau 多様体の複素構造と Kähler 構造のモジュライを扱う。

第 7 章

弦理論・Calabi–Yau 多様体：複素構造・Kähler 構造

超弦理論は 10 次元時空においてのみ無矛盾に定式化される。我々が住む 4 次元時空を導出するためには、余分な 6 次元の空間を微小なコンパクト空間 X に丸め込む「コンパクト化（Compactification）」を行う必要がある。このとき、余剰次元空間 X の幾何学的形状が、4 次元有効理論の物理（ゲージ群、物質場の世代数、結合定数）を決定づける。

本章では、4 次元に超対称性を残すコンパクト化の条件として現れる **Calabi–Yau（カラビ・ヤウ）多様体**を導入し、その幾何学的な変形（モジュライ）が低エネルギーにおいてどのように質量ゼロのスカラー場として振る舞うのかを解説する。第 3 章の変形理論（小平・スペンサー理論、Bogomolov–Tian–Todorov の定理）と第 6 章の真空のモジュライ・非線形シグマ模型が、ここで一つに合流する。

7.1　超対称性の保存と Calabi–Yau 多様体

10 次元の時空 M^{10} が、4 次元のミンコフスキー時空 $M^{1,3}$ と 6 次元のコンパクトなリーマン多様体 X の直積 $M^{10} = M^{1,3} \times X$ に分解していると仮定する（フラックスなどの背景場はゼロとする）。このとき、4 次元において超対称性が破れずに残るための条件は、10 次元の超対称性変換のパラメータであるスピノル場 ϵ が、背景時空において変換を生成しても場を変えないこと、すなわちフェルミオン（グラビティーノ）の変分 $\delta\psi_M = \nabla_M \epsilon + \dots$ がゼロになることである。$\epsilon = \zeta \otimes \eta$（$\zeta$ は 4 次元の定数スピノル）と分解すると、内部空間 X 上のスピノル η に対する以下の方程式が得られる。

$$\nabla_m \eta = 0 \quad (m = 1, \dots, 6) \tag{7.1}$$

すなわち、内部空間 X 上に**共変定数なスピノル**が存在しなければならない。

Proposition 7.1.1: 共変定数スピノルの帰結

コンパクトな 6 次元 Riemann 多様体 X 上に、恒等的にゼロでない共変定数スピノル η が存在するならば、

1. X は Ricci 平坦である：$R_{mn} = 0$。
2. X のホロノミー群は $SU(3)$ の部分群である。

3. $J_m{}^n = i\,\eta^\dagger \Gamma_m{}^n \eta$（適当に規格化）は共変定数な複素構造を定め、$X$ は Kähler 多様体となる。

【注】 (1) $\nabla_m \eta = 0$ から交換子 $[\nabla_m, \nabla_n]\eta = 0$ が従う。スピノルに対する共変微分の交換関係は、リーマン曲率テンソルを用いて

$$[\nabla_m, \nabla_n]\eta = \frac{1}{4} R_{mnpq} \Gamma^{pq} \eta = 0$$

と書ける。ここで Γ^p は 6 次元のガンマ行列である。この式に左から Γ^n を掛け、Clifford 代数の関係式 $\Gamma^n \Gamma^{pq} = \Gamma^{npq} + \delta^{np}\Gamma^q - \delta^{nq}\Gamma^p$ と第一 Bianchi 恒等式 $R_{m[npq]} = 0$（これにより Γ^{npq} の項が消える）を用いると、

$$R_{mp}\Gamma^p \eta = 0$$

を得る。各 m についてベクトル $v_p = R_{mp}$ をとると $v_p \Gamma^p \eta = 0$ であり、さらに $v_q \Gamma^q$ を掛けて $\{\Gamma^p, \Gamma^q\} = 2\delta^{pq}$ を用いると $v_p v_p\, \eta = 0$ となる。$\eta \neq 0$ なので $v = 0$、すなわち $R_{mp} = 0$ である。

(2) 並行移動で不変なスピノルが存在することは、ホロノミー群がそのスピノルを固定する部分群に含まれることを意味する。$SO(6) \cong SU(4)/\mathbb{Z}_2$ のスピノル表現はカイラルな $\mathbf{4}$ であり、$\mathbf{4}$ の 1 つのベクトルを固定する $SU(4)$ の部分群は $SU(3)$ である。

ホロノミー群がちょうど $SU(3)$ となるコンパクトな Kähler 多様体を **Calabi–Yau 3-fold（CY3）**と呼ぶ。（ホロノミーがより小さい T^6 や $K3 \times T^2$ は、より多くの共変定数スピノルを持ち、より多くの超対称性を残す。）CY3 の存在を保証し、その計量を制御するのが次の定理である。

Theorem 7.1.1: Calabi 予想（Yau の定理）

X をコンパクトな Kähler 多様体で、第一 Chern 類が $c_1(X) = 0$（実係数で）であるものとする。このとき、X の各 Kähler 類 $[J] \in H^{1,1}(X)$ の中に、Ricci 平坦な Kähler 計量がただ一つ存在する。

したがって、CY3 は「$c_1 = 0$ でホロノミーがちょうど $SU(3)$ のコンパクトな Kähler 多様体」とも特徴づけられ、Ricci 平坦計量を明示的に知らなくても、複素構造と Kähler 類という位相的・代数的なデータだけで計量が決まる。この事実が、計量のモジュライを $H^{1,1}$ と $H^{2,1}$ で数えるという次節の議論を可能にしている。CY3 上には、至る所ゼロにならない正則 3 形式 $\Omega = \frac{1}{3!}\Omega_{ijk}\, dz^i \wedge dz^j \wedge dz^k$ が定数倍を除いて一意に存在する。

CY3 の Hodge 数 $h^{p,q} = \dim H^{p,q}(X)$ は、Hodge 対称性、Serre 双対性、および $h^{1,0} = h^{2,0} = 0$（ホロノミーがちょうど $SU(3)$ であることから従う）により、次の Hodge ダイアモンドにまとめられる。

$$\begin{array}{ccccccc} & & & 1 & & & \\ & & 0 & & 0 & & \\ & 0 & & h^{1,1} & & 0 & \\ 1 & & h^{2,1} & & h^{2,1} & & 1 \\ & 0 & & h^{1,1} & & 0 & \\ & & 0 & & 0 & & \\ & & & 1 & & & \end{array} \tag{7.2}$$

独立な数は $h^{1,1}$ と $h^{2,1}$ の 2 つだけであり、Euler 数は $\chi(X) = 2(h^{1,1} - h^{2,1})$ である。

■例：5 次超曲面（quintic）　$\mathbb{CP}^4$ の中の 5 次の斉次多項式の零点集合

$$X = \left\{ [z_1 : \cdots : z_5] \in \mathbb{CP}^4 \,\middle|\, P(z) = 0 \right\}, \qquad \text{例えば } P = \sum_{i=1}^{5} z_i^5 - 5\psi\, z_1 z_2 z_3 z_4 z_5 \tag{7.3}$$

は CY3 である（$\mathbb{CP}^4$ の c_1 は超平面類の 5 倍であり、5 次超曲面をとることでちょうど打ち消される）。その Hodge 数は

$$h^{1,1} = 1, \qquad h^{2,1} = 101, \qquad \chi = -200 \tag{7.4}$$

である。$h^{1,1} = 1$ は全体のサイズ（$\mathbb{CP}^4$ から誘導される Kähler 類）の 1 つだけ、$h^{2,1} = 101$ は多項式 P の係数の自由度に対応する。

【注】 $h^{2,1} = 101$ を、多項式の係数を数えることで確かめよう。5 変数の 5 次斉次単項式の数は

$$\binom{5+5-1}{5} = \binom{9}{5} = 126$$

である。一方、座標の線形変換 $GL(5,\mathbb{C})$（25 次元）で移り合う多項式は同じ多様体を定める（全体のスカラー倍も含めてちょうど $GL(5)$ で割ればよい）。よって複素構造の変形の数は $126 - 25 = 101$ であり、小平・スペンサー理論で計算される $\dim H^1(X, T_X) = h^{2,1}$ に一致する。第 2 章の言葉で言えば、複素構造のモジュライ空間は「多項式の空間を $GL(5,\mathbb{C})$ で割った商」として実現されている。

7.2　計量の変形とモジュライの分解

超弦理論において、Calabi–Yau 多様体 X の幾何学的パラメータ（サイズや形状）は定数ではなく、時空の各点 $x \in M^{1,3}$ に依存して変化するスカラー場として扱われる。これら質量ゼロのスカラー場（**モジュライ場**）を数え上げるために、X の Ricci 平坦な計量 g_{mn} の無限小変形を考えよう。

計量を $g_{mn} \to g_{mn} + \delta g_{mn}$ と変形し、変形後も Ricci 平坦性 $R_{mn}(g + \delta g) = 0$ が保たれるとする。微分同相写像による自明な変形をゲージ条件 $\nabla^m \delta g_{mn} = 0$ で取り除くと、線形化された条件は **Lichnerowicz 方程式**

$$\Delta_L \, \delta g_{mn} \equiv -\nabla^p \nabla_p \, \delta g_{mn} - 2 R_{mpnq} \, \delta g^{pq} = 0 \tag{7.5}$$

となる。これは第 3 章の「線形化方程式 + ゲージ固定 = 楕円型方程式」という構造の、重力版である。複素多様体である CY3 上では、変形テンソル δg はその添字の型によって、混合成分 $\delta g_{i\bar{j}}$ と純粋成分 $\delta g_{ij}, \delta g_{\bar{i}\bar{j}}$ に分類され、Lichnerowicz 作用素はこの分解を保つ。

Theorem 7.2.1: CY3 の計量のモジュライ

CY3 X 上の Ricci 平坦計量の（微分同相を除いた）無限小変形の空間は

$$H^{1,1}(X,\mathbb{R}) \;\oplus\; H^{2,1}(X)$$

と同型である。第 1 項（実次元 $h^{1,1}$）は Kähler 類の変形、第 2 項（複素次元 $h^{2,1}$）は複素構造の変形に対応する。さらに Bogomolov–Tian–Todorov の定理（第 3 章）により複素構造の変形には障害がなく、Kähler 類は Kähler 錐の中で自由に動かせるので、モジュライ空間は局所的に滑らかで、その次元はこれらに等しい。

7.2.1　Kähler 構造の変形（$\delta g_{i\bar{j}}$）

混合成分の変形 $\delta g_{i\bar{j}}$ は、Kähler 形式 $J = i g_{i\bar{j}} \, dz^i \wedge d\bar{z}^{\bar{j}}$ の変形 $\delta J = i \, \delta g_{i\bar{j}} \, dz^i \wedge d\bar{z}^{\bar{j}}$ に対応する。Lichnerowicz 方程式は、δJ が調和 $(1,1)$ 形式であることと同値になり、Hodge 理論により調和 $(1,1)$ 形式の空間は $H^{1,1}(X)$ と同型である。したがって、この変形の自由度は Hodge 数 $h^{1,1}$ によって数え上げられる。

物理的には、これは「Calabi–Yau 多様体の 2 次元サイクル C や 4 次元サイクルの体積（サイズ）を変える変形」である。実際、2 サイクル C の体積は $\mathrm{Vol}(C) = \int_C J$ で与えられ、J を基底 $\{\omega_a\}$ で $J = \sum_a v^a \omega_a$ と展開した係数 v^a がサイズを表す実パラメータとなる。体積が正であるという条件から、v^a は Kähler 錐と呼ばれる錐の内部を動く。

弦理論では、計量に加えて反対称テンソル場（B 場）B_{mn} が存在し、その調和 $(1,1)$ 成分 $B = \sum_a b^a \omega_a$ も質量ゼロのスカラー場を与える。両者は

$$t^a = b^a + i v^a \qquad (a = 1, \dots, h^{1,1}) \tag{7.6}$$

と組み合わされて**複素化された Kähler モジュライ**となる。これらを総称して **Kähler モジュライ**と呼ぶ。b^a は周期的（$b^a \sim b^a + 1$）であり、これは第 3 章の Wilson ラインの周期性と同じ「大きなゲージ変換」による同一視である。

7.2.2　複素構造の変形（$\delta g_{\bar{i}j}$）

純粋成分の変形 $\delta g_{i\bar{j}}$ は、第 3 章で議論した「複素構造の変形」に対応する。

【注】 計量の純粋成分 $\delta g_{i\bar{j}}$ がなぜ複素構造の変形を記述するのかを確認する。元のエルミート計量 $g_{i\bar{k}}$ を用いて添字を一つ持ち上げることで、接束に値をとる $(0,1)$ 形式（Beltrami 微分）

$$\mu_{\bar{j}}^{\ i} \equiv g^{i\bar{k}}\, \delta g_{\bar{k}\bar{j}}$$

を定義できる。新しい計量で「$(1,1)$ 型」となるのは、dz^i ではなく $dz^i + \mu_{\bar{j}}^{\ i} d\bar{z}^{\bar{j}}$ を正則な 1 形式とみなすような複素構造であり、これはまさに第 3 章の Beltrami 微分による複素構造の変形である。Lichnerowicz 方程式は、この μ が $\bar{\partial}$ に関する調和形式であること（$\bar{\partial}\mu = 0$ かつ $\bar{\partial}^\dagger \mu = 0$）を要求する。すなわち $[\mu] \in H^1(X, T_X)$ である。

さらに CY3 においては、正則 3 形式 Ω を用いて同型写像を構成できる。μ を Ω に縮約させると、

$$\mu \mapsto \Omega_{ijl}\, \mu_{\bar{k}}^{\ l}\, dz^i \wedge dz^j \wedge d\bar{z}^{\bar{k}} \in H^{2,1}(X)$$

という $(2,1)$ 形式が得られ、これが同型 $H^1(X, T_X) \cong H^{2,1}(X)$ を与える（第 3 章の $T_X \cong \Lambda^2 T_X^*$）。したがって、複素構造の変形の自由度は Hodge 数 $h^{2,1}$ に等しい。

物理的には、これは「Calabi–Yau 多様体の 3 次元サイクルの形を変える変形」である。3 サイクルの基底 $\{A_I, B^I\}$（$I = 0, \dots, h^{2,1}$、交叉数 $A_I \cdot B^J = \delta_I^J$）をとり、正則 3 形式の**周期**

$$X^I = \int_{A_I} \Omega, \qquad F_I = \int_{B^I} \Omega \tag{7.7}$$

を考えると、X^I は（Ω の全体のスケールを除いて）複素構造モジュライ空間の局所的な射影座標となる。これらを**複素構造モジュライ**と呼ぶ。

■例：トーラス（1 次元の Calabi–Yau 多様体）　2 次元トーラス T^2 は $c_1 = 0$ の 1 次元複素多様体であり、Calabi–Yau 多様体の最も簡単な例である。Hodge 数は $h^{1,1} = h^{1,0} = 1$ であり、

- **複素構造モジュライ**：第 1 章・第 3 章の $\tau \in \mathbb{H}$。正則 1 形式 $\Omega = dz$ の周期の比 $\tau = \int_B dz / \int_A dz$ で与えられる。
- **複素化された Kähler モジュライ**：$\rho = b + i\,\mathrm{Area}/(4\pi^2\alpha')$（$b$ は B 場の積分）。$b \sim b + 1$ の周期性と、$\rho \to -1/\rho$ に対応する T 双対性により、ρ も $\mathbb{H}/SL(2,\mathbb{Z})$ に値をとる。

弦理論の T^2 コンパクト化のモジュライ空間は（局所的に）$\mathcal{M}_\tau \times \mathcal{M}_\rho$ であり、T 双対性

の一つ（1 方向の T 双対）は $\tau \leftrightarrow \rho$ を入れ替える。これが次節で述べるミラー対称性の最も簡単な例である。

7.3　特殊幾何学（Special Geometry）と有効理論

4 次元の低エネルギー有効理論において、これら $h^{1,1}$ 個の Kähler モジュライと $h^{2,1}$ 個の複素構造モジュライは、質量ゼロのスカラー場として現れる。第 6 章で見たように、これらのスカラー場が張る真空のモジュライ空間 $\mathcal{M}$ は、元の高エネルギー理論から非線形シグマ模型の標的空間として計量を受け継ぐ。

どの超対称性が残り、モジュライがどの多重項に入るかは弦理論の種類によって異なる。

- **タイプ II 弦理論**：4 次元に $\mathcal{N}=2$ 超対称性が残る。タイプ IIA では $h^{1,1}$ 個の Kähler モジュライがベクトル多重項に、$h^{2,1}$ 個の複素構造モジュライ（とディラトン）がハイパー多重項に入る。タイプ IIB では役割が逆転する。
- **ヘテロティック弦理論**：ゲージ束を入れることで 4 次元に $\mathcal{N}=1$ 超対称性が残り、モジュライはカイラル多重項となる。この場合、ゲージ束の変形（束のモジュライ）も加わる。

$\mathcal{N}=2$ 超対称性のもとでは、ベクトル多重項のスカラーのモジュライ空間とハイパー多重項のモジュライ空間は局所的に直積に分解する。

$$\mathcal{M} = \mathcal{M}_V \times \mathcal{M}_H \tag{7.8}$$

CY3 の幾何学の言葉では、Kähler モジュライ空間 $\mathcal{M}_K$（複素次元 $h^{1,1}$）と複素構造モジュライ空間 $\mathcal{M}_C$（複素次元 $h^{2,1}$）がそれぞれのいずれかに対応する。

Definition 7.3.1: 特殊 Kähler 多様体（射影的）

複素 n 次元の Kähler 多様体 $\mathcal{M}$ が**特殊 Kähler 多様体**であるとは、局所的に射影座標 X^I（$I=0,\dots,n$）と、次数 2 の斉次正則関数 $\mathcal{F}(X)$（**プレポテンシャル**）が存在して、Kähler ポテンシャルが

$$K = -\ln\left[i\left(\bar{X}^I F_I - X^I \bar{F}_I\right)\right], \qquad F_I = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial X^I}$$

と書けることをいう。

$\mathcal{N}=2$ ベクトル多重項のスカラーのモジュライ空間は、超対称性からこの構造を持つことが示される。（ハイパー多重項のモジュライ空間は四元数 Kähler 多様体という別の構造を持つ。）すなわち、計量・ゲージ結合定数・湯川結合など、有効理論の 2 微分の相互作用がすべて単一の正則関数 $\mathcal{F}$ から決まる。

Proposition 7.3.1: CY3 の複素構造モジュライの特殊幾何

CY3 の複素構造モジュライ空間 $\mathcal{M}_C$ は特殊 Kähler 多様体であり、射影座標は A 周期 X^I、プレポテンシャルの微分は B 周期 F_I で与えられる。Kähler ポテン

シャル（Weil–Petersson 計量のポテンシャル）は

$$K = -\ln\left(i \int_X \Omega \wedge \bar{\Omega} \right)$$

である。

【注】 Ω をシンプレクティック基底の双対基底 $\{\alpha_I, \beta^I\}$（$\int_{A_J} \alpha_I = \delta_{IJ}$ など）で展開すると $\Omega = X^I \alpha_I - F_I \beta^I$ であり、Riemann 双線形関係 $\int_X \alpha_I \wedge \beta^J = \delta_I^J$ を用いると

$$\int_X \Omega \wedge \bar{\Omega} = -X^I \bar{F}_I + F_I \bar{X}^I$$

となる。よって $i\int_X \Omega \wedge \bar{\Omega} = i(\bar{X}^I F_I - X^I \bar{F}_I)$ であり、特殊 Kähler 多様体の定義の形に一致する（符号はシンプレクティック基底の向きの規約による）。F_I が X^I の関数として $F_I = \partial \mathcal{F}/\partial X^I$ と書けることは、Griffiths 横断性 $\int_X \Omega \wedge \partial_I \Omega = 0$ から従う。また、湯川結合は $\kappa_{abc} = \int_X \Omega \wedge \partial_a \partial_b \partial_c \Omega$ で与えられ、$\mathcal{F}$ の 3 階微分に等しい。

Kähler モジュライ空間 $\mathcal{M}_K$ も古典的には特殊 Kähler 多様体であり、そのプレポテンシャルは $t^a = X^a/X^0$ を用いて

$$\mathcal{F}_{\mathrm{cl}} = -\frac{1}{6}\frac{\kappa_{abc} X^a X^b X^c}{X^0}, \qquad \kappa_{abc} = \int_X \omega_a \wedge \omega_b \wedge \omega_c \tag{7.9}$$

で与えられる（κ_{abc} は 2 形式の三重交叉数）。このとき Kähler ポテンシャルは $K = -\ln\left(\frac{4}{3}\int_X J \wedge J \wedge J\right) = -\ln(8\,\mathrm{Vol}(X))$ となり、モジュライ空間の計量は CY3 の体積から決まる。ところが、弦理論ではこの古典的なプレポテンシャルに補正が加わる。

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\mathrm{cl}} + (\text{摂動的な } \alpha'^3 \text{ 補正} \propto \zeta(3)\chi(X)) + \sum_{d} n_d\, \mathrm{Li}_3\!\left(e^{2\pi i\, d\cdot t}\right) \tag{7.10}$$

最後の項は、弦が X の中の正則曲線（次数 d）に巻き付く**世界面インスタントン**の寄与であり、n_d は次数 d の有理曲線の「数」（Gromov–Witten 不変量に関係する整数）である。

7.4　モジュライ空間の特異点：コニフォールド

複素構造モジュライ空間 $\mathcal{M}_C$ は一般にコンパクトではなく、特異点を持つ。典型的なのは、ある 3 サイクル（位相的には S^3）が潰れる**コニフォールド点**である。quintic の例では $\psi^5 = 1$ がこれに当たり、そこでは多様体 X 自身が特異点（局所的に $\sum_{i=1}^4 w_i^2 = 0$ という形の錐）を持つ。

コニフォールド点の近くでは、潰れる S^3 上の周期 $z = \int_{S^3} \Omega$ が局所座標となり、もう一方の双対な周期は

$$F_z \simeq \frac{z}{2\pi i}\ln z + (\text{正則}) \tag{7.11}$$

という対数的な振る舞いをする。したがって z の周りを 1 周すると $F_z \to F_z + z$ という**モノドロミー**が生じ、モジュライ空間の計量 $g_{z\bar{z}} \sim -\ln|z|^2$ は $z \to 0$ で対数的に発散する（ただし原点までの距離は有限）。

【注】 一見すると、これは低エネルギー有効理論が $z = 0$ で破綻していることを示しているように見える。Strominger はこの問題を次のように解決した。タイプ IIB 弦理論では、D3 ブレーンが潰れる S^3 に巻き付いた状態は、質量が周期に比例する $M \propto |z|$ 粒子（4 次元ではブラックホール）として振る舞う。$z \to 0$ でこの粒子は**質量ゼロ**となり、有効理論から積分消去してはならない新たな軽い自由度となる。対数的な特異性は、まさにこの質量ゼロの荷電粒子を積分消去したことによる 1 ループの効果（Seiberg–Witten 理論のモノポールと同じ機構）として再現される。

ここでも、第 5 章（小インスタントン）や第 6 章（Seiberg–Witten）と全く同じく、**モジュライ空間の特異点 = 新しい軽い自由度の出現点**という原理が働いている。

7.5　ミラー対称性の予兆

最後に、モジュライ空間の分解が示唆する深遠な双対性について触れておく。弦理論の枠組みでは、ある CY3 X 上でコンパクト化された理論と、全く別の CY3 Y 上でコンパクト化された理論が、物理的に全く同等になることがある。より正確には、X 上のタイプ IIA 弦理論と Y 上のタイプ IIB 弦理論が同等であり、このとき X の Kähler モジュライ空間と Y の複素構造モジュライ空間が入れ替わっている。

$$h^{1,1}(X) = h^{2,1}(Y), \quad h^{2,1}(X) = h^{1,1}(Y), \qquad \mathcal{M}_K(X) \cong \mathcal{M}_C(Y) \tag{7.12}$$

これを**ミラー対称性（Mirror Symmetry）**と呼ぶ。Euler 数は $\chi(X) = -\chi(Y)$ と符号が反転する。quintic（$h^{1,1}=1,\ h^{2,1}=101$）のミラー Y は $h^{1,1}=101,\ h^{2,1}=1$ を持ち、その 1 次元の複素構造モジュライ空間が quintic の Kähler モジュライ空間に対応する。

Kähler モジュライ空間の計量には、前節で見た世界面インスタントンに由来する無限個の補正が含まれており、これを直接計算することは極めて困難である。しかし、複素構造モジュライ空間の計量は古典的な周期積分だけで厳密に定まり、量子補正を受けない（タイプ IIB ではディラトンがハイパー多重項に入るため、ベクトル多重項のモジュライ空間は g_s 補正も受けず、また世界面の計算でも α' に依存しない）。ミラー対称性を用いれば、計算が困難な Kähler 幾何学（量子幾何学）の情報を、双対な多様体の複素幾何学（古典幾何学）の周期積分に翻訳して解くことができる。

■例：quintic の有理曲線の数え上げ　Candelas, de la Ossa, Green, Parkes は 1991 年、ミラー多様体の周期積分（Picard–Fuchs 方程式の解）を計算し、それをミラー写像で quintic の Kähler モジュライに翻訳することで、quintic 上の次数 d の有理曲線の数 n_d を予言した。

$$n_1 = 2875, \qquad n_2 = 609250, \qquad n_3 = 317206375, \quad \ldots \tag{7.13}$$

$n_1 = 2875$（直線の数）と $n_2 = 609250$（2 次曲線の数）は古典的な代数幾何学で知られていたが、n_3 以降は物理からの予言であり、後に数学的に証明された。モジュライ空間の代数幾何学的な構造が、弦理論の非摂動的なダイナミクスを厳密に解き明かす最強の武器となるのである。

【注】 現象論的な観点からは、質量ゼロのモジュライ場は観測と矛盾する（長距離の第 5 の力や、宇宙論的なモジュライ問題を引き起こす）。したがって現実的なコンパクト化では、モジュライに質量を与えて真空のモジュライ空間の特定の点に固定する**モジュライ安定化**が必要となる。タイプ IIB では、3 形式フラックスを入れることで超ポテンシャル $W = \int_X G_3 \wedge \Omega$（Gukov–Vafa–Witten）が生じ、複素構造モジュライとディラトンが固定される。Kähler モジュライは非摂動効果（D7 ブレーン上のゲージーノ凝縮など）で固定される（KKLT）。これは第 6 章で見た「量子効果によるモジュライ空間の持ち上がり」の弦理論版である。

第 8 章

一般相対論・幾何構造：計量や曲面の分類

これまでの章では、固定された背景時空（ミンコフスキー時空など）の上で定義されるゲージ場やスカラー場のモジュライ空間を考察してきた。しかし、一般相対性理論においては「時空の計量（Metric）」そのものが力学変数として振る舞う。本章では、計量のなす無限次元空間を微分同相写像で割った商空間（モジュライ空間）の構造を調べ、重力場における真の物理的自由度がどのように抽出されるのかを議論する。

特に、2 次元の計量のモジュライ空間は、次章以降で本格的に扱う「リーマン面のモジュライ（Teichmüller 空間）」や弦理論の経路積分と完全に一致し、局所的な自由度がゼロになるという劇的な帰結をもたらす。

8.1　計量の空間と微分同相群による商

多様体 M 上の滑らかな計量テンソル $g_{\mu\nu}(x)$ の全体がなす空間を $\mathrm{Met}(M)$ と表す。本講義ではローレンツ多様体を主に扱うため、計量の符号系は $(-+++)$ を採用する。計量テンソルは対称テンソルであるため、D 次元時空においては各点で $\frac{1}{2}D(D+1)$ 個の独立な成分を持つ。

一般相対論における「ゲージ対称性」とは、任意の座標変換の自由度、すなわち多様体 M 上の微分同相写像のなす群 $\mathrm{Diff}(M)$ である。微分同相写像 $f : M \to M$ のもとで、計量は引き戻し（pull-back） f^*g によって変換される。真の物理的な時空の幾何学は、特定の座標系の取り方に依存しない。したがって、重力理論における「物理的状態の空間」は、計量の空間を微分同相群で割った商空間として定義される。

$$\mathcal{M}_{\mathrm{geom}} = \mathrm{Met}(M)/\mathrm{Diff}(M) \tag{8.1}$$

この空間 $\mathcal{M}_{\mathrm{geom}}$ を、John Wheeler らは「スーパースペース（Superspace）」と呼んだ（超対称性のスーパースペースとは異なる概念であることに注意）。重力の量子化（特に正準量子重力）とは、この無限次元のモジュライ空間 $\mathcal{M}_{\mathrm{geom}}$ 上のシュレディンガー方程式（Wheeler-DeWitt 方程式）を解くことに他ならない。

8.2　作用の変形と物理的自由度の数え上げ

真空の一般相対論のダイナミクスは、Einstein-Hilbert 作用によって記述される。

$$S_{EH} = \frac{1}{16\pi G_N}\int_M d^D x\sqrt{-g}R \tag{8.2}$$

ここで $g = \det(g_{\mu\nu})$ であり、R はスカラー曲率である。モジュライ空間の接ベクトル（運動方程式を満たす物理的な無限小変形）を抽出するために、計量を $g_{\mu\nu} \to g_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu}$ と変形し、作用の停留条件を計算する。

【注】 計量の変分に対する曲率の変分を計算しよう。まず、逆計量と行列式の変分は以下のようになる。

$$\delta g^{\mu\nu} = -g^{\mu\rho}g^{\nu\sigma}\delta g_{\rho\sigma}, \quad \delta\sqrt{-g} = \frac{1}{2}\sqrt{-g}g^{\mu\nu}\delta g_{\mu\nu} \tag{8.3}$$

次に、Levi-Civita 接続（クリストッフェル記号 $\Gamma^\rho_{\mu\nu}$）の変分 $\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu}$ を考える。Γ 自身はテンソルではないが、その変分 $\delta\Gamma$ はテンソルとして振る舞うため、共変微分 ∇ を用いて次のように書ける。

$$\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu} = \frac{1}{2}g^{\rho\sigma}\left(\nabla_\mu\delta g_{\nu\sigma} + \nabla_\nu\delta g_{\mu\sigma} - \nabla_\sigma\delta g_{\mu\nu}\right) \tag{8.4}$$

Riemann 曲率テンソルの縮約である Ricci テンソル $R_{\mu\nu} = \partial_\rho\Gamma^\rho_{\mu\nu} - \ldots$ の変分は、Palatini の恒等式として知られる以下の式になる。

$$\delta R_{\mu\nu} = \nabla_\rho(\delta\Gamma^\rho_{\mu\nu}) - \nabla_\nu(\delta\Gamma^\rho_{\mu\rho}) \tag{8.5}$$

作用の変分を計算すると、

$$\begin{aligned}\delta(\sqrt{-g}R) &= \delta(\sqrt{-g}g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}) \\ &= (\delta\sqrt{-g})R + \sqrt{-g}(\delta g^{\mu\nu})R_{\mu\nu} + \sqrt{-g}g^{\mu\nu}\delta R_{\mu\nu} \\ &= \sqrt{-g}\left[\frac{1}{2}g^{\mu\nu}R - R^{\mu\nu}\right]\delta g_{\mu\nu} + \sqrt{-g}\nabla_\rho V^\rho\end{aligned}$$

表面項 $\nabla_\rho V^\rho$ を無視すると、作用が任意の変形 $\delta g_{\mu\nu}$ に対して停留する条件として、Einstein 方程式 $R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}g_{\mu\nu}R = 0$ が得られる。

さて、線形化された重力波（微小な計量の揺らぎ）の「物理的な自由度」の数を数えてみよう。計量 $g_{\mu\nu}$ は $\frac{1}{2}D(D+1)$ 個の成分を持つ。一方、無限小の微分同相変換は、ベクトル場 $\xi^\mu(x)$ に沿った Lie 微分 $\mathcal{L}_\xi$ で与えられる。計量テンソルの変分は

$$\delta_\xi g_{\mu\nu} = \nabla_\mu\xi_\nu + \nabla_\nu\xi_\mu \tag{8.6}$$

となる。ベクトル場 ξ^μ は D 個の任意関数（局所自由度）を持つ。ゲージ理論と同様に、時間発展を決定できない非物理的な方向（ゲージ自由度）を消去すると、物理的なプロパゲーターに乗る局所自由度の数は以下のようになる。

$$\text{重力子の自由度} = \frac{1}{2}D(D+1) - 2\times D = \frac{1}{2}D(D-3) \tag{8.7}$$

$D = 4$ の場合、$\frac{1}{2}\times 4\times 1 = 2$ となり、重力波が 2 つの偏極モード（プラス・モードとクロス・モード）を持つという事実と一致する。

8.3　2 次元重力と Weyl 不変性：局所自由度の消失

上記の自由度数え上げの公式 $\frac{1}{2}D(D-3)$ に $D = 2$ を代入すると、$-\frac{1}{2}\times 2\times 1 = -1$ となり、物理的な自由度が負になってしまうように見える。このパラドックスは、弦理論の世界面上の量子重力を理解する上で最も重要な出発点となる。

2 次元多様体（世界面 Σ）上の計量 g_{ab} $(a,b=1,2)$ は、$\frac{1}{2}\times 2\times 3=3$ 個の独立な成分を持つ。これに対して、微分同相変換 ξ^a は 2 つの自由度を持つ。さらに弦理論においては、作用が計量の局所的なスケール変換（Weyl 変換）に対しても不変であるという強力な対称性が課される。

$$g_{ab}(x)\to e^{2\omega(x)}g_{ab}(x) \tag{8.8}$$

Weyl 変換のパラメータ $\omega(x)$ が 1 つの局所自由度を持つため、対称性の自由度は計 $2+1=3$ となる。

【注】 微小変形における自由度を式で確認する。微小な微分同相変換 ξ^a と微小な Weyl 変換 ω による計量の変化は、

$$\delta g_{ab}=\nabla_a\xi_b+\nabla_b\xi_a+2\omega g_{ab} \tag{8.9}$$

である。代数的には、g_{ab} は対称 2 階テンソル（3 成分）、ξ_a はベクトル（2 成分）、ωg_{ab} は計量に比例するトレース成分（1 成分）である。2 次元においては、任意の計量テンソル場 $g_{ab}(x)$ に対して、適当な $\xi^a(x)$ と $\omega(x)$ を選ぶことで、局所的に計量を平坦なミンコフスキー計量（あるいはユークリッド計量 δ_{ab}）に完全に変換できることが証明されている。これを「共形平坦性（Conformally flat）」と呼ぶ。

局所的な自由度の収支は $3-(2+1)=0$ となる。すなわち、**2 次元重力においては局所的に伝播する重力子（グラビトン）は存在しない。**

8.4　大域的なモジュライと Teichmüller 空間への帰着

局所的な自由度がゼロであるからといって、計量のモジュライ空間 $\mathcal{M}_{\rm geom}$ が「1 つの点」に潰れてしまうわけではない。第 1 章のトーラスの例で先取りしたように、多様体 Σ のトポロジー（種数 g）が非自明な場合、滑らかな座標変換と Weyl 変換を尽くしても決して相殺できない**「大域的な」計量の自由度**が残るのである。

微分同相変換群 $\mathrm{Diff}(\Sigma)$ の単位元と連続的につながっている部分群を $\mathrm{Diff}_0(\Sigma)$、Weyl 変換の群を $\mathrm{Weyl}(\Sigma)$ とする。弦の経路積分においてこれらの局所的なゲージ自由度で商をとった空間

$$\frac{\mathrm{Met}(\Sigma)}{\mathrm{Diff}_0(\Sigma)\ltimes\mathrm{Weyl}(\Sigma)} \tag{8.10}$$

は、まさに 2 次元曲面の複素構造（あるいは共形同値類）を分類する**タイヒミュラー空間（Teichmüller space）** $\mathcal{T}_g$ に他ならない。

さらに、連続変形できない「大きな座標変換（Large diffeomorphisms）」である写像類群（Mapping Class Group） $\Gamma_g=\mathrm{Diff}(\Sigma)/\mathrm{Diff}_0(\Sigma)$ による作用で割ることで、最終的なリーマン面のモジュライ空間

$$\mathcal{M}_g=\mathcal{T}_g/\Gamma_g \tag{8.11}$$

が得られる。種数 $g\geq 2$ の場合、このモジュライ空間は複素次元で $3g-3$（実次元で $6g-6$）次元の複雑な空間となる。

弦理論における散乱振幅の計算は、すべての計量についての無限次元の経路積分が、Fadeev-Popov ゴーストの行列式（測度）を伴って、この有限次元空間 $\mathcal{M}_g$ 上の積分へと劇的に還元されることを意味する。重力のダイナミクスが、完全に代数幾何学的な「モジュライ積分」に帰着するのである。

次章（第 III 部：発展的視点）では、このリーマン面のモジュライ空間の構造をさらに深く掘り下げ、境界の退化（コンパクト化）やモジュライ・スタックとしての性質を詳述していく。