

1 Osnove teorije

1.1 BCS teorija pri končni temperaturi

BCS model, kjer je $\xi_{\mathbf{k},\sigma} = \epsilon_{\mathbf{k},\sigma} - E_F$ in $k := (\mathbf{k}, \uparrow)$, $-k := (-\mathbf{k}, \downarrow)$:

$$H = \sum_k \xi_k (c_k^\dagger c_k + c_{-k}^\dagger c_{-k}) - V \sum_{k,k'} c_k^\dagger c_{-k}^\dagger c_{-k'} c_{k'} \quad (1)$$

Naredimo približek povprečnega polja, definiramo $b_k = c_k c_{-k}$ in $b_k = \langle b_k \rangle + \delta b_k = F_k + \delta b_k$, sledi (do $\mathcal{O}(\delta b_k^2)$)

$$b_k^\dagger b_{k'} \simeq F_k^* F_{k'} + F_k^* \delta b_{k'} + F_{k'} \delta b_k^\dagger = F_k^* b_{k'} + F_{k'} b_k^\dagger - F_k^* F_{k'} = \langle b_k^\dagger \rangle b_{k'} + b_k^\dagger \langle b_{k'} \rangle - \langle b_k^\dagger \rangle \langle b_{k'} \rangle \quad (2)$$

Iz česar sledi:

$$H = \sum_k (c_k^\dagger \quad c_{-k}) \begin{pmatrix} \xi_k & -\Delta_k \\ -\Delta_k^* & -\xi_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_k \\ c_{-k}^\dagger \end{pmatrix} + \frac{|\Delta|^2}{V} + \sum_k \xi_k \quad (3)$$

Ob definiciji $\Delta_k = \sum_{k'} V(k - k') \langle c_{k'} c_{-k'} \rangle$, vzamemo še lokalno interakcijo, zato je $V(q) \simeq V$ in $\Delta_k \simeq \Delta$. Naredimo Bogoljubov rotacijo, privzamemo $u_k, v_k \in \mathbb{R}$ in simetrijo okoli E_F : $u_k = u_{-k}$ ter $v_k = v_{-k}$. Iz CCR sledi $u_k^2 + v_k^2 = 1$. Kvazidelci so definirani z rotacijo

$$\begin{pmatrix} c_k \\ c_{-k}^\dagger \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_k & v_k \\ -v_k & u_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_k \\ \alpha_{-k}^\dagger \end{pmatrix} \quad (4)$$

nov Hamiltonjan pa postane

$$H = \sum_k (\alpha_k^\dagger \quad \alpha_{-k}) \begin{pmatrix} \xi_k u_k^2 + u_k v_k (\Delta_k + \Delta_k^*) - \xi_k v_k^2 & -2\xi_k u_k v_k + \Delta_k u_k^2 - \Delta_k^* v_k^2 \\ -2\xi_k u_k v_k - \Delta_k v_k^2 + \Delta_k^* u_k^2 & \xi_k v_k^2 - \xi_k u_k^2 + u_k v_k (\Delta_k + \Delta_k^*) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_k \\ \alpha_{-k}^\dagger \end{pmatrix}, \quad (5)$$

kjer zahtevamo, da so izvendiagonalni členi enaki 0. Iz CCR zahteve lahko vzamemo parameterizacijo (tu sem vzel kompleksno nastavimo, da je $\Delta = \Delta^* e^{i2\phi_k}$):

$$v_k = \sin\left(\frac{\theta_k}{2}\right) e^{i\phi_k} \quad (6)$$

$$u_k = \cos\left(\frac{\theta_k}{2}\right) \quad (7)$$

$$u_k v_k = \cos\left(\frac{\theta_k}{2}\right) \sin\left(\frac{\theta_k}{2}\right) = \frac{1}{2} \sin \theta_k \quad (8)$$

$$u_k^2 - v_k^2 = \cos^2\left(\frac{\theta_k}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\theta_k}{2}\right) = \cos \theta_k \quad (9)$$

skupaj dobimo (od tu naprej $\Delta := |\Delta|$):

$$\xi_k \sin(\theta_k) = \Delta \cos(\theta_k) \quad (10)$$

kar fiksira

$$\tan(\theta_k) = \frac{|\Delta_k|}{\xi_k}. \quad (11)$$

Tako iz trikotnika preberemo

$$\sin \theta_k = \frac{|\Delta_k|}{E_k} = \frac{|\Delta_k|}{\sqrt{\xi_k^2 + |\Delta_k|^2}} \quad (12)$$

$$\cos \theta_k = \frac{\xi_k}{E_k} = \frac{\xi_k}{\sqrt{\xi_k^2 + |\Delta_k|^2}} \quad (13)$$

$$(14)$$

kjer je $E_k = \pm \sqrt{\xi_k^2 + |\Delta_k|^2}$ energija kvazidelcev:

$$H = \sum_k E_k \alpha_k^\dagger \alpha_k - E_k \alpha_{-k}^\dagger \alpha_{-k} + \xi_k + \frac{|\Delta|^2}{V}. \quad (15)$$

V termičnem stanju so diagonalni delci porazdeljeni po

$$\langle \alpha_k^\dagger \alpha_k \rangle = \frac{1}{1 + \exp(E_k/T)} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \tanh\left(\frac{E_k}{2T}\right). \quad (16)$$

Uporabni sta zvezi $f(-E/T) = 1 - f(E/T)$ in $1 - 2f(E/T) = \tanh(E/(2T))$. V definiciji ureditvenega parametra je

$$\langle c_k c_{-k} \rangle = \left\langle \left(u_k \alpha_k - v_k \alpha_{-k}^\dagger \right) \left(u_k \alpha_{-k} + v_k \alpha_k^\dagger \right) \right\rangle = u_k v_k \left(1 - \langle \alpha_{-k}^\dagger \alpha_{-k} \rangle - \langle \alpha_k^\dagger \alpha_k \rangle \right) = \frac{1}{2} \sin \theta_k \tanh\left(\frac{\beta E_k}{2}\right) \quad (17)$$

iz česar sledi enačba za režo pri $T > 0$ (seštevamo po k okoli E_F):

$$\Delta = \frac{V}{2} \sum_k' \sin \theta_k \tanh\left(\frac{E_k}{2T}\right) = \frac{V\Delta}{2} \sum_k \frac{\tanh\left(\frac{1}{2T} \sqrt{\Delta^2 + \xi_k^2}\right)}{\sqrt{\Delta^2 + \xi_k^2}} \quad (18)$$

1.2 Minimalni model ekscitonskega izolatorja pri končni temperaturi

Pri izolatorju za minimalni model vzamemo dve orbitali (a, b) model tesne vezi v vsaki posebej in lokalno Coulombovo interakcijo na mestu j med elektronskima gostotama v posameznih pasovih

$$H = H_0 + H_V = \sum_{i,j} \left(\epsilon_a^{(0)} \delta_{ij} + t_{ij}^{(a)} \right) c_{a,i}^\dagger c_{a,j} + \sum_{i,j} \left(\epsilon_b^{(0)} \delta_{ij} + t_{ij}^{(b)} \right) c_{b,i}^\dagger c_{b,j} + V \sum_j c_{a,j}^\dagger c_{a,j} c_{b,j}^\dagger c_{b,j} \quad (19)$$

$$= \sum_k \epsilon_{a,k} c_{a,k}^\dagger c_{a,k} + \sum_k \epsilon_{b,k} c_{b,k}^\dagger c_{b,k} + V \sum_j c_{a,j}^\dagger c_{a,j} c_{b,j}^\dagger c_{b,j} \quad (20)$$

najprej diagonaliziramo vsako orbitalo posebej, kar da gole disperzije (vezavni energiji nastavimo na $\pm G/2$) (delamo v dveh dimenzijah in mrežna konstanta $a_0 = 1$):

$$\epsilon_{a(b),k} = \pm \frac{G}{2} - 2t_{a(b)} (\cos(k_x) + \cos(k_y)), \quad (21)$$

v tem primeru je najmanjša razdalja med pasovoma $G_0 = G - 4(t_a - t_b)$ oziroma $G_0 = G - 8t_a$, če je $t_b = -t_a$. Za interakcijo spet naredimo približek povprečnega polja:

$$c_{a,j}^\dagger c_{a,j} c_{b,j}^\dagger c_{b,j} \approx \langle c_{a,j}^\dagger c_{a,j} \rangle c_{b,j}^\dagger c_{b,j} + \langle c_{b,j}^\dagger c_{b,j} \rangle c_{a,j}^\dagger c_{a,j} - \langle c_{a,j}^\dagger c_{b,j} \rangle c_{b,j}^\dagger c_{a,j} - \langle c_{b,j}^\dagger c_{a,j} \rangle c_{a,j}^\dagger c_{b,j} + \text{konst.} \quad (22)$$

od tod sledi

$$H_V^{\text{MF}} = V n_b \sum_j c_{a,j}^\dagger c_{a,j} + V n_a \sum_j c_{b,j}^\dagger c_{b,j} - V \phi \sum_j c_{b,j}^\dagger c_{a,j} - V \phi^* \sum_j c_{a,j}^\dagger c_{b,j} + NV |\phi|^2 \quad (23)$$

kjer smo definirali:

$$n_a = \langle c_{a,j}^\dagger c_{a,j} \rangle = \frac{1}{N} \sum_k \langle c_{a,k}^\dagger c_{a,k} \rangle \quad (24)$$

$$n_b = \langle c_{b,j}^\dagger c_{b,j} \rangle = \frac{1}{N} \sum_k \langle c_{b,k}^\dagger c_{b,k} \rangle \quad (25)$$

$$\phi = \langle c_{a,j}^\dagger c_{b,j} \rangle = \frac{1}{N} \sum_k \langle c_{a,k}^\dagger c_{b,k} \rangle \quad (26)$$

$$\Delta = -\frac{V}{N} \sum_k \langle c_{a,k}^\dagger c_{b,k} \rangle, \quad \Delta^* = -\frac{V}{N} \sum_k \langle c_{b,k}^\dagger c_{a,k} \rangle \quad (27)$$

$$\Delta_k = \frac{1}{N} \sum_{k'} V(k - k') \langle a_{k'}^\dagger b_{k'} \rangle, \quad V(q) = \int e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) d\mathbf{r} \quad (28)$$

Uporabimo FT še na celotnem Hamiltonjanu

$$c_{a,j}^\dagger = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_k e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_j} c_{a,k}^\dagger \quad (29)$$

$$H^{\text{MF}} = \sum_k \left([\epsilon_{a,k} + V n_b] c_{a,k}^\dagger c_{a,k} + [\epsilon_{b,k} + V n_a] c_{b,k}^\dagger c_{b,k} + \Delta^* c_{a,k}^\dagger c_{b,k} + \Delta c_{b,k}^\dagger c_{a,k} \right) + \left(\frac{|\Delta|^2}{V} N - V N n_a n_b \right) \quad (30)$$

oziroma:

$$H^{\text{MF}} = \sum_k \begin{pmatrix} c_{a,k}^\dagger & c_{b,k}^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \epsilon_{a,k}^H & \Delta^* \\ \Delta & \epsilon_{b,k}^H \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{a,k} \\ c_{b,k} \end{pmatrix} + \text{konst.}, \quad (31)$$

kjer definiramo Hartree energiji $\epsilon_{a(b),k}^H = \epsilon_{a(b),k} + V n_{b(a)}$. Transformacija v diagonalno / Bogoljubov bazo je podobna kot pri BCS, le da ne meša kreatorjev in anihilatorjev / ohranja število delcev:

$$\begin{pmatrix} c_{a,k} \\ c_{b,k} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_k & v_k \\ -v_k & u_k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_k \\ \beta_k \end{pmatrix} \quad (32)$$

od tod po enakem postopku kot prej dobimo energiji kvazidelcev

$$E_{\alpha(\beta)}(k) = \frac{\epsilon_{a,k}^H + \epsilon_{b,k}^H}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_{a,k}^H - \epsilon_{b,k}^H}{2} \right)^2 + |\Delta|^2} := \eta_k \pm \sqrt{\xi_k^2 + \Delta^2} \quad (33)$$

Za bookkeeping:

$$\left(\frac{\epsilon_a^H - \epsilon_b^H}{2} \right) \sin \theta_k + \Delta \cos \theta_k = 0 \implies \tan \theta_k = \frac{-2\Delta}{\epsilon_a^H - \epsilon_b^H} = \frac{-\Delta}{\xi_k} \quad (34)$$

$$u_k v_k = -\frac{\sin \theta_k}{2}. \quad (35)$$

Za samousklajeno enačbo zdaj potrebujemo

$$\langle c_{a,k}^\dagger c_{b,k} \rangle = \langle (u_k \alpha_k^\dagger + v_k \beta_k^\dagger)(-v_k \alpha_k + u_k \beta_k) \rangle = u_k v_k \left(\langle \beta_k^\dagger \beta_k \rangle - \langle \alpha_k^\dagger \alpha_k \rangle \right) = -\frac{1}{2} \sin \theta_k (f(E_\beta) - f(E_\alpha)) \quad (36)$$

od tod

$$\Delta = -\frac{V}{N} \sum_k \langle c_{a,k}^\dagger c_{b,k} \rangle = \frac{V}{N} \sum_k \frac{\Delta}{2\sqrt{\xi_k^2 + |\Delta|^2}} (f(E_\beta) - f(E_\alpha)) \quad (37)$$

Opomba, lahko definiramo tudi $n = n_a + n_b = \text{konst.} = 1$ in $n_a - n_b =: m$ od tod sledi

$$H^{\text{MF}} = \sum_k \left(\left[\epsilon_{a,k} + \frac{V}{2} n - \frac{V}{2} m \right] c_{a,k}^\dagger c_{a,k} + \left[\epsilon_{b,k} + \frac{V}{2} n - \frac{V}{2} m \right] c_{b,k}^\dagger c_{b,k} + \Delta^* c_{a,k}^\dagger c_{b,k} + \Delta c_{b,k}^\dagger c_{a,k} \right) \quad (38)$$

od koder je v 2D Hartree gap enak:

$$G^H = G - 4(t_a - t_b) - Vm. \quad (39)$$

Note: v praksi je $m < 0$ V dveh dimenzijah se Hartree pasova srečata na

$$\mu_B = \frac{V}{2} n - \frac{t_a + t_b}{t_a - t_b} \frac{G - Vm}{2}. \quad (40)$$

Zamik je enak $V/2$, ko sta osnovna pasova simetrična in je zasedenost polovična. V primeru simetričnih pasov sta disperziji kvazidelcev

$$E_{\alpha(\beta)}(k) - V/2 = \pm \sqrt{\left(\frac{\epsilon_{a,k} - \epsilon_{b,k} - Vm}{2}\right)^2 + |\Delta|^2}. \quad (41)$$

Velja še

$$n_a = \frac{1}{N} \sum_k (u_k^2 f(E_\alpha) + v_k^2 f(E_\beta)) \quad (42)$$

$$n_b = \frac{1}{N} \sum_k (v_k^2 f(E_\alpha) + u_k^2 f(E_\beta)) \quad (43)$$

$$u_k^2 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{\xi_k}{\sqrt{\Delta^2 + \xi_k^2}} \right) \quad (44)$$

$$v_k^2 = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\xi_k}{\sqrt{\Delta^2 + \xi_k^2}} \right) \quad (45)$$

1.3 Numerika/psevdokoda

1.4 Odprti sistemi in modeliranje kopeli

Born-Markov master enačbe in Redfield: ločimo kopel in sistem,

$$\rho_S(t) = \text{Tr}_B(\rho(t)) \quad (46)$$

Hamiltonjan razcepimo na $H = H_0 + H_I$, kjer je $H_0 = H_S \otimes \mathbb{I}_B + \mathbb{I}_S \otimes H_B$ razdeljen na podсистema, za interakcijski del pa privzamemo obliko $H_I = \sum_\alpha A_\alpha \otimes B_\alpha$. V interakcijski sliki je operator za evolucijo

$$U_0(t, t_0) = e^{-iH_0(t-t_0)} \quad (47)$$

$$\rho_I(t) = U_0^\dagger(t, 0) \rho(t) U_0(t, 0) = e^{iH_0 t} \rho(t) e^{-iH_0 t} \quad (48)$$

$$H_I(t) = U_0^\dagger(t, 0) H_I U_0(t, 0) = e^{iH_0 t} H_I e^{-iH_0 t} \quad (49)$$

Von Neumannova enačba je

$$\frac{d}{dt} \rho_I(t) = -i[H_I(t), \rho_I(t)] \quad (50)$$

$$\rho_I(t) = \rho_I(0) - i \int_0^t dt' [H_I(t'), \rho_I(t')] \quad (51)$$

vstavimo nazaj v komutator in se znebimo prostosnih stopenj kopeli:

$$\frac{d}{dt} \rho_S(t) = - \int_0^t ds \text{Tr}_B ([H_I(t), [H_I(t-s), \rho_S(t) \otimes \rho_B]]) \quad (52)$$

V interakcijskem členu so operatorji A_α napisani kot lastni operatorji H_S z energijami prehodov $\omega = E_b - E_a$

$$A_\alpha(\omega) = \sum_{E_b - E_a = \omega} |a\rangle \langle a| A_\alpha |b\rangle \langle b| \quad (53)$$

To zadošča relacijam $[H_S, A_\alpha(\omega)] = -\omega A_\alpha(\omega)$, $[H_S, A_\alpha^\dagger(\omega)] = \omega A_\alpha^\dagger(\omega)$ in $e^{iH_S t} A_\alpha(\omega) e^{-iH_S t} = e^{-i\omega t} A_\alpha(\omega)$, $e^{iH_S t} A_\alpha^\dagger(\omega) e^{-iH_S t} = e^{i\omega t} A_\alpha^\dagger(\omega)$. V interakcijski sliki potem velja

$$H_I(t) = \sum_{\alpha, \omega} e^{-i\omega t} A_\alpha(\omega) \otimes B_\alpha(t) = e^{iH_B t} B_\alpha e^{-iH_B t} \quad (54)$$

evolucija sledi kot

$$\dot{\rho}_S = \sum_{\omega, \omega'} \sum_{\alpha, \beta} e^{i(\omega' - \omega)t} \Gamma_{\alpha\beta}(\omega) \left(A_\alpha(\omega) \rho_S(t) A_\beta^\dagger(\omega') - A_\beta^\dagger(\omega') A_\alpha(\omega) \rho_S(t) \right) + \text{h.c.} \quad (55)$$

kjer so prehodne matrike med stanji

$$\Gamma_{\alpha\beta}(\omega) = \int_0^\infty ds e^{i\omega s} \text{Tr}_B \left(B_\alpha^\dagger(t) B_\beta(t-s) \rho_B \right) = \frac{1}{2} \gamma_{\alpha\beta}(\omega) + i S_{\alpha\beta}(\omega) \quad (56)$$

Evolucija pa ima strukturo

$$\frac{d\rho_S}{dt} = -i[H_{LS}, \rho_S(t)] + \mathcal{D}(\rho_S(t)) \quad (57)$$

z disipatorjem

$$\mathcal{D}(\rho_S) = \sum_{\omega} \sum_{\alpha, \beta} \gamma_{\alpha\beta}(\omega) \left(A_\beta(\omega) \rho_S A_\alpha^\dagger(\omega) - \frac{1}{2} \{ A_\alpha^\dagger(\omega) A_\beta(\omega), \rho_S \} \right) \quad (58)$$

oz. v splošnem

$$\mathcal{D}(\rho_S) = \sum_k \gamma_k \left(L_k \rho_S L_k^\dagger - \frac{1}{2} \{ L_k^\dagger L_k, \rho_S \} \right) \quad (59)$$

V stacionarnem stanju velja

$$\mathcal{L}\rho_{\text{ness}} = 0. \quad (60)$$

Notes za vektorizacijo in superoperatorje:

$$\mathcal{L}u_\mu^R = \lambda_\mu u_\mu^R \quad (61)$$

$$\text{vec}(ABC) = (A \otimes C^T) \text{vec}(B) \quad (62)$$

$$\text{Tr}(A^\dagger B) = \text{vec}(A)^\dagger \text{vec}(B) \quad (63)$$

$$\frac{d}{dt} |\rho\rangle = \left(-iH \otimes \mathbb{I} + i\mathbb{I} \otimes H^T + \sum_k L_k \otimes L_k^* - \frac{1}{2} \sum_k (L_k^\dagger L_k \otimes \mathbb{I} + \mathbb{I} \otimes L_k^T L_k^*) \right) |\rho\rangle \quad (64)$$

$$\langle \hat{O} \rangle(t) = \langle \mathbb{I} | \hat{O} \otimes \mathbb{I} | \rho(t) \rangle \quad (65)$$

Šibke sklopitve in perturbacijski pristopi

$$\mathcal{L} = -i[H, \cdot] + \epsilon \mathcal{D}[\cdot], \quad \rho = \rho_0 + \epsilon \rho_1 + \epsilon^2 \rho_2 + \dots \quad (66)$$

napišemo gostotno matriko sistema v lastni bazi, siagonalno, s klasičnimi populacijami

$$\rho_0 = \sum_n p_n |n\rangle \langle n|, \quad H|n\rangle = E_n |n\rangle \quad (67)$$

kjer velja v ničtem redu (by construction)

$$\mathcal{L}\rho_0 = -i[H, \rho_0] = 0 \quad (68)$$

V prvem redu so enačbe za NESS

$$-i[H, \rho_1] + \mathcal{D}(\rho_0) = 0 \quad (69)$$

kjer je $\mathcal{D}(\rho_0) = \sum_{\mu} (L_{\mu}\rho_0 L_{\mu}^{\dagger} - \frac{1}{2}\{L_{\mu}^{\dagger}L_{\mu}, \rho_0\})$ in od tod enačba za prehode med populacijami

$$\langle n | \mathcal{D}(\rho_0) | n \rangle = \sum_{\mu} \sum_m p_m |\langle n | L_{\mu} | m \rangle|^2 - \sum_{\mu} \sum_m p_n |\langle m | L_{\mu} | n \rangle|^2 \quad (70)$$

kot klasična populacijska dinamika z $R_{nm} = \sum_{\mu} |\langle n | L_{\mu} | m \rangle|^2$

$$\dot{p}_n = \epsilon \sum_m (R_{nm} p_m - R_{mn} p_n) \quad (71)$$

Izvediagonalni elementi se razvijejo hitro na $\mathcal{O}(1)$, medtem ko se populacije razvijajo počasi na GGE manifoldu z $\mathcal{O}(\epsilon^{-1})$. Za ohranitev normalizacije mora veljati $\sum_n \dot{p}_n = 0$.

Integrabilni sistemi imajo makroskopsko število ohranjenih nabojev $[H_0, C_i] = 0$, pod unitarno časovno evolucijo se razvijejo v netermično stanje

$$\rho_{GGE} = \frac{1}{Z} e^{-\sum_i \lambda_i C_i} \quad (72)$$

$$\langle \psi_0 | C_i | \psi_0 \rangle = \text{Tr}(C_i \rho_{GGE}) \quad (73)$$

fiksira λ_i . UNitarna dinamika pripcira na GGE manifold, šibka sklopitev premika po GGE manifoldu:

$$\rho_0(t) = \rho_{\lambda(t)} = \frac{1}{Z(t)} \exp \left(- \sum_i \lambda_i(t) C_i \right) \quad (74)$$

EOM za ohranjene naboje je

$$\langle \dot{C}_i \rangle_{\lambda(\infty)} = \text{Tr}[C_i \mathcal{D}\rho] \simeq \epsilon \text{Tr}[C_i \mathcal{D}\rho_0] = 0 \quad \forall \lambda_i \quad (75)$$

Definiramo projektor na GGE manifold:

$$PX = - \sum_{ij} \frac{\partial \rho}{\partial \lambda_i} (\chi^{-1})_{ij} \text{Tr}[C_j X] \quad (76)$$

ki da dinamiko vzdolž manifolda:

$$\frac{\partial \rho_{\lambda}}{\partial t} = \sum_i \frac{\partial \rho_{\lambda}}{\partial \lambda_i} \dot{\lambda}_i = \epsilon P \mathcal{D}(\rho_{\lambda}) = -\epsilon \sum_{ij} \frac{\partial \rho_{\lambda}}{\partial \lambda_i} (\chi^{-1})_{ij} \text{Tr}[C_j \mathcal{D}(\rho_{\lambda})] \quad (77)$$

od koder sledi evolucija za koeficiente/potenciale λ_i :

$$\dot{\lambda}_i = -\epsilon \sum_j (\chi^{-1})_{ij} \text{Tr}[C_j \mathcal{D}\rho_{\lambda(t)}] \quad (78)$$

s susceptibilnostmi $\chi_{ij} = \langle C_i C_j \rangle - \langle C_i \rangle \langle C_j \rangle = -\text{Tr} \left[C_i \frac{\partial \rho}{\partial \lambda_j} \right]$.

2 Ekscitonski izolatorji in sklopitev s kopelmi

2.1 Osnovni model

2.2 Limita neskončne temperature

2.3 Fononske sklopitve

2.4 Fotonske sklopitve v resonatorju

$$\begin{aligned} \dot{n}_{\alpha k} = \sum_p \left(\Gamma_{\alpha p \rightarrow \alpha k} n_{\alpha p} (1 - n_{\alpha k}) - \Gamma_{\alpha k \rightarrow \alpha p} n_{\alpha k} (1 - n_{\alpha p}) + \right. \\ \left. + \Gamma_{\beta p \rightarrow \alpha k} n_{\beta p} (1 - n_{\alpha k}) - \Gamma_{\alpha k \rightarrow \beta p} n_{\alpha k} (1 - n_{\beta p}) \right) \end{aligned}$$

$$\Gamma_{\mu p \rightarrow \nu k} = \frac{2\pi}{V} \sum_{\lambda} |G_{\mu\nu}^{\lambda}(k, q)|^2 \{ (1 + N_q) \delta(E_{\nu k} - E_{\mu p} + \omega_{q\lambda}) + N_{-q} \delta(E_{\nu k} - E_{\mu p} - \omega_{q\lambda}) \}$$

$$\Gamma_{\nu k \rightarrow \mu p} = \frac{2\pi}{V} \sum_{\lambda} |G_{\mu\nu}^{\lambda}(k, q)|^2 \{ (1 + N_{-q}) \delta(E_{\mu p} - E_{\nu k} + \omega_{-q\lambda}) + N_q \delta(E_{\mu p} - E_{\nu k} - \omega_{q\lambda}) \}$$

$$G^{\lambda}(\mathbf{k}, \mathbf{q}) = \begin{pmatrix} u_{k+q} & -v_{k+q} \\ v_{k+q} & u_{k+q} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} g_{a\lambda}(\mathbf{q}) & 0 \\ 0 & g_{b\lambda}(\mathbf{q}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_k & v_k \\ -v_k & u_k \end{pmatrix}$$

$$g_{b\lambda}^a(\mathbf{q}) = -i \frac{4\pi e^2}{\sqrt{2M\Omega\omega_{q\lambda}}} \cdot \frac{1}{|\mathbf{q}|^2 + \Lambda^2} (\mathbf{q} \cdot \varepsilon_{\mathbf{q}\lambda}^*)$$

3 Periodična veriga

Najprej ponovimo izračun disperzije na periodični mreži, saj je postopek reševanja za deformirano mrežo podoben. Predpostavimo, da ima veriga N ionov z mrežno razdaljo a , vsak z enim elektronom, ki so šibko sklopljeni s prekrivalnim integralom t med najbližjimi sosedi. Sistem opiše Hamiltonijan za model tesne vezi

$$H = -t \sum_{j=1}^N c_j^{\dagger} c_{j+1} + c_{j+1}^{\dagger} c_j, \quad (79)$$

kjer so c_j kreacijski oziroma anihilacijski operatorji za elektrone na mestu j v verigi. Hamiltonijan lahko diagonaliziramo s pomočjo Fourierove transformacije

$$c_j = \frac{1}{\sqrt{L}} \sum_{k=1}^N e^{ijka} d_k, \quad (80)$$

kjer upoštevamo ortonormiranost

$$\frac{1}{L} \sum_j e^{ij(k-l)} = \delta_{k,l}. \quad (81)$$

S tem dobimo diagonalen Hamiltonijan

$$H = \sum_{k=1}^N -2t \cos(ka) d_k^{\dagger} d_k, \quad (82)$$

z znano disperzijo za model tesne vezi $\mathcal{E}(k) = -2t \cos(ka)$. V primeru, ko imamo po en elektron na mesto, so v osnovnem stanju zasedeni vsi valovni vektorji do $k_F = \pi/a$. Na to mrežo lahko gledamo tudi kot na mrežo z osnovno celico dolžine $2a$ z dvema ionoma. V tem primeru je disperzija enaka, prva Brillouinova cona pa se zmanjša za polovico iz $k \in [-\pi/a, \pi/a]$ v $k \in [-\pi/(2a), \pi/(2a)]$, disperzija pa se preslika nazaj. Na to lahko gledamo kot na **dva energijska pasova brez reže**, torej je energija enaka $\mathcal{E}(k)_{\pm} = \pm 2t \cos(ka)$.

Ko dodamo poljubno majhno modulacijo mreže, se disperzija spremeni z dodatno energijsko režo. V novem Hamiltonijanu upoštevamo, da se **s premiki poveča elastična energija med ioni**, ki jo opišemo klasično, z vzmetmi s koeficientom K , hkrati pa upoštevamo, da se **verjetnosti za tuneliranje elektronov med mesti mreže spremenijo**, zaradi manjšega oziroma večjega prekrivanja orbital.

$$H = - \sum_{j=1}^N t(u_{j+1} - u_j) \left[c_j^{\dagger} c_{j+1} + c_{j+1}^{\dagger} c_j \right] + \frac{K}{2} \sum_{j=1}^N (u_{j+1} - u_j)^2, \quad (83)$$

kjer smo upoštevali, da so prekrivalni integrali zdaj funkcije razlik sosednjih odmikov $t(u_{j+1} - u_j)$. Te razvijemo za majhne odmike do prvega reda [1]:

$$t(u_{j+1} - u_j) \approx t - \lambda(u_{j+1} - u_j), \quad (84)$$

kjer je t vrednost prekrivalnega integrala iz prvega, ko velja $u_j = 0$, $\lambda > 0$ pa koeficient razvoja.

Zdaj si izberemo modulacijo mest ionov. Recimo, da se vsak drugi ion premakne v levo za $-u$ (da upravičimo razvoj prekrivalnega integrala mora veljati $u \ll a$). Nova osnovna celica ima dolžino $2a$ in vsebuje po dva atoma. Prvega označimo z indeksom A , drugega, zamaknjenege pa z B . Posebej gledamo skakanje elektronov med ioni znotraj celice in med sosednjima celicama. Ker velja $u_{j,A} = 0$ in $u_{j,B} = -u$ (gl. sliko ??), sledi, da za razlike odmikov znotraj, oziroma zunaj celic dobimo

$$\begin{aligned} u_{j,B} - u_{j,A} &= -u, \\ u_{j+1,A} - u_{j,B} &= +u. \end{aligned}$$

Kinetični člen za elektrone razpade na dve vsoti, v elastičnem delu pa sta oba prispevka enaka, ker kvadriramo razlike odmikov, dobimo konstanten prispevek k energiji:

$$H = -(t + \lambda u) \sum_{j=1}^{N/2} [c_{j,B}^\dagger c_{j,A} + \text{h.c.}] - (t - \lambda u) \sum_{j=1}^{N/2} [c_{j,B}^\dagger c_{j+1,A} + \text{h.c.}] + \frac{K}{2} N u^2. \quad (85)$$

Vidimo, da je *verjetnost za tuneliranje med celicama, kjer je razmik večji padla za $\Delta t = \lambda u$, znotraj celice pa se je povečala* [1]. Nov Hamiltonijan lahko zapišemo kot kvadratno formo s prilagojeno Fourierovo transformacijo, kjer upoštevamo, da z večjo osnovno celico vzamemo $a \rightarrow 2a$ v faznem faktorju in novo normalizacijo, da ohranimo ortonormiranost:

$$\begin{aligned} c_{j,A} &= \sqrt{\frac{2}{L}} \sum_{k=1}^{N/2} e^{ijk(2a)} d_{k,A}, \\ c_{j,B} &= \sqrt{\frac{2}{L}} \sum_{k=1}^{N/2} e^{i(j+1/2)k(2a)} d_{k,B}. \end{aligned}$$

Po nekaj računanja se prebijemo do :

$$\begin{aligned} H &= \frac{K}{2} N u^2 - \sum_{k=1}^N \begin{pmatrix} d_{k,A}^\dagger & d_{k,B}^\dagger \end{pmatrix} \mathcal{H}(k) \begin{pmatrix} d_{k,A} \\ d_{k,B} \end{pmatrix}; \\ \mathcal{H}(k) &= \begin{pmatrix} 0 & (t + \lambda u)e^{ika} + (t - \lambda u)e^{-ika} \\ (t + \lambda u)e^{-ika} + (t - \lambda u)e^{ika} & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

S pomočjo kanonične transformacije oziroma prek ničel karakterističnega polinoma $\det(\mathcal{H}(k) - \epsilon \mathbf{1}) = 0$ lahko najdemo lastni energiji $\epsilon_{\pm}$. Končna disperzija vsebuje še konstantni člen zaradi potencialne energije:

$$\mathcal{E}_{\pm}(k) = \frac{K}{2} N u^2 \pm 2 \sqrt{t^2 \cos^2(ka) + \lambda^2 u^2 \sin^2(ka)}.$$

Ta se za $u = 0$ poenostavi v disperzijo nemodulirane mreže z dvema atomoma v osnovni celici. Odpre se tudi energijska reža, Δ , podana z razliko energij na robu Brillouinove cone ($k = \pi/2a$):

$$\Delta = (\mathcal{E}_+ - \mathcal{E}_-)|_{k=\pi/2a} = 4\lambda u = 4\Delta t. \quad (86)$$

Ta je sorazmerna z velikostjo odmika ionov.

4 Energija dimerizirane verige

Z novo disperzijo moramo pokazati še, da je **deformirana/dimerizirana postavitve ionov z $u \neq 0$ energijsko bolj ugodna od prvotne verige**. V primeru enega elektrona na ion je pas $\mathcal{E}_-(k)$ zapolnjen do konca. Skupna energija elektronov, E_{el} , v pasu je tako integral po prvi Brillouinovi coni¹ (predfaktor 2 vstopi zaradi spina):

$$E_{\text{el}} = 2 \cdot \frac{Na}{2\pi} \int_{-\pi/2a}^{\pi/2a} -2 \sqrt{t^2 \cos^2(ka) + (\Delta t)^2 \sin^2(ka)} dk, \quad (87)$$

¹Vsoto prepišemo v integral: $1/L \sum_{k < k_F} f(k) = 1/(2\pi) \int_{\text{1.B.C.}} f(k) dk$

V končni fazi nas zanima le razlika energij v obeh verigah, $\delta E_{\text{el.}} = E_{\text{el.}}(\Delta t) - E_{\text{el.}}(0)$. V tem največ prispevajo k v okolici Brillouinove cone (gl. sliko disperzije). Ker je integrand simetričen, lahko pišemo shematsko:

$$\int_{-\pi/2a}^{\pi/2a} \rightarrow 2 \int_0^{\pi/2a} = \int_0^{\pi/2a-\Lambda} + \int_{\pi/2a-\Lambda}^{\pi/2a}, \quad (88)$$

kjer je Λ mejna frekvenca, ki jo uporabimo za regularizacijo integrala (kot v teoriji polja) na robu območja integracije. V razliki $\delta E_{\text{el.}}$ bo prvi integral v zadnji vsoti prispeval red manj kot integral na robu (gl. sliko ??), zato ga zanemarimo, drugi integrand v (87) pa razvijemo okoli roba 1. B. C. (gl. ??), torej $k = -q + \pi/(2a)$. V tem območju velja $\sin(ka) \approx 1$ in $\cos(ka) \approx qa$. Tako velja

$$\begin{aligned} \delta E_{\text{el.}} &\approx -\frac{4Na}{\pi} \int_{\pi/2a-\Lambda}^{\pi/2a} \left(\sqrt{t^2 \cos^2(ka) + (\Delta t)^2 \sin^2(ka)} - t \cos(ka) \right) dk \approx \\ &\approx -\frac{4Na}{\pi} \int_0^{\Lambda} \left(\sqrt{q^2 t^2 a^2 + (\Delta t)^2} - qta \right) dq, \end{aligned}$$

Integral izvednotimo

$$\delta E_{\text{el.}} = -\frac{4Na}{\pi} \left[\frac{\Lambda}{2} \sqrt{(ta)^2 \Lambda^2 + (\Delta t)^2} + \frac{(\Delta t)^2}{2ta} \log \left(\frac{ta\Lambda + \sqrt{(ta)^2 \Lambda^2 + (\Delta t)^2}}{\Delta t} \right) - \frac{ta\Lambda^2}{2} \right] \quad (89)$$

in ga poenostavimo za majhne Δt , tako ostane samo logaritemski člen (prvi in zadnji v prvem redu ne prispevata in se krajšata). Končni razlika prispevka elektronov k energiji je

$$\delta E_{\text{el.}} \simeq -\frac{2N}{\pi t} (\Delta t)^2 \log \left(\frac{1}{\Delta t} \right) + \text{konst.} \propto -u^2 \log \left(\frac{1}{u} \right). \quad (90)$$

Na koncu smo upoštevali, da je $\Delta t = \lambda u$. Pomembno je, v primeru deformirane verige **razlika energij elektronov vsebuje divergentni faktor** $\log(1/u)$, ko gre $u \rightarrow 0$, kar nam že nakazuje, da bo ta prispevek k energiji za majhne odmike po velikosti večji od prispevka dodane vložene potencialne energije zaradi premikov ionov.

Za celotno energijo moramo dodati še elastično energijo $E_{\text{pot.}} = \frac{K}{2} N u^2$, kot kaže slika ???. Za energijsko najbolj ugoden odmik u iščemo **minimum celotne energije**:

$$\frac{d(E_{\text{pot.}} + \delta E_{\text{el.}})}{du} = 0, \quad (91)$$

od koder dobimo enačbo za $u_{\text{min.}}$:

$$K N u - \frac{2N\lambda^2}{\pi t} \left(2u \log \left(\frac{1}{u} \right) - u \right) = 0, \quad (92)$$

iz tu pa sledi, da je energijsko optimalen odmik neničeln

$$u_{\text{min.}} \propto e^{-\frac{\pi K t}{4\lambda^2}} > 0$$

ravnovesni odmik se zmanjšuje z večjimi sklopitvami med ioni K , in elektroni t , in narašča, z večjim faktorjem λ . Funkcija ni analitična za $\lambda \rightarrow 0$, torej perturbativni pristopi tu ne delujejo.

5 Peierlsova nestabilnost v grafenu

V prejšnjih poglavjih smo videli, da je enodimenzionalna veriga vedno nestabilna na dimerizacijo. V dveh dimenzijah, specifično v grafenu, se pojavi podoben pojav, vendar z nekaj razlikami v stabilnosti.

Grafen ima v osnovi trikotno mrežo z dvema atomoma v osnovni celici (Γ_2). Pri analizi nestabilnosti osnovno celico razširimo, podobno kot pri enodimenzionalni dimerizaciji. Energijsko najugodnejša konfiguracija ima tri-števno simetrijo, nova celica (Γ_6) pa vsebuje šest atomov na celico.

Postopek je podoben kot v enodimenzionalnem primeru s primerno več računanja, na koncu dobimo podoben Hamiltonijan, s prekrivalnimi integrali t, u in v , tokrat velikosti 6×6 [2]:

$$\mathcal{H}(k) = \begin{pmatrix} 0 & A(\mathbf{k}) \\ A(\mathbf{k})^* & 0 \end{pmatrix};$$

$$A(\mathbf{k}) = \begin{pmatrix} t & ve^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{b}_1} & u \\ u & t & ve^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{b}_1 + \mathbf{k} \cdot \mathbf{b}_2)} \\ ve^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{b}_2} & u & t \end{pmatrix}.$$

Energijsko režo, pri $k = 0$ (v točki Γ), dobimo spet z računom $\det(\mathcal{H}(k = 0) - \epsilon \mathbb{1}) = 0$:

$$\Delta \propto \sqrt{(t - E)^2 + (u - E)^2 + (v - E)^2}, \quad E = (t + u + v)/3. \quad (93)$$

Pomembna razlika v dvodimenzionalnem primeru grafena je v tem, da se fazni prehod v nižje simetrijsko stanje ne zgodi za poljubne vrednosti sklopitve med ioni K . Za vrednosti nad K_c , je energijsko bolj ugodno, da grafen ostane v trikotni mreži, za $0 < K < K_c$ pa je bolj ugodna mreža z nižjo simetrijo, prikazana na sliki ?? . V tem primeru se odpre reža in grafen ne prevaja več, kot je prikazano na sliki

Literatura

- [1] W. P. Su, J. R. Schrieffer in A. J. Heeger. “Solitons in Polyacetylene”. V: *Phys. Rev. Lett.* 42 (25 jun. 1979), str. 1698–1701. DOI: [10.1103/PhysRevLett.42.1698](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.42.1698). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevLett.42.1698>.
- [2] David Gontier, Thaddeus Roussigné in Éric Séré. *Peierls Instability in Hexagonal Lattices*. 2025. arXiv: [2510.24230](https://arxiv.org/abs/2510.24230) [math-ph]. URL: <https://arxiv.org/abs/2510.24230>.
- [3] Steven M. Girvin in Kun Yang. *Modern Condensed Matter Physics*. Cambridge University Press, 2019.