

1. Was ist ein normierter Raum? Wann sagt man, dass ein normierter Raum Banach ist?

Answer: Let V be a vector space over \mathbb{K} ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ or \mathbb{C}) and $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{R}$. The pair $(V, \|\cdot\|)$ called a normed vectorspace if $\|\cdot\|$ satisfies the following properties:

- (a) $\forall v \in V: \|v\| \geq 0$ and $\|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0_V$
- (b) $\forall v \in V, \lambda \in \mathbb{K}: \|\lambda v\| = |\lambda| \|v\|$
- (c) $\forall u, v \in V: \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$

We call furthermore $(V, \|\cdot\|)$ normed space a Banach space, if it's complete, that is: every Cauchy sequence has a limit in V .

2. Wann sagt man, dass eine Funktion zwischen zwei normierten Räumen stetig ist?

Answer: Consider $(U, \|\cdot\|_U)$ and $(V, \|\cdot\|_V)$ normed spaces, $A \subset U$ and a function $f: A \rightarrow V$. f is continuous in $a \in A$, if $\forall \varepsilon > 0: \exists \delta > 0: \forall x \in A: \|x - a\|_U < \delta \Rightarrow \|f(x) - f(a)\|_V < \varepsilon$. f is continuous on A , if it's continuous in every point of A .

3. Seien X und Z normierte Räume. Was ist die Operatornorm $\|L\|$ einer linearen Abbildung $L: X \rightarrow Z$? Was kann man über $\|L\|$ sagen, wenn L stetig ist?

Answer: $\|L\| = \sup_{\|x\|_X=1} \|Lx\|_Z = \sup_{0 \neq x \in X} \frac{\|Lx\|_Z}{\|x\|_X}$. Linear operators are continuous if and only if they are bounded.

4. Was ist eine Regelfunktion? Welche äquivalenten Charakterisierungen gibt es (wenigstens 2)?

Answer: Let V be a Banach space (including \mathbb{C} or \mathbb{R}). The set $\mathcal{R}([a, b], V)$ of regulated functions is the closure of the set $\mathcal{T}([a, b], V)$ of step functions with regards to the set $B([a, b], V)$ of bounded functions under the $\|\cdot\|_{\sup}$ norm. Equivalently:

- (a) $f \in B([a, b], V)$ is a regulated function $\Leftrightarrow \forall c \in [a, b]: \exists \lim_{x \rightarrow c^+} f(x), \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$
- (b) $f \in B([a, b], V)$ is a regulated function $\Leftrightarrow \exists (f_n) \in \mathcal{T}([a, b], V)$ uniformly convergent sequence of stepfunctions such that $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ (in $B([a, b], V)$)

5. Gib je zwei Beispiele an für

- (a) Regelfunktionen und
- (b) Funktionen, die keine Regelfunktionen sind.

Answer:

- (a) Regelfunktionen:

i. $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 1$

ii. $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} x^2 & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$

- (b) Keine Regelfunktionen:

i. $\mathbb{1}_{\mathbb{Q}}: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} 1 & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$

ii. $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

6. Wie ist das Integral einer Regelfunktion definiert?

Answer: Let V be a Banach space over $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ or \mathbb{C} . Consider any $f \in \mathcal{R}([a, b], V)$ regulated function, and $f_n \in \mathcal{T}([a, b], V)$ sequence of step functions, that converge uniformly to f . Let furthermore $P_n = \{p_0, \dots, p_{k_n}\}$ be such a partition of $[a, b]$ for which $f_n|_{[p_i, p_{i+1}]} = c_i \in V$ constant (with the potential exception of the endpoints). Let the $\int_a^b : \mathcal{T}([a, b], V) \rightarrow V$ linear operator be defined as $\int_a^b f_n = \sum_{i=0}^{k_n} c_i(p_{i+1} - p_i)$. Since $\mathcal{T}([a, b], V)$ is a subspace of $\mathcal{R}([a, b], V)$, there exists a unique continuous continuation $\overline{\int_a^b} : \mathcal{R}([a, b], V) \rightarrow V$ of the linear operator \int_a^b such that their values stays the same on $\mathcal{T}([a, b], V)$. Since $\overline{\int_a^b}$ is continuous, it "commutes" with the limit. Let thus $\int_a^b f := \overline{\int_a^b} f = \overline{\int_a^b} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n$

7. Wie hängen Integration und Differentiation zusammen?

Answer: Let V be a Banach space over $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ or \mathbb{C} , and $f : [a, b] \rightarrow V$ function. Let furthermore $F(x) = \int_a^x f$. If f is continuous in $c \in [a, b]$, then F is differentiable in c , and $F'(c) = f(c)$. Furthermore if f is continuous, and F is such a function, that $F' = f$, then $\int_a^b f = F(b) - F(a)$, and we call F the primitive function of f .

8. Welchen elementaren Funktionen entsprechen folgende unbestimmte Integrale?

$$\int \sin t \, dt \quad \int \frac{dt}{t} \quad \int \sqrt[n]{t+1} \quad \int \frac{1}{1+t^2} \, dt \quad \int t^\alpha \, dt \quad (\alpha \neq -1)$$

Answer:

- $\int \sin t \, dt = -\cos t$
- $\int \frac{dt}{t} = \log t$
- $\int \sqrt[n]{t+1} = \frac{n}{n+1}(t+1)^{1+\frac{1}{n}}$
- $\int \frac{1}{1+t^2} \, dt = \arctan t$
- $\int t^\alpha \, dt = \frac{1}{\alpha+1} t^{\alpha+1} \quad (\alpha \neq -1)$

9. Wie lauten die Regeln für partielle Integration und Substitution? Gib außerdem jeweils ein nicht-triviales Beispiel an.

Answer:

Partial Integration: Consider $f, g \in C^1([a, b], \mathbb{K})$ with $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ or \mathbb{C} . Then $\int_a^b f'(t)g(t) \, dt = f(t)g(t) \Big|_a^b - \int_a^b f(t)g'(t) \, dt$

Example: $\int \log x \, dx = x \log x - \int x \frac{1}{x} \, dx = x \log x - x$

Substitution: Consider $[a, b] \subset I_1, I_2$ intervals, Z Banach space, and $f : I_2 \rightarrow Z$ continuous, and $g : I_1 \rightarrow I_2$ continuously differentiable. Then $\int_{g(a)}^{g(b)} f(t) \, dt = \int_a^b f(g(t))g'(t) \, dt$

Example: Consider $\int_a^b \tan x \, dx$ and let $f(x) = \frac{1}{x}, g(x) = \cos x$. Then $\int_a^b \tan x \, dx = \int_a^b \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = \int_a^b f(g(x))g'(x) \, dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(x) \, dx = \int_{\cos(a)}^{\cos(b)} \frac{1}{x} \, dx = \log x \Big|_{\cos(a)}^{\cos(b)} = \log(\cos(b)) - \log(\cos(a))$

10. Wie integriert man rationale Funktionen? Welche elementaren Integrale muss man dazu kennen?

Answer: TODO Consider $p, q \in \mathbb{K}[x]$ polynomials over \mathbb{K} with $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ or \mathbb{C} .

11. Was sagt das Riemann-Lebesgue Lemma? Skizziere einen Beweis für das Lemma.

Answer: Let $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuously differentiable. Then $\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} \int_a^b f(t) \sin(\omega t) dt = 0$.
Proof:

$$\begin{aligned} \left| \int_a^b f(t) \sin(\omega t) dt \right| &= \left| -\frac{\cos(\omega t)}{\omega} f(t) \Big|_a^b + \frac{1}{\omega} \int_a^b \cos(\omega t) f'(t) dt \right| \\ &< \left| \frac{1}{\omega} \right| \left(|\cos(\omega b) f(b)| + |\cos(\omega a) f(a)| + \int_a^b |\cos(\omega t) f'(t)| dt \right) \\ &\stackrel{\cos \text{ bounded}}{<} \left| \frac{1}{\omega} \right| \left(|\cos(\omega b) f(b)| + |\cos(\omega a) f(a)| + \int_a^b |f'(t)| dt \right) \xrightarrow{|\omega| \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

12. Wann dürfen Regelintegral und Grenzwert einer Funktionenfolge vertauscht werden?

Answer: Consider $f_n \in \mathcal{R}([a, b], V)$ with V Banach space. If f_n converge uniformly to some $f \in \mathcal{R}([a, b], V)$, then $\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n$

13. Wie ist das Riemann-Integral definiert?

Answer: Consider the interval $[a, b]$, a function $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{K}$ (with $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ or \mathbb{C}), and for any partition $P = \{a = p_0 < p_1 < \dots < p_n = b\}$ of $[a, b]$ let $L(f, P) = \sum_{i=1}^n \inf_{x \in (p_{i-1}, p_i)} f(x) (p_i - p_{i-1})$ and $U(f, P) = \sum_{i=1}^n \sup_{x \in (p_{i-1}, p_i)} f(x) (p_i - p_{i-1})$. Let furthermore $U^*(f) = \inf_P U(f, P)$ and $L^*(f) = \sup_P L(f, P)$. If $U^*(f) = L^*(f)$, then we say that f is Riemann integrable, and $\int_a^b f = U^*(f) = L^*(f)$.

14. Was ist eine Lebesgue-Nullmenge?

Answer: $A \subset \mathbb{R}$ is a null set, if $\forall \epsilon > 0$ there is an at most countable collection of open intervals $I = \{I_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ such that $A \subset \cup_{i \in \mathbb{N}} I_i$ and $\sum_{i \in \mathbb{N}} |I_i| < \epsilon$

15. Wie ist das Lebesgue-Integral definiert?

Answer:

16. Gib je ein Beispiel für eine Funktion an, die

- (a) Riemann integrierbar ist, aber ist keine Regelfunktion.
- (b) Lebesgue integrierbar ist, aber nicht Riemann integrierbar.

Answer:

- (a) $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \begin{cases} \sin \frac{1}{x} & x \in (0, 1) \\ 0 & x = 0 \end{cases}$
- (b) The Dirichlet function

17. Was sagt der Satz von Beppo Levi über monotone Folgen Lebesgue-integrierbarer Funktionen?

Answer:

18. Was sagt der Satz zur majorisierten Konvergenz über die Vertauschbarkeit von Lebesgue-Integral und Grenzwert einer Funktionenfolge?

Answer:

19. Wie lautet die Hölder-Ungleichung für integrierbare Funktionen?

Answer:

20. Wie lautet der Schrankensatz? Warum gilt der Mittelwertsatz (der Differentialrechnung) nicht in höheren Dimensionen?

Answer:

Let Z Banach space and $f \in C^1([a, b], Z)$. Then $\exists \zeta \in (a, b): \|f(b) - f(a)\| \leq \|f'(\zeta)\| (b - a)$. The mean value theorem of $f(b) - f(a) = f'(\zeta)(b - a)$ does not hold in general. Consider $Z = \mathbb{R}^3$ and

$f(t) := \begin{pmatrix} \cos t \\ \sin t \\ \varepsilon t \end{pmatrix}$ with some $\varepsilon > 0$. Then $f'(t) = \begin{pmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ \varepsilon \end{pmatrix}$. Now if we consider the $[0, 2\pi]$

interval, then $f(2\pi k) - f(0) = 2\pi \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \varepsilon \end{pmatrix} \neq 2\pi f'(\zeta) \ (\forall \zeta \in [0, 2\pi])$

21. Wie lautet die Integraldarstellung von Lagrange für das Restglied der Taylorentwicklung?

Answer: Let $I = (a, b) \subset \mathbb{R}$ open interval, $n \in \mathbb{N}_0$, Z Banach space and $f \in C^{n+1}(I, Z)$. If $x_0 \in (a, b)$, then $\forall x \in (a, b): f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} f^{(k)}(x_0)(x - x_0)^k + \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x (x - t)^n f^{(n+1)}(t) dt$

22. Wie lautet die Trapezregel?

Answer: Consider $f \in C^2([0, 1], \mathbb{R})$. Then $\exists \zeta \in (0, 1): \int_0^1 f = \frac{1}{2}(f(0) + f(1)) - \frac{1}{12}f''(\zeta)$

23. Wie lassen sich Integrale dank der Trapezregel approximieren?

Answer: Let $f \in C^2([a, b], \mathbb{R})$, $C := \max_{x \in [a, b]} |f''|$, $n \in \mathbb{N}$, $h := \frac{b-a}{n}$. Then it holds that

$$\left| \int_a^b f - \left(\frac{1}{2}f(a_0) + \sum_{k=1}^{n-1} f(a_k) + \frac{1}{2}f(a_n) \right) h \right| \leq \frac{1}{12}C(b-a)h^2$$

24. Was sind uneigentliche Integrale?

Answer: Let $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ and $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ integrable over every finite $[\alpha, \beta] \subset (a, b)$ interval. Consider furthermore $(a_n), (b_n) \in \mathbb{R}$ respectively monotone decreasing and increasing sequences such that $a < a_n$ and $b_n < b$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) and suppose furthermore that $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ and $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. If for every such sequence the limit $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} f$ exists and has the same value, then let $\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} f$ and call it the improper integral of f over (a, b) .

25. Für welche reellen Exponenten α konvergiert das uneigentliche Integral $\int_0^1 t^\alpha dt$, für welche das uneigentliche Integral $\int_1^\infty t^\alpha dt$?

Answer:

- $\int_0^1 t^\alpha dt = \frac{1}{\alpha+1} \ (-1 < \alpha \in \mathbb{R})$
- $\int_1^\infty t^\alpha dt = -\frac{1}{q+1} \ (-1 > q \in \mathbb{R})$

26. Was bedeutet absolute Konvergenz uneigentlicher Integrale? Gib Beispiele

- (a) absolut konvergenter;
- (b) konvergenter, aber nicht absolut konvergenter;
- (c) nicht konvergenter

uneigentlicher Integrale.

Answer: Consider the improper integral $\int_a^b f$. If $\int_a^b |f|$ converges, then so is $\int_a^b f$, and we call the improper integral absolute convergent.

- (a) absolute convergent: $\int_0^1 \sin \frac{1}{t} dt$
- (b) convergent, but not absolutely: $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t} \sin t dt$
- (c) not convergent: $\int_1^{+\infty} \frac{1}{t} dt$

27. Sei $f : [0, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ monoton fallend. Wie hängen $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ und $\int_1^{\infty} f(t) dt$ zusammen?

Answer: $\sum_{k=1}^{\infty} f(k)$ converges if and only if $\int_1^{\infty} f(t) dt$ converges. Furthermore

$$\sum_{k=2}^{\infty} f(k) \leq \int_1^{\infty} f(t) dt \leq \sum_{k=1}^{\infty} f(k)$$

28. Welche der folgenden uneigentlichen Riemann-Integrale existieren? Welche konvergieren absolut?

- $\int_1^{\infty} \cos t dt$
- $\int_1^{\infty} \cos t^2 dt$
- $\int_1^{\infty} \frac{\cos t}{t} dt$
- $\int_1^{\infty} \frac{\cos^2 t}{t} dt$
- $\int_1^{\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$
- $\int_1^{\infty} \frac{\cos^2 t}{t^2} dt$

Answer: TODO

29. Warum konvergiert die Reihe der Riemannsche ζ -Funktion $\zeta(s) := \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s}$ für $\operatorname{Re} s > 1$?

Answer: Let $q = \operatorname{Re} s$. Then $\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{1}{k^s} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^q}$ converges iff $\int_1^{\infty} \frac{1}{t^q} dt$ converges. But this improper integral exists exactly when $1 < q \in \mathbb{R}$. Thus if $\operatorname{Re} s > 1$ then $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^s}$ is absolutely convergent, and thus also converges conditionally.

30. Wie ist die Gamma-Funktion definiert, und welche Funktionalgleichung erfüllt sie?

Answer: Let $\Gamma(\alpha) := \int_0^{\infty} t^{\alpha-1} e^{-t} dt$ ($\forall \alpha \in \mathbb{C}, \operatorname{Re} \alpha > 0$). Then $\Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha)$ and since $\Gamma(1) = 1 = 0!$ it holds follows from a simple induction that $\Gamma(n + 1) = n!$ ($\forall n \in \mathbb{N}_0$).

31. Wie lautet die Stirling-Formel zur Approximation von $n!$?

Answer:

32. Wie ist die Faltung $\varphi \star f$ von zwei Funktionen $\varphi, f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definiert?

Answer:

33. Was ist eine Dirac-Folge? Gib eine Definition und wenigstens ein Beispiel an.

Answer:

34. Sei $\varphi_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine Dirac-Folge und sei $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig mit $f(x) = 0$ für $|x| \geq 1$. Bestimme $\lim_{n \rightarrow \infty} (\varphi_n * f)$ für jedes $x \in \mathbb{R}$.

Answer:

35. Wie lautet den Approximationssatz von Weierstrass?

Answer:

36. Welche Funktionen können durch Polynome gleichmäßig approximiert werden? Mit welcher Grundidee lassen sich approximierende Polynome zu einer gegebenen Funktion f konstruieren?

Answer:

37. Was ist ein Hilbertraum? Gib zwei unendlich-dimensionale Beispiele.

Answer:

38. Was sind die Fourierkoeffizienten einer 2π -periodischen Funktion $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$? Wie lautet die Fourier-Reihe zu f ?

Answer:

39. Beschreibe wie 2π -periodische $f \in L^2$, die Fourier-Reihe $\hat{f}(t) := \sum_{k \in \mathbb{Z}} c_k e^{ikt}$, und Fourier-Koeffizienten $(c_k)_{k \in \mathbb{Z}} \in \ell^2$ miteinander zusammenhängen.

Answer:

40. Wie hängen Fourier-Reihen mit Obertönen in der Musik zusammen?

Answer: