




**Enquête Démographique et de
Santé de la République
Démocratique du Congo III (EDS-**

- **État nutritionnel des enfants**
- Allaitement et Pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (PANJE)
- Anémie
- Micronutriments
- État nutritionnel des femmes




Trouver ces données
dans **Chapitre 11**
du Rapport Final

Tendances d'indicateurs de mesure de la croissance de l'enfant

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition

OBJECTIFS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Indicateurs
2.2.1, 2.2.2




EDS-RDC 2007 EDS-RDC II 2013-2014 EDS-RDC III 2023-2024

Indicateurs de mesure de la croissance de l'enfant selon le sexe

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la croissance est sous-optimale


■ Féminin ■ Masculin



Indicateurs de mesure de la croissance de l'enfant par niveau d'instruction de la mère

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans atteints de malnutrition


■ Aucun ■ Primaire ■ Secondaire ■ Supérieur



Indicateurs de mesure de la croissance de l'enfant par bien-être économique

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans dont la croissance est sous-optimale


■ Le plus bas ■ Seconde ■ Moyen ■ Quatrième ■ Le plus élevé



Retard de croissance selon la province

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance


RDC 45 %



Émaciation selon la province

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant de l'émaciation


RDC 7 %



Surpoids selon la province


Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans présentant un surpoids

RDC 4 %




Suivi de la croissance de l'enfant

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans pour lesquels un prestataire de santé a effectué certaines mesures dans les 3 mois ayant précédé l'enquête




- État nutritionnel des enfants
- **Allaitement et Pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (PANJE)**
- Anémie
- Micronutriments
- État nutritionnel des femmes



Trouver ces données
dans **Chapitre 11**
du Rapport Final


Allaitement initial

Pourcentage d'enfant de moins de 2 ans :




Allaitement des enfants de moins de 6 mois

Parmi les plus jeunes enfants de 0-5 mois vivant avec leur mère :




Introduction d'aliments complémentaires

79 % d'enfants de 6-8 mois ont consommé des aliments solides, semi-solides ou mous le jour précédent




Diversification alimentaire minimum selon le milieu de résidence

Pourcentage des plus jeunes enfants de 6-23 mois vivant avec leur mère qui ont reçu un apport alimentaire minimum acceptable




Pratiques alimentaires malsaines

Pourcentage d'enfants de 6-23 mois ayant eu des pratiques alimentaires malsaines spécifiées, durant le jour ou la nuit ayant précédé l'enquête



Indicateurs d'évaluation des Pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (PANJE)

Pourcentage d'enfants nourris en suivant des différentes pratiques
PANJE




Conseil sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant

Parmi les femmes de 15-49 ans dont l'enfant le plus jeune de 6-23 mois vit avec elles, pourcentage ayant parlé, dans les 6 derniers mois, avec un prestataire de santé ou un agent de santé communautaire de la façon ou de quoi nourrir leur enfant




- État nutritionnel des enfants
- Allaitement et Pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (PANJE)
- **Anémie**
- Micronutriments
- État nutritionnel des femmes



Trouver ces données
dans **Chapitre 11**
du Rapport Final

Prévalence de l'anémie chez les enfants


Pourcentage d'enfants de 6-59 mois considérés comme étant anémique :



Anémie chez les femmes enceintes et non enceintes


Pourcentage de femmes de 15-49 ans classées comme étant anémiques

■ Enceinte ■ Non enceinte



Enceinte	<10,5 g/dl	9,5-10,9 g/dl	7,0-9,9 g/dl	<7,0 g/dl
Non enceinte	<12,0 g/dl	11,0-11,9 g/dl	8,0-10,9 g/dl	<8,0 g/dl

- État nutritionnel des enfants
- Allaitement et Pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (PANJE)
- Anémie
- **Micronutriments**
- État nutritionnel des femmes




Trouver ces données
dans **Chapitre 11**
du Rapport Final

Suppléments en micronutriments et déparasitage parmi les enfants

Pourcentage d'enfants de 6-59 mois à qui on a donné du/des

Pourcentage d'enfants de 12-59 mois à qui on a donné des:




Présence de sel iodé dans le ménage

89 % des ménages dont le sel a été testé pour la présence d'iode.

95 % du sel testé contenait de l'iode.



- État nutritionnel des enfants
- Allaitement et Pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (PANJE)
- Anémie
- Micronutriments
- **État nutritionnel des femmes**




Trouver ces données
dans **Chapitre 11**
du Rapport Final

État nutritionnel des femmes

Répartition (en %) des femmes de 20-49 ans par Indice de Masse Corporelle (IMC) et des femmes de 15-19 ans par IMC-pour-âge


■ Maigreur modérée ou sévère ■ Maigreur légère ■ Normal ■ Surpoids

■ Obèse



Diversification alimentaire minimum parmi les femmes selon le milieu de résidence


Pourcentage de femmes de 15-49 ans qui ont consommé d'aliments d'au moins 5 groupes d'aliments parmi les 10 groupes



Consommation d'aliments et de boissons malsaines parmi les femmes selon le milieu de résidence

Pourcentage de femme de 15-49 ans qui ont consommé :

■ RDC ■ Urbain ■ Rural



Résultats Clés

- **45 %** d'enfants de moins de 5 ans présentent un **retard de croissance**.
- **7 %** d'enfants de moins de 5 ans présentent **l'émaciation**.
- **25 %** d'enfants de moins de 5 ans présentent une **l'insuffisance pondérale**.
- **52 %** d'enfants de moins de 6 mois sont **exclusivement allaité**.
- **70 %** d'enfants de 6-59 mois, **49 %** de femmes enceintes et **51 %** de femmes non enceintes de 15-49 ans sont **anémiques**.
- **23 %** de femmes de 20-49 ans et **9 %** de femmes de 15-19 ans sont **surpoids ou obèses**.
- **25 %** du sel testé aux ménages **contient de l'iode**.