


Santé infantile

#EDSRDCIII



Enquête Démographique et de Santé de la République Démocratique du Congo III (EDS-


- **Vaccination**
- Maladies infantiles



Trouver ces
données dans
Chapitre 10
du Rapport Final


Tendances de la couverture vaccinale des enfants

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu :



Vaccinations de l'enfance


Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu certains vaccins à n'importe quel moment avant l'enquête



Vaccinations selon le sexe


Pourcentage d'enfants de 12-23 mois ayant reçu :

■ Féminin ■ Masculin




Couverture vaccinale selon le niveau d'instruction de la mère

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés (conformément au calendrier national) à un moment quelconque avant l'enquête




Couverture vaccinale selon le bien-être économique

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés (conformément au calendrier national) à un moment quelconque avant l'enquête




Couverture vaccinale selon la province

Pourcentage d'enfants de 12-23 mois complètement vaccinés (conformément au calendrier national) à un moment quelconque avant l'enquête



RDC 10 %

- Vaccination
- **Maladies infantiles**




Trouver ces
données dans
Chapitre 10
du Rapport Final

Symptômes des maladies infantiles et recours aux soins

Pourcentage d'enfants de moins de 5 ans ayant présenté les symptômes au cours des 2 dernières semaines

Parmi ceux ayant présentés des symptômes, pourcentage pour lesquels on a recherché des conseils ou un traitement




Source des conseils ou traitements pour les enfants ayant présenté des symptômes

Des conseils ou traitements pour les enfants ayant présentés des symptômes d'infection respiratoire aiguë, de la fièvre et la diarrhée est plus fréquemment recherché auprès des établissements du **secteur médical privé (non-ONG)** qu'auprès des établissements du secteur public ou des établissements du secteur médical privé (ONG).


Pratiques alimentaires durant la diarrhée

Répartition (en %) des enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview par quantité de liquides et d'aliments donnée par rapport aux quantités habituelles



Traitements contre la diarrhée

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant eu la diarrhée au cours des 2 semaines ayant précédé l'interview, pourcentage à qui on a donné



Résultats Clés

- **21 %** des enfants de 12-23 mois sont **complètement vaccinés (antigènes de base)**.
- **10 %** des enfants de 12-23 mois sont **complètement vaccinés (conformément au calendrier national)**.

Parmi les enfants de moins de 5 ans ayant des symptômes, des conseils ou un traitement ont été recherchés pour :

- **60 %** d'enfants ayant des symptômes d'infection respiratoire aiguë.
- **51 %** d'enfants fébriles.
- **45 %** d'enfants diarrhéiques.
- **39 %** d'enfants diarrhéiques **ont reçu une thérapie de réhydratation par voie orale et la poursuite**