

ЛЕКЦИЯ 2. ОПРЕДЕЛИТЕЛИ

2.1. Основные понятия


Определителем матрицы первого порядка $A = (a_{11})$, или определителем первого порядка называется элемент a_{11}

$$\Delta_1 = |A| = a_{11}$$

Определителем матрицы 2-го порядка $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, или определителем 2-го порядка,

называется число $\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$

Вычисление определителя 2-го порядка иллюстрируется схемой:



Пример. Найти определители матриц

$$\begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 6 \end{pmatrix} \text{ и } \begin{pmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

Решение:

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 2 \cdot 6 - 5 \cdot (-3) = 12 - (-15) = 27;$$

$$\begin{vmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{vmatrix} = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1.$$

Определителем матрицы 3-го порядка, или определителем 3-го порядка, называется число, вычисляемое по формуле

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} -$$

$$- a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}$$


Правило треугольников (Саррюса)



Определитель третьего порядка можно вычислить, если дописать к нему справа два его первых столбца, а затем перемножить элементы и сложить со знаками плюс или минус, как показано на схеме

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot a_{22} \cdot a_{33} + a_{12} \cdot a_{23} \cdot a_{31} + a_{13} \cdot a_{21} \cdot a_{32} -$$

$$- a_{13} \cdot a_{22} \cdot a_{31} - a_{11} \cdot a_{23} \cdot a_{32} - a_{12} \cdot a_{21} \cdot a_{33}$$



$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ -3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-4) + 2 \cdot (-2) \cdot (-3) + 3 \cdot 0 \cdot 4 - 3 \cdot (-1) \cdot (-3) - 1 \cdot (-2) \cdot 4 - 2 \cdot 0 \cdot (-4) =$$

$$= 4 + 12 + 0 - 9 + 8 + 0 = 15.$$

Правило треугольника

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ -3 & 4 & -4 \end{vmatrix} = 1 \cdot (-1) \cdot (-4) + 3 \cdot 0 \cdot 4 + (-3) \cdot 2 \cdot (-2) - (3 \cdot (-1) \cdot (-3) + 1 \cdot 4 \cdot (-2) + (-4) \cdot 2 \cdot 0) =$$

$$= 4 + 0 + 12 - (9 - 8 - 0) = 16 - 1 = 15.$$

2.2 Свойства определителей

1. Если какая-либо строка (столбец) матрицы состоит из одних нулей, то ее определитель

равен нулю. $\begin{vmatrix} a & b \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 0 = 0$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 9 \\ 0 & 5 & 12 \end{vmatrix} = 0$$

2. Если имеется две одинаковые строки (столбца), определитель равен нулю.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ a & b \end{vmatrix} = ab - ab = 0$$

$$\begin{vmatrix} 7 & 1 & 1 \\ 8 & 3 & 3 \\ 0 & 5 & 5 \end{vmatrix} = 0$$

3. Если элементы двух строк (столбцов) пропорциональны, то определитель равен нулю.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ ka & kb \end{vmatrix} = kab - kab = 0 \qquad \begin{vmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 12 & 3 & 9 \\ 20 & 5 & 12 \end{vmatrix} = 0$$

4. Если все элементы какой-либо строки (столбца) умножить на число, то определитель умножится на это число.

$$\begin{vmatrix} c & d \\ ka & kb \end{vmatrix} = kcb - kad = k(cb - ad) = k \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} \qquad \begin{vmatrix} 4 & 5 & -1 \\ 12 & 0 & 9 \\ 20 & 5 & 12 \end{vmatrix} = 4 \begin{vmatrix} 1 & 5 & -1 \\ 3 & 0 & 9 \\ 5 & 5 & 12 \end{vmatrix}$$

5. При перестановке 2-х строк (столбцов) определитель меняет знак.

$$\begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix} = cb - ad \qquad \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - cb = -(cb - ad) = - \begin{vmatrix} c & d \\ a & b \end{vmatrix}$$

6. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ

Определитель не изменится, если:

- параллельные строки (столбцы) поменять местами четное число раз.
- строки сделать столбцами, а столбцы строками (транспонировать определитель)
- к элементам одной строки (столбца) прибавить элементы другой строки (столбца), умноженные на одно и то же число.
- Определитель произведения 2-х квадратных матриц, равен произведению их определителей.

Пример Преобразовать определитель

$$\begin{aligned} & \begin{vmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 12 & 2 & 9 \\ 20 & 3 & 12 \end{vmatrix} = (\text{к элементам 3-го столбца прибавим элементы второго столбца}) = \\ & \begin{vmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 12 & 2 & 11 \\ 20 & 3 & 15 \end{vmatrix} = (\text{к первому столбцу прибавим второй, умноженный на } (-4)) = \\ & \begin{vmatrix} 4+1 \cdot (-4) & 1 & -1 \\ 12+2 \cdot (-4) & 2 & 9 \\ 20+2 \cdot (-4) & 3 & 12 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 11 \\ 12 & 3 & 15 \end{vmatrix} = (\text{третья строка кратна 3}) = 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 4 & 2 & 11 \\ 4 & 1 & 5 \end{vmatrix} = \\ & = (\text{от второй строки отнимем третью}) = 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 6 \\ 4 & 1 & 5 \end{vmatrix} = (\text{от второй строки отнимем первую}) = \\ & = 3 \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ 4 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 3(0 + 24 + 0 - 0 - 0 - 0) = 72 \end{aligned}$$

2.3. Разложение определителя по элементам ряда.

Минором некоторого элемента a_{ij} определителя n -го порядка называется определитель $n-1$ порядка, полученный из исходного путем вычеркивания строки и столбца, на пересечении которых находится выбранный элемент.

Обозначается M_{ij}

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad M_{21} = \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Алгебраическим дополнением элемента a_{ij} определителя называется его минор, взятый со знаком „+”, если $i+j$ - четное число, и со знаком „-”, если $i+j$ - нечетное число.

Обозначается A_{ij}

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad A_{21} = (-1)^{2+1} M_{21} = -M_{21} = - \begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Теорема. Определитель равен сумме произведений элементов некоторой строки (столбца) на соответствующие им алгебраические дополнения.

Доказательство

$$\begin{aligned} \Delta &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \cdot A_{11} + a_{12} \cdot A_{12} + a_{13} \cdot A_{13} = \\ &= a_{11} \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12} \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13} \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = \\ &= a_{11}(a_{22}a_{33} - a_{23}a_{32}) - a_{12}(a_{21}a_{33} - a_{23}a_{31}) + a_{13}(a_{21}a_{32} - a_{22}a_{31}) = \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} = \Delta \end{aligned}$$

Пример

$$\begin{vmatrix} 4 & 6 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \\ 4 & -2 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 4 & 6 \end{vmatrix} = (\text{разложим определитель по 3-му столбцу}) =$$

$$= -2 \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \\ 6 & 4 & 6 \end{vmatrix} - 3 \cdot (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 4 & 6 & 4 \\ 4 & -2 & 0 \\ 6 & 4 & 6 \end{vmatrix} + 1 \cdot (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 4 & 6 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 6 & 4 & 6 \end{vmatrix} + 4 \cdot (-1)^{4+3} \begin{vmatrix} 4 & 6 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{vmatrix}$$

Замечание 1. Для разложения определителя обычно выбирают тот ряд, где есть нулевые элементы, т.е. соответствующие им слагаемые в разложении будут равны нулю.

Считать четыре определителя долго и неинтересно. Поэтому преобразуем наш определитель так, чтобы какой либо столбец (строка) содержал три нуля.

$$\begin{vmatrix} 4 & 6 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \\ 4 & -2 & 1 & 0 \\ 6 & 4 & 4 & 6 \end{vmatrix} = (\text{к первой строке прибавим вторую, умноженную на } (-4),$$

а к четвертой строке прибавим вторую, умноженную на $(-6)) =$

$$= \begin{vmatrix} 0 & -2 & 10 & 0 \\ 1 & 2 & -3 & 1 \\ 4 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -8 & 22 & 0 \end{vmatrix} = (\text{разложим по 4-му столбцу. Вычеркиваем 2-ю строку и 4-й столбец}) =$$

$$= 1 \cdot (-1)^{2+4} \begin{vmatrix} 0 & -2 & 10 \\ 4 & -2 & 1 \\ 0 & -8 & 22 \end{vmatrix} = (\text{разложим по 1-му столбцу. Вычеркиваем 2-ю строку и 1-й столбец}) =$$

$$= 4 \cdot \begin{vmatrix} -2 & 10 \\ -8 & 22 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-2) \cdot \begin{vmatrix} 1 & 10 \\ 4 & 22 \end{vmatrix} = -8 \cdot 2 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 11 \end{vmatrix} = -16 \cdot (11 - 20) = 128$$

Замечание 2.

Сумма произведений элементов какой либо строки (столбца) определителя на алгебраические дополнения соответствующих элементов другой строки (столбца), равна нулю.

Например $a_{11} \cdot A_{21} + a_{12} \cdot A_{22} + a_{13} \cdot A_{23} = 0$

Доказательство.

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad A_{11} = a_{22} \quad A_{12} = -a_{21}$$

$$a_{21} \cdot A_{11} + a_{22} \cdot A_{12} = a_{21} \cdot a_{22} - a_{22} \cdot a_{21} = 0$$

Пример 1. Вычислить определитель:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Вычтем из третьей строки элементы первой строки, а к элементам четвёртой строки прибавим элементы первой строки, тогда будем иметь

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

В первом столбце все элементы, кроме первого, - нули. То есть, определитель можно уже разложить по первому столбцу. Но нам очень не хочется вычислять определитель третьего порядка. Поэтому произведём ещё преобразования: к элементам третьей строки прибавим элементы второй строки, умноженные на 2, а из элементов четвёртой строки вычтем элементы второй строки. В результате определитель, являющийся алгебраическим дополнением, сам может быть разложен по первому столбцу и нам останется только вычислить определитель второго порядка и не запутаться в знаках:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & 7 \\ 0 & 1 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1) \cdot \begin{vmatrix} 2 & 7 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = 4 + 7 = 11.$$

Пример 2. Вычислить определитель

$$A = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

в котором все элементы по одну сторону от главной диагонали равны нулю.

Решение. Разложим определитель A по первой строке:

$$A = a_{11}A_{11} = a_{11} \begin{vmatrix} a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ a_{32} & a_{33} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n2} & a_{n3} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

Определитель, стоящий справа, можно снова разложить по первой строке, тогда получим:

$$A = a_{11} \cdot a_{22} \begin{vmatrix} a_{33} & 0 & \dots & 0 \\ a_{43} & a_{44} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n3} & a_{n4} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

И так далее. После n шагов приходим к равенству $A = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ -1 & 0 & 3 & \dots & n \\ -1 & -2 & 0 & \dots & n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ -1 & -2 & -3 & \dots & 0 \end{vmatrix}.$$

Пример 3. Вычислить определитель

Решение. Если к каждой строке определителя, начиная со второй, прибавить первую строку, то получится определитель, в котором все элементы, находящиеся ниже главной

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ 0 & 2 & 6 & \dots & 2n \\ 0 & 0 & 3 & \dots & 2n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & n \end{vmatrix},$$

диагонали, будут равны нулю. А именно, получим определитель: равный исходному.

Рассуждая, как в предыдущем примере найдем, что он равен произведению элементов главной диагонали, т.е. $n!$. Способ, с помощью которого вычислен данный определитель, называется способом приведения к треугольному виду.

Правило Крамера

Правило Крамера позволяет решить систему n линейных уравнений с n неизвестных.

Тогда система (1) имеет единственное решение, если $\Delta A \neq 0$

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\Delta_n}{\Delta}$$

Определитель Δ составляется из коэффициентов при неизвестных. Вспомогательные определители $\Delta_1, \Delta_2, \dots, \Delta_n$ получаются из определителя путем замены первого, второго, третьего и т.д. столбцов столбцом свободных членов.

Для системы 3-х уравнений с тремя неизвестными:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{2n}x_2 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix} \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$$

$$x_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} \quad x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} \quad x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}$$

Недостаток метода: большая трудоемкость, связанная с вычислением определителей большого порядка.