

РЕКОМЕНДАЦИИ

и некоторые сведения
в условиях зоны повышенной радиации г.Киева

Состав выбросов в атмосферу: выброшено 200 изотопов, 30 элементов, из них 45% короткоживущих, 55% - от 7 суток и выше.

Долгоживущие:

- стронций 89 - 4,70%, опасен для с/х животных;
- стронций 90 - 5,77%, 28 лет, откладывается в костях;
- ванадий 91 - 5,4%, 58 суток;
- рутений 102 - 3%;
- цирконий 42 - 5,6%, 6 суток;
- рутений 106 - 0,38%, 1 год;
- барий 140 - 6,75%, 12,8 суток;
- цезий 137 - 6,12%, 30 лет;
- германий 141- 6%, 33 дня;
- германий 144- 6%, 288 суток.

Стронций выводится красным вином. 5 лет при данной радиации 0,3 мкр/час можно заболеть лучевой болезнью.

Йодистые препараты - 47 изотопов:

- йод 126 - 13,3 дня;
- йод 129 - 1720 лет;
- йод 131 - 8,06 дня;
- йод 132 - 2,6 дня;
- йод 133 - 20,9 часа;
- йод 134 - 54 мин.;
- йод 135 - 7,6 часа;

Норма фона 0.02. Глубина проникновения: чем больше плотность и больше пористость, тем лучше масштаб проникновения радиации в продукт.

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| Мука - 0,5см | соль - 3 см |
| манка - 1 см | почва - 5 см |
| сахар - 0,5 см | овощи, фрукты - 10 см |
| крупа, зерно - 2-3 см | все в буртах - 15-30см |

Рекомендованный суточный рацион питания в настоящее время:

- вода - 1л., сыр - 50-100г., рыба - 100г, мясо - 100г, сметана - 200г, масло - 50г., зелень - 100г, Итого - 2.6л

Картофель, морковь практически не заражаются, свинина в 10 раз меньше забирает радиации, чем говядина. При варке мяса в бульон переходит 60% радиации. Кипятить его нужно 1-2 часа, первую воду слить после 20 минут кипячения, затем снова залить и варить.

Дезактивацию воды: отстаивание 10-15 минут, слить верхнюю часть, примерно 2/3 - для употребления, остальное вылить в канализацию.

Способы дезактивации: механический - сметение, вытряхивание, а также с помощью пылесоса. Для жидкостей - фильтрование, перегонка, отстаивание, влажная уборка с мылом и порошком.

Для выведения радиации:

1. Красные соки /виноградный, томатный, морковный, черешневый/
2. Красное вино "Каберне" (детям по 1-2 чайные ложки пополам с водой за 1-2 часа до еды/.
3. Одна таблетка 3 раза в день глюкозы с витамином "С".
4. Витамин А не более 2 недель по 1 капсуле 2 раза в день.
5. 4-5 орехов в день.
6. Редиска в неограниченном количестве
7. Обильное питье.
8. Творог - 3 ложки творога, 1 сырое яйцо взбить с 1 ложкой меда, запить кефиром.

Нельзя: щавель, шпинат, салат, т.к. они содержат щавелевую кислоту, которая нарушает усвоение кальция.

Необходимо включать в меню продукты, богатые солями кальция - твердые плавленые сыры, сгущенное молоко, а также соленья, тертый хрен со столовой свеклой, смородина, цитрусовые, пасту из криля, морскую капусту, морскую рыбу.