



# BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL

légumes industrie

N°13 31 juillet 2012

P 1/5

## En Bref

#### Carotte:

 La mouche est toujours présente

#### Brocoli

Le vol de la mouche diminue.
Vigilance sur d'autres ravageurs.

#### Pois

 Les captures de tordeuse stagnent



Chenille de la piéride du chou (HYPPZ - INRA)

## Sommaire

- Carotte
  - La mouche de la carotte
- Brocoli
  - La mouche du chou
  - Maladies
  - Divers
- Pois
  - La tordeuse du pois









légumes industrie

N°13

31 juillet 2012

P 2/5

### Carotte

Une pression moyenne qui reste constante.

#### La mouche de la carotte

Que ce soit sur les cultures de carotte, de céleri rave ou de persil, la mouche de la carotte est présente de manière non négligeable sur 4 des 27 parcelles suivies.

		Fin	semaine 29	Début semaine 30				
		Stade	Nb captures*	Stade	Nb captures*			
Secteur de Hennebont - Auray								
Kervignac	Lothuen 2	2 fc	0	1 fv	0			
Brandérion		2 fv	1	3 fv	0			
Kervignac	Locadour	2 fc	1	1 FV	0			
Secteur de Plouay - Caudan								
Caudan	Keroual	2 fc	0	1 fv	0			
Secteur du Finistère Sud								
Riec sur Bélon	Lesseye (persil)	12 fv	23	14 fv	10			
Elliant	Kernevez Jaouen	8 fv	0	9 fv	0			
Bannalec		8 fv	9	8 fv	10			
Bannalec	Kerverc'h	8 fv	5	9 fv	6			
Mellac	Le Letty	8 fv	1	9 fv	3			
Mellac (céleri rave)	Kercouant	10 fv	0	12 fv	2			
Riec sur Bélon	Kernatous			8 fv	2			
Secteur de Vannes - Locminé								
Sérent	9-10 fv	0	récolte	0				
Questembert	Le Penher	9 fv	0	récolte	0			
Elven	Le Cosquer	8 fv	2	8-10 fv	0			
St Avé	Gouascouin	7-8 fv	0	8-9 fv	0			
Locqueltas	Kervelzo	8 fv	0	8-10 fv	0			
Secteur de Baud - Pontivy - Rohan								
Bréhan	Lintan			4 fv	0			
Kerfourn	Le Govern			5-6 fv	0			
Guéni n	Kersec'h			5 fv	0			
St Barthélémy			1 12	10.5	40			
(céleri rave)	Bodeven			13 fv	18			










11 373		Fin semaine 28		Début semaine 29				
		Stade	Nb captures*	Stade	Nb captures*			
Secteur de Ménéac - Ploërmel								
Ploërmel	La Ville Bouquet			4 fv	0			
Taupont	Les Fontenelles			4 fv	0			
Ménéac (céleri rave)	L'hermitage	11 fv	0	12 fv	0			
Ménéac	Couesnéhan	3-4 fv	0	4 fv	0			
Ménéac	La Chênaie			4-5 fv	0			
Lanouée	Brantry			2-3 fv	2			
Secteur de Guéméné-sur-Scorff								
Locmalo	Kerbourdonnet			5-6 fv	0			

La cour be moyenne reste donc dans les mêmes or dres de pression que la semaine passée, dans le même type de dynamique que les années antérieures.



#### Maladies

Pas de pression notable liée aux maladies.











légumes industrie

N°13

31 juillet 2012

P 4/5


### Brocoli

Malgré plusieurs dépassements de seuil, la moyenne est à la baisse.

#### La mouche du chou

Le seuil de nuisibilité est dépassé sur 3 des 7 par celles suivies, ceci étant, la moyenne générale continue de descendre, comme les années passées à la même période.

			Fin de semaine 29			début de semaine 30		
Dpmt	Commune	Lieu-dit	Stade	Nb d'œufs	Nb œuf/jour/feutrine	Stade	Nb d'œufs	Nb œuf/jour/feutrine
29	Riec sur Bélon	Lesseye	initiation	54	1,80	initiation	107	2,68
56	Lanester	Métairie du Parc	6 fv	30	1,00	7 fv	11	0,28
	Kervignac	Kercaradec	8 fv	73	2,43	8 fv	52	1,30
	Lanouée	Brantry				récolte	15	0,08
	Kerfourn	Lesdanic				récolte	20	0,11
	Colpo (brocoli)		8-10 fv	0	0,00	8-10 fv	0	0,00
	Colpo (Chou fleur)		4-5 fv	0	0,00	4-5 fv	0	0,00













## légumes industrie

N°13

31 juillet 2012

P 5/5

#### **Maladies**

Avec des conditions plus sèches sur les derniers jours, les problèmes de maladies sont moins présents. Malgré tout, le mildiou est présent dans les cultures en assez forte proportion.

#### Divers

La mouche est moins présente, les maladies presque inexistantes, mais un autre problème reste à surveiller, la période est propice à l'apparition des différentes piérides, aussi bien sur les brocolis que sur les choux fleurs. Dans le cas d'une pression importante, les plants peuvent être rapidement défoliés sans interventions. La cécidomyie du chou-fleur est ponctuellement très préoccupante. Ses attaques provoquent beaucoup d'avortement du bourgeon terminal.

### Pois

Il y a peu d'évolution dans les captures de tordeuse.

#### La tordeuse du pois

Aucune nouvelle capture n'est à signaler sur les trois parcelles de pois suivies. La pression de la tordeuse aura été relativement faible pendant toute la saison.

	Commune		Nombre de captures <u>cumulées</u>				
Département		lieu-dit	Fin s	emaine 29	Début semaine 30		
			Stade	Nb papillons	stade	Nb papillons	
29	Melgven	Guerveur	floraison	2	fin floraison	2	
56	Moréac	Borborin	floraison	5	fin floraison	5	
22	Mur de Bretagne	Coet Drien			récolte	20	

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation santaire régionale, celle-ci ne peut être transposée telle quelle à la parcelle. La Chambre Régionale d'Agriculture dégage toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures et les invite à prendre ces décisions sur la base d'observations réalisées euxmêmes dans leurs cultures et/ou sur les préconisations de bulletins techniques.

L'ensemble des observations contenues dans ce bulletin Rédaction : UNILET a été réalisé par les partenaires suivants :

CECAB, TRISKALIA, COOPERATIVE STYVI, UNILET

Direction de Publication

Chambre d'Agriculture de Bretagne Antenne de Dinan ZA des Alleux 8E rue de la Bise 22100 TADEN

Tel: 02 96 85 89 42 Contact : Alix DELEGLISE

6 rue Jean Marie Le Gall BP 35 - 29 393 Quimperle Cedex

 Frédéric LE GUENNOU, Mathieu SANDRONE Co animateurs légumes industrie 02 98 39 33 24

Jean Luc PEDEN Animateur légumes Comité de Relecture :

UNILET, DRAAF-SRAL, Chambre Régionale d'agriculture







