幾何学 1

akari0koutya

2026 年 4 月 28 日

目次

1 第 1 回：ガイダンス (2026/04/14) ・・・

図 1　結び目の例

このように、距離にも種類があり、多様な距離の定め方に通用する概念として距離を抽象化して考える。

集合 X に対し、距離が満たすべき性質として、以下の条件を考えられる:

- $d(x,y) \geq 0$ かつ $d(x,y) = 0$ ならば $x = y$
- $d(x,y) = d(y,x)$
- $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$　　（三角不等式）

1.3　教科書

- 小山晃著, 位相空間論：現代数学への基礎, 森北出版, 2021.

2　第 2 回：(2026/04/21)

2.1　距離関数と距離空間

定義 2.1
X を集合、$d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ を写像とし、以下の条件を満たすとする：

- $d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
- $d(x,y) = d(y,x)$
- $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$　　（三角不等式）

このとき、d を X 上の**距離**と呼び、(X,d) を**距離空間**と呼ぶ。

注意 2.2
距離空間 (X,d) の定義から直ちに導ける性質として次のものがある：

- 任意の $x, y \in X$ に対して、$d(x,y) \geq 0$ を満たす。

注意 2.3
距離空間 (X,d) という表記を X と省略して表記することもある。

例 2.4
距離空間の例として、以下のものがある：

- **ユークリッド距離**：$\mathbb{R}^n$ 上の距離を

$$d(x,y) = \sqrt{(x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2 + \cdots + (x_n-y_n)^2}$$

と定めると、これは距離空間となる。
　実際、

$$\begin{aligned} d(x,y) = 0 &\Leftrightarrow (x_1-y_1)^2 + (x_2-y_2)^2 + \cdots + (x_n-y_n)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow x_1 = y_1, x_2 = y_2, \ldots, x_n = y_n \\ &\Leftrightarrow x = y \end{aligned}$$

であり、コーシー・シュワルツの不等式より、

$$\begin{aligned} d(x,z)^2 &= (x_1-z_1)^2 + (x_2-z_2)^2 + \cdots + (x_n-z_n)^2 \\ &= ((x_1-y_1)+(y_1-z_1))^2 + \cdots + ((x_n-y_n)+(y_n-z_n))^2 \\ &\leq 2((x_1-y_1)^2 + \cdots + (x_n-y_n)^2) + 2((y_1-z_1)^2 + \cdots + (y_n-z_n)^2) \\ &= 2d(x,y)^2 + 2d(y,z)^2 \\ &\leq 4(d(x,y)+d(y,z))^2 \end{aligned}$$

- $I = [0,1]$、

$$C(I) := \{f \mid f\colon I \to \mathbb{R} \text{ は連続関数}\}$$

とする。$C(I)$ 上の距離を、

$$d(f,g) = \sup_{x \in I} |f(x) - g(x)|$$

と定めると、これは距離空間となる。
　ここで、$f, g \in C(I)$ に対し、$|f(x)-g(x)|$ は I における連続関数のため、最大値・最小値の定理より、必ず最大値を取る点 $x_0 \in I$ が存在する。したがって、

$$\sup_{x \in I} |f(x) - g(x)| = |f(x_0) - g(x_0)|$$

となるので、$d(f,g)$ は距離空間の定義を満たす。

定義 2.5
距離空間 $(X,d), (X',d')$ が**等しい**とは、$X = X'$ かつ $d = d'$ であることをいう。つまり、$X = X'$ かつ任意の $x, y \in X$ に対して、$d(x,y) = d'(x,y)$ を満たすことをいう。

例 2.6
以下、さらに距離空間の例を挙げる：

- **マンハッタン距離**：$\mathbb{R}^n$ 上の距離を

$$d(x,y) = |x_1-y_1| + |x_2-y_2| + \cdots + |x_n-y_n|$$

と定めると、これは距離空間となる。

これは、ユークリッド距離とは異なる距離空間である。例えば、$x=(0,0), y=(1,1)$ に対して、ユークリッド距離は $\sqrt{2}$ であるのに対し、マンハッタン距離は 2 である。

- **チェビシェフ距離**：$\mathbb{R}^n$ 上の距離を、

$$d(x,y)=\max\{|x_1-y_1|,|x_2-y_2|,\ldots,|x_n-y_n|\}$$

と定めると、これは距離空間となる。

これは、ユークリッド距離ともマンハッタン距離とも異なる距離空間である。例えば、$x=(0,0), y=(1,1)$ に対して、ユークリッド距離は $\sqrt{2}$、マンハッタン距離は 2 であるのに対し、これは 1 である。

- **パリ距離**：$\mathbb{R}^n$ 上の距離を

$$d(x,y):=\begin{cases}\sqrt{(x_1-y_1)^2+\cdots+(x_n-y_n)^2} & (\exists\lambda\in\mathbb{R}, x=\lambda y)\\ \sqrt{(x_1-0)^2+\cdots+(x_n-0)^2}+\sqrt{(y_1-0)^2+\cdots+(y_n-0)^2} & (\text{その他})\end{cases}$$



図 2　2 次元の場合のマンハッタン距離の図



図 3　$\mathbb{R}^2$ におけるパリ距離の例

例 2.7
引き続き、さらに距離空間の例を挙げる：
$f, g \in C([a,b])$ に対して、

$$d_1(f,g) = \int_a^b |f(x) - g(x)|\, dx$$
$$d_2(f,g) = \sqrt{\int_a^b |f(x) - g(x)|^2\, dx}$$

と定めると、d_1, d_2 は $C([a,b])$ に距離を定める。

2.2 点列の収束と極限

$\mathbb{N}$ を正の整数全体の集合とする。

定義 2.8
(X,d) を距離空間とする。

- 点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が $x \in X$ に**収束**するとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $n \geq N$ に対して $d(x_n, x) < \varepsilon$ を満たすことをいう。つまり、

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, d(x_n, x) < \varepsilon$$

を満たすことをいう。x を点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ の**極限**と呼び、$\lim_{n\to\infty} x_n = x$ や $x_n \to x\,(n \to \infty)$ と表記する。
- X 上の点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ と $\mathbb{N}$ の無限部分集合 I に対して、点列 $\{x_n\}_{n\in I}$ を**部分列**と呼ぶ。

命題 2.9
以下が成り立つ：

(1) 点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が x に収束するならば、x は $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ の唯一の極限である。つまり、点列の極限は一意である。
(2) 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して $x_n = x$ であるとき、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ は x に収束する。
(3) 点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が x に収束するならば、任意の部分列 $\{x_{i(n)}\}_{n\in I}$ も x に収束する。
(4) 点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ の任意の部分列 $\{x_{i(n)}\}_{n\in I}$ が x に収束するならば、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ も x に収束する。
(5) 点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ に対し、ある $\delta > 0$ が存在して、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して $d(x_n, x) \geq \delta$ が成り立つならば、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ の任意の部分列 $\{x_{i(n)}\}_{n\in I}$ は収束しない。

証明 (1)：点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が x に収束するならば、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $n \geq N$ に対して $d(x_n, x) < \varepsilon$ を満たす。

もし、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が y にも収束すると仮定すると、同様に、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $M \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $n \geq M$ に対して $d(x_n, y) < \varepsilon$ を満たす。ここで、$\varepsilon > 0$ を任意に取るとき、ある $K = \max\{N, M\} \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $n \geq K$ に対して、

$$\begin{aligned} d(x,y) &\leq d(x, x_n) + d(x_n, y) \\ &< \varepsilon + \varepsilon \\ &= 2\varepsilon \end{aligned}$$

を満たす。ε は任意であるため、$d(x,y)=0$ を満たす。距離空間の定義より、$y=x$ である。したがって、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ の極限は一意である。

(2)： 任意の $n\in\mathbb{N}$ に対して $x_n=x$ であるとき、任意の $\varepsilon>0$ に対して、任意の $n\in\mathbb{N}$ に対して $d(x_n,x)=d(x,x)=0<\varepsilon$ を満たす。したがって、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ は x に収束する。

(3)： 点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が x に収束するならば、任意の $\varepsilon>0$ に対して、ある $N\in\mathbb{N}$ が存在して、任意の $n\geq N$ に対して $d(x_n,x)<\varepsilon$ を満たす。$\{x_{i(n)}\}_{n\in I}$ を $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ の部分列とすると、$i(n)\geq n$ であるから、任意の $n\geq N$ に対して $d(x_{i(n)},x)<\varepsilon$ を満たす。したがって、部分列 $\{x_{i(n)}\}_{n\in I}$ も x に収束する。

(4)：背理法で示す。
もし点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が x に収束しないと仮定すると、ある $\varepsilon>0$ が存在して、任意の $N\in\mathbb{N}$ が存在して、ある $n\geq N$ が存在して、$d(x_n,x)\geq\varepsilon$ を満たす。ここで、$\{n_k\}_{k\in\mathbb{N}}$ をこの条件を満たすように選んだ点列とすると、部分列 $\{x_{n_k}\}_{k\in\mathbb{N}}$ は x に収束しない。これは背理法の仮定に反する。したがって、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ も x に収束する。

(5)：背理法で示す。
もし点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ のある部分列 $\{x_{i(n)}\}_{n\in I}$ が x に収束すると仮定する。すると、任意の $\varepsilon>0$ に対して、ある $N\in\mathbb{N}$ が存在して、任意の $n\geq N$ に対して $d(x_n,x)<\varepsilon$ を満たす。$\{x_{i(n)}\}_{n\in I}$ は $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ の部分列なので $i(n)\geq n$ であるから、任意の $n\geq N$ に対して $d(x_{i(n)},x)<\varepsilon$ を満たす。しかし、ε は任意であるため、ある $\delta>0$ が存在して、任意の $n\in\mathbb{N}$ に対して $d(x_n,x)\geq\delta$ を満たすという仮定に矛盾する。したがって、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ の任意の部分列 $\{x_{i(n)}\}_{n\in I}$ は収束しない。 □

3 第 3 回：(2026/04/28)

3.1 平面 $\mathbb{R}^2$ 上の点列

定理 3.1
$\{(x_n,y_n)\}$：$\mathbb{R}^2$ 上の点列, $(\mathbb{R}^2,d)$：2 次元ユークリッド空間.
このとき、

$$\lim_{n\to\infty}(x_n,y_n)=(x,y)$$

であることと、

$$\lim_{n\to\infty}x_n=x,\quad \lim_{n\to\infty}y_n=y$$

であることは同値である。

証明 $\Rightarrow$：$\lim_{n\to\infty}(x_n,y_n)=(x,y)$ とする。任意の $\varepsilon>0$ に対して、ある $N\in\mathbb{N}$ が存在して、任意の $n\geq N$ に対して、

$$d((x_n,y_n),(x,y))=\sqrt{(x_n-x)^2+(y_n-y)^2}<\varepsilon$$

を満たす。ここで、$\sqrt{(x_n-x)^2+(y_n-y)^2}<\varepsilon$ であるから、$|x_n-x|<\varepsilon$ および $|y_n-y|<\varepsilon$ を満たす。したがって、$\lim_{n\to\infty}x_n=x$ および $\lim_{n\to\infty}y_n=y$ である。
$\Leftarrow$：$\lim_{n\to\infty}x_n=x,\quad \lim_{n\to\infty}y_n=y$ とする。任意の $\varepsilon>0$ に対して、ある $N_1,N_2\in\mathbb{N}$ が存在して、任

意の $n \geq N_1$ に対して $|x_n - x| < \varepsilon/\sqrt{2}$ を満たし、任意の $n \geq N_2$ に対して $|y_n - y| < \varepsilon/\sqrt{2}$ を満たす。ここで、ある $N = \max\{N_1, N_2\} \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $n \geq N$ に対して、

$$d((x_n, y_n), (x, y)) = \sqrt{(x_n - x)^2 + (y_n - y)^2} < \sqrt{\left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{\varepsilon}{\sqrt{2}}\right)^2} = \varepsilon$$

を満たす。したがって、$\lim_{n\to\infty}(x_n, y_n) = (x, y)$ である。 □

補題 3.2

X：集合, d, d'：X 上の距離.

ここで、ある $k > 0$ が存在して、任意の $x, y \in X$ に対して、

$$d(x, y) \leq k \cdot d'(x, y)$$

を満たすとする。このとき、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が x に対して d によって収束するならば、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ は x に対して d' によっても収束する。

証明　点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ が x に対して d によって収束するならば、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $n \geq N$ に対して $d(x_n, x) < \varepsilon$ を満たす。ここで、ある $k > 0$ が存在して、任意の $x, y \in X$ に対して $d(x, y) \leq k \cdot d'(x, y)$ を満たすので、任意の $n \geq N$ に対して、

$$d'(x_n, x) \leq k \cdot d(x_n, x) < k \cdot \varepsilon$$

を満たす。ε は任意であるため、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ は x に対して d' によっても収束する。 □



命題 3.3

$\{p_n\}$：$\mathbb{R}^2$ 上の点列, $X \in \mathbb{R}^2$：点.

d_2：2 次元ユークリッド距離, d_2^P：2 次元パリ距離, d_2^F：2 次元チェビシェフ距離.

このとき、次は同値である：

(1) 点列 $\{p_n\}$ は X に対して d_2 によって収束する。
(2) 点列 $\{p_n\}$ は X に対して d_2^P によって収束する。
(3) 点列 $\{p_n\}$ は X に対して d_2^F によって収束する。

証明　(1) ⇒ (2)：任意の $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^2$ に対して、

$$\begin{aligned} d_2^P((x, y), (x', y')) &\leq d_2((x, y), (x', y')) \\ &\leq \sqrt{2} \cdot d_2^P((x, y), (x', y')) \end{aligned}$$

を満たす。したがって、補題 3.2 より、点列 $\{p_n\}$ は X に対して d_2^P によって収束する。

(2) $\Rightarrow$ (3)：任意の $(x,y),(x',y') \in \mathbb{R}^2$ に対して、

$$\begin{aligned} d_2^F((x,y),(x',y')) &\leq d_2^P((x,y),(x',y')) \\ &\leq 2 \cdot d_2^F((x,y),(x',y')) \end{aligned}$$

を満たす。したがって、補題 3.2 より、点列 $\{p_n\}$ は X に対して d_2^F によって収束する。

(3) $\Rightarrow$ (1)：任意の $(x,y),(x',y') \in \mathbb{R}^2$ に対して、

$$\begin{aligned} d_2((x,y),(x',y')) &\leq \sqrt{2} \cdot d_2^F((x,y),(x',y')) \\ &\leq 2 \cdot d_2((x,y),(x',y')) \end{aligned}$$

を満たす。したがって、補題 3.2 より、点列 $\{p_n\}$ は X に対して d_2 によって収束する。 □

例 3.4

上の状況で、各 n に対し、$p_n = \left(1, \frac{1}{n}\right)$, $X = (1,0)$ とする。すると、点列 $\{p_n\}$ は X に対して d_2 によって収束するが、点列 $\{p_n\}$ は X に対して d_2^P によって収束しない。

実際、任意の $n \in \mathbb{N}$ に対して、

$$\begin{aligned} d_2(p_n, X) &= \sqrt{(1-1)^2 + \left(\frac{1}{n} - 0\right)^2} = \frac{1}{n} \to 0 \quad (n \to \infty) \\ d_2^P(p_n, X) &= d_2(p_n,(0,0)) + d_2((0,0),X) \\ &= \sqrt{1^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2} + \sqrt{1^2 + 0^2} \\ &= \sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1 \to 2 \quad (n \to \infty) \end{aligned}$$

を満たす。 したがって、点列 $\{p_n\}$ は X に対して d_2 によって収束するが、点列 $\{p_n\}$ は X に対して d_2^P によって収束しない。

例 3.5

X：集合, $p_0(x,y) := \begin{cases} 0 & (x = y) \\ 1 & (x \neq y) \end{cases}$.

p_0 は X 上の距離を定める。この距離空間 (X, p_0) を**離散距離空間**と呼ぶ。

任意の点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ と点 $x \in X$ に対して、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ は x に対して p_0 によって収束するならば、ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $n \geq N$ に対して $x_n = x$ を満たす。逆に、ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $n \geq N$ に対して $x_n = x$ を満たすならば、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ は x に対して p_0 によって収束する。したがって、点列 $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ は x に対して p_0 によって収束することと、ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して、任意の $n \geq N$ に対して $x_n = x$ を満たすことは同値である。

3.2　距離空間の開集合

定義 3.6

(X, d)：距離空間, $x \in X$：点, $\varepsilon > 0$.

$$U_d(x;\varepsilon) := \{y \in X \mid d(x,y) \leq \varepsilon\}$$

を X 上の点 x と実数 ε に対する ε-**近傍**と呼ぶ。、$U(x;\varepsilon)$ と略記することもある。

例 3.7

$(\mathbb{R}^2, d_2)$：2 次元ユークリッド距離空間, $x = (0,0)$：点, $\varepsilon > 0$.
このとき、$U_{d_2}(x;\varepsilon)$ は原点を中心とする半径 ε の円盤の内部である。



例 3.8

$(\mathbb{R}^3, d_3)$：3 次元ユークリッド距離空間, $x = (0,0,0)$：点, $\varepsilon > 0$.
このとき、$U_{d_3}(x;\varepsilon)$ は原点を中心とする半径 ε の球体の内部である。



図 4　$U_{d_3}(x;\varepsilon)$ **は原点を中心とする半径** ε **の開球である。**

例 3.9

$(\mathbb{R}^2, d_2^P)$：2 次元パリ距離空間, $x = (0,0)$：点, $\varepsilon > 0$.

このとき、$U_{d_2^P}(x;\varepsilon)$ は原点を中心とする半径 ε の正方形の内部である。つまり、

$$U_{d_2^P}(x;\varepsilon) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| < \varepsilon\}$$

である。



図 5　$U_{d_2^P}(x;\varepsilon) = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid |x| + |y| < \varepsilon\}$

補題 3.10

(X,d)：距離空間, $x \in X$：点

このとき、次が成り立つ：

(1) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して、$x \in U_d(x;\varepsilon)$ を満たす。

(2) 任意の $\varepsilon \geq \delta > 0$ に対して、$U_d(x;\delta) \subseteq U_d(x;\varepsilon)$ を満たす。

(3) 任意の $\varepsilon > 0$ に対して $y \in U_d(x;\varepsilon)$ ならば、ある $\delta > 0$ が存在して、$U_d(y;\delta) \subseteq U_d(x;\varepsilon)$ を満たす。

(1) の証明　任意の $\varepsilon > 0$ に対して、$d(x,x) = 0 < \varepsilon$ を満たす。したがって、$x \in U_d(x;\varepsilon)$ を満たす。 □

(2) の証明　任意の $\varepsilon \geq \delta > 0$ に対して、任意の $y \in U_d(x;\delta)$ に対して $d(x,y) < \delta \leq \varepsilon$ を満たす。したがって、$U_d(x;\delta) \subseteq U_d(x;\varepsilon)$ を満たす。 □

(3) の証明　任意の $\varepsilon > 0$ に対して $y \in U_d(x;\varepsilon)$ ならば、$d(x,y) < \varepsilon$ を満たす。したがって、$\delta = \varepsilon - d(x,y) > 0$ とおくと、任意の $z \in U_d(y;\delta)$ に対して $d(y,z) < \delta$ を満たす。よって、

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + (\varepsilon - d(x,y)) = \varepsilon$$

を満たす。したがって、$U_d(y;\delta) \subseteq U_d(x;\varepsilon)$ を満たす。 □

定義 3.11

(X,d)：距離空間, $U \subseteq X$.

U が X の**開集合**であるとは、任意の $x \in U$ に対して、ある $\varepsilon > 0$ が存在して $U_d(x;\varepsilon) \subseteq U$ を満たすことをいう。

命題 3.12

(X, d)：距離空間.

このとき、任意の $\varepsilon > 0$ に対して、$U_d(x;\varepsilon)$ は X の開集合である。

証明　任意の $y \in U_d(x;\varepsilon)$ に対して、$d(x,y) < \varepsilon$ を満たす。したがって、$\delta = \varepsilon - d(x,y) > 0$ とおくと、任意の $z \in U_d(y;\delta)$ に対して $d(y,z) < \delta$ を満たす。よって、

$$d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z) < d(x,y) + (\varepsilon - d(x,y)) = \varepsilon$$

を満たす。したがって、$U_d(y;\delta) \subseteq U_d(x;\varepsilon)$ を満たす。したがって、任意の $y \in U_d(x;\varepsilon)$ に対して、ある $\delta > 0$ が存在して $U_d(y;\delta) \subseteq U_d(x;\varepsilon)$ を満たす。したがって、$U_d(x;\varepsilon)$ は X の開集合である。 □

定理 3.13

(X, d)：距離空間, $U \subseteq X$.　このとき、次の性質が成り立つ：

(1) X と $\emptyset$ は X の開集合である。

(2) 有限個の開集合 $\mathcal{O}_1, \mathcal{O}_2, \ldots, \mathcal{O}_n$ の和集合 $\bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$ は X の開集合である。

(3) 任意の個数の開集合 $\{\mathcal{O}_i\}_{i \in I}$ の和集合 $\bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$ は X の開集合である。

(1) の証明　任意の $x \in X$ に対して、ある $\varepsilon > 0$ が存在して $U_d(x;\varepsilon) \subseteq X$ を満たす。したがって、X は X の開集合である。

$\emptyset$ は空集合であるから、任意の $x \in \emptyset$ に対して、ある $\varepsilon > 0$ が存在して $U_d(x;\varepsilon) \subseteq \emptyset$ を満たす。したがって、$\emptyset$ は X の開集合である。 □

(2) の証明　任意の $x \in \bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$ に対して、任意の $1 \leq i \leq n$ に対して $x \in \mathcal{O}_i$ を満たす。したがって、任意の $1 \leq i \leq n$ に対して、ある $\varepsilon_i > 0$ が存在して $U_d(x;\varepsilon_i) \subseteq \mathcal{O}_i$ を満たす。ここで、$\varepsilon = \min\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n\} > 0$ とおくと、任意の $1 \leq i \leq n$ に対して $U_d(x;\varepsilon) \subseteq U_d(x;\varepsilon_i) \subseteq \mathcal{O}_i$ を満たす。したがって、任意の $1 \leq i \leq n$ に対して $U_d(x;\varepsilon) \subseteq \mathcal{O}_i$ を満たす。したがって、$U_d(x;\varepsilon) \subseteq \bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$ を満たす。したがって、$\bigcap_{i=1}^n \mathcal{O}_i$ は X の開集合である。 □

(3) の証明　任意の $x \in \bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$ に対して、ある $i_0 \in I$ が存在して $x \in \mathcal{O}_{i_0}$ を満たす。したがって、ある $\varepsilon > 0$ が存在して $U_d(x;\varepsilon) \subseteq \mathcal{O}_{i_0}$ を満たす。したがって、$U_d(x;\varepsilon) \subseteq \bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$ を満たす。したがって、$\bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$ は X の開集合である。 □