



Betegtájékoztató és beleegyező nyilatkozat (Mellkascsapolás)

Beteg neve:.....

TAJ:

Beavatkozás: A mellhártya lemezei között felszaporodott folyadék terápiás illetve diagnosztikus célból történő leszívása.

Tájékoztatjuk, hogy a tervezett beavatkozás elvégzéséhez írásos beleegyezése szükséges. Ez a tájékoztató segíti Önt annak megértésében, hogy a beavatkozásnak mi a technikai kivitele, melyek a szövődményei. A beleegyezés aláírása előtt kérjük gondosan olvassa el a betegtájékoztatót, és amennyiben további kérdése van a beavatkozással kapcsolatban, forduljon a vizsgálatot végző orvoshoz.

A vizsgálatot végző orvos a tájékoztató beszélgetés során részletesen elmagyarázza az Ön esetében várható, tervezett beavatkozást.

A beavatkozás célja:

A mellhártya tüdő és mellkasfalat borító lemezei között a tüdő illetve más belső szervek megbetegedése esetén folyadék szaporodhat fel. A beavatkozás során a folyadék leszívásával a tüdőnek több helye legyen kitágulni, összenyomott állapota megszűnjön és ismét a normál méretét vehesse fel. A leszívott folyadékot laboratóriumban elemzhetik.

A vizsgálat leírása:

A folyadék elhelyezkedését az orvos röntgen-, ultrahangvizsgálat, illetve kopogtatás segítségével tudja meghatározni. A beavatkozás közben Ön ül, kicsit előrehajol és a szék támláján támaszkodik. A mellkas bőrének fertőtlenítő oldattal történő többszöri lemosása után a bőrön keresztül a bordák között tűt szúrnak be, és érzéstelenítő oldatot fecskendeznek be, hogy a vizsgálat ideje alatt ne érezzen a páciens fájdalmat. Ezt követően fecskendővel vagy speciális szívókészülékkel kiszívják a mellkasból a folyadékot.

Ha Önnek gyógyszerérzékenysége van, például a helyi érzéstelenítő szerekre, mindenképpen jelezze kezelőorvosának. Ha vérzékenységben szenved vagy véralvadástgátló gyógyszereket (pl: Syncumár, Colfarit, Astrix) szed jelezze orvosának, mert ezek növelik a vérzéses szövődmények kockázatát. Ha Önnek szívbillentyű betegsége van, szükség lehet arra, hogy a vizsgálat előtt antibiotikumot szedjen, melyről a kezelőorvosnak kell döntenie.

Lehetséges szövődmény:

Teljes kockázatmentesség semmilyen orvosi beavatkozás esetén sem garantálható. Leggyakoribb szövődmény a légmell. Ebben az esetben a mellhártya két lemeze közé levegő kerül, a tüdő összeesik, és a légzés romlik.

A beavatkozás tervezett időtartama: a lebocsátandó folyadék függvényében 5-10 perc.



Nyilatkozat a beavatkozás elvégzéséhez

Kijelentem, hogy a fenti tájékoztatást megértettem. Kellő idő állt rendelkezésemre, hogy a fentiek elfogadásáról szabadon dönthessek. A feltett kérdéseimre választ kaptam. A beavatkozás elvégzéséhez hozzájárulok.

.....
felvilágosító orvos aláírása, Ph.

.....
beteg aláírása

.....
törvényes képviselő aláírása

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem, hogy jogom van a beavatkozás elutasítására. Tisztában vagyok azzal, hogy a beavatkozás elmaradása esetén milyen következménnyel számolhatok. Nyilatkozatommal megerősítem, hogy a felajánlott beavatkozásba nem egyezem bele.

.....
beteg aláírása

.....
törvényes képviselő aláírása

Farkasgyepű, 20...

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú (név, lakcím):

Tanú (név, lakcím):