## Tera atlas

## IURUS DUFOUREIUS (Brullé, 1832) • ŠTÍR ŘECKÝ

## akva tera fórum

Čeled: luridae (štírovití)

Řád: Scorpiones (štíři)

Výskyt: Evropa – Řecko

**Velikost:** 75 až 85 mm (měřeno bez klepet). Jedná se o vůbec největší evropský druh štíra.

**Pohlavní rozdíly:** Samec má více zprohýbány prsty klepet a celá klepeta jsou nepatrně robustnější. Na fotografiích je samice.

Chov a odchov: Postačí jednoduše zařízené terárium s udusanou zeminou (lignocelem), několika úkryty a napáječkou. Terárium by mělo být větší, například 30x15x20 cm (d,v,š) a s vlhkou částí. Teplota může kolísat mezi 25 a 30 °C. U tohoto druhu nejsou problémem ani poklesy na 20 °C a je možné ho nechat i zimovat.

Poznámky: Tento štír se často u nás chová, jelikož se dá přivézt z dovolené z Peloponéského poloostrova. Dříve se předpokládalo, že turecké a řecké exempláře patří ke stejnému druhu. Řecký *l. dufoureius* se však od většího tureckého *l. asiaticus* odlišuje méně výrazným pohlavním dimorfismem, který spočívá v prohýbání prstů klepet u samců. Toxicky nejsou štíři rodu *lurus* pro člověka nebezpeční. Po systematických změnách publikovaných v letošním roce patří do čelei luridae pouze rody *lurus* a *Calchas*. Americké příbuzné rody jsou nově řazeny do čeledi Caraboctonidae.



