

\*  $f(x,y) = 8x^3 + y^3 - 12xy + 8$

ekstremlerini araştırın.

Pinar Albayrak  
Final  
Uygulama

$f_x = 24x^2 - 12y = 0$  ①

①'den  $y = 2x^2$  bulunur.

↓ ② de yazalım

$f_y = 3y^2 - 12x = 0$  ②

$3 \cdot 4x^4 - 12x = 0$

$12x(x^3 - 1) = 0 \rightarrow x = 0$   
 $\rightarrow x = 1$

$x = 0 \xrightarrow{①} y = 0 \rightarrow \text{K.N.} (0,0)$

$x = 1 \rightarrow y = 2 \rightarrow (1,2)$

$A = f_{xx} = 48x$

$B = f_{xy} = -12$

$C = f_{yy} = 6y$

	$A = 48x$	$B = -12$	$C = 6y$	$B^2 - AC$
$(0,0)$	0	-12	0	$(-12)^2 - 0 > 0 \Rightarrow (0,0)$ Eyer N.
$(1,2)$	48	-12	12	$(-12)^2 - 12 \cdot 48 < 0$ $A = 48 > 0$ } $(1,2)$ genel min. nokta

\*  $f(x,y) = 2y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 12xy$  max/min?

$f_x = 6x - 12y = 0$  ①

①'den  $x = 2y$

↓ ②

$f_y = 6y^2 - 6y - 12x = 0$  ②

$6y^2 - 6y - 24y = 0$

$6y^2 - 30y = 0 \rightarrow y = 0$   
 $\rightarrow y = 5$

$y = 0 \xrightarrow{①} x = 0 \rightarrow \text{K.N.} (0,0)$

$y = 5 \xrightarrow{①} x = 10 \rightarrow (10,5)$

$A = f_{xx} = 6$

$B = f_{xy} = -12$

$C = f_{yy} = 12y - 6$

	$A = 6$	$B = -12$	$C = 12y - 6$	$B^2 - AC$
$(0,0)$	6	-12	-6	$(-12)^2 - (-6) \cdot 6 > 0 \Rightarrow (0,0)$ Eyer N.
$(10,5)$	6	-12	54	$(-12)^2 - 54 \cdot 6 < 0$ $A = 6 > 0$ } $(10,5)$ genel min. noktası

\*  $f(x,y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$  ekstremum noktaları?

$$\begin{cases} f_x = y - 2x - 2 = 0 \\ f_y = x - 2y - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y - 2x = 2 \\ -2y + x = 2 \end{cases} \Rightarrow x = y = -2 \Rightarrow (-2, -2) \rightarrow \text{kritik nokta}$$

$$A = f_{xx} = -2 \quad B = f_{xy} = 1 \quad C = f_{yy} = -2 \Rightarrow \begin{aligned} B^2 - AC &= 1 - 4 = -3 < 0 \\ A &= -2 < 0 \end{aligned} \Rightarrow (-2, -2) \text{ yerel max nokta}$$

\*  $f(x,y) = 4 + x^3 + y^3 - 3xy$  fonksiyonunun kritik noktalarını bulup sınıflandırın.

$$f_x = 3x^2 - 3y = 0 \quad (1) \quad \text{den} \quad 3x^2 - 3y = 0 \rightarrow y = x^2$$

$$f_y = 3y^2 - 3x = 0 \quad (2)$$

$$\begin{aligned} x=0 &\xrightarrow{(1)} y=0 \rightarrow (0,0) \\ x=1 &\xrightarrow{(2)} y=1 \rightarrow (1,1) \end{aligned} \quad \text{K.N}$$

$$\begin{aligned} 3x^4 - 3x &= 0 \\ 3x(x^3 - 1) &= 0 \rightarrow \boxed{x=0} \\ &\rightarrow \boxed{x=1} \end{aligned}$$

$$A = f_{xx} = 6x \quad B = f_{xy} = -3 \quad C = f_{yy} = 6y$$

	$A = 6x$	$B = -3$	$C = 6y$	$B^2 - AC$
$(0,0)$	0	-3	0	$9 > 0 \rightarrow (0,0)$ Eyer N.
$(1,1)$	6	-3	6	$(-3)^2 - 6 \cdot 6 < 0$ $A = 6 > 0$ } $(1,1)$ yerel minimum nokta

\*  $f(x,y) = x^3 - 3x + 2y^2 + 2$  max/min?

$$\begin{cases} f_x = 3x^2 - 3 = 0 \rightarrow x = \pm 1 \\ f_y = 4y = 0 \rightarrow y = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} (1,0) \\ (-1,0) \end{aligned} \quad \text{K.N}$$

$$A = f_{xx} = 6x \quad B = f_{xy} = 0 \quad C = f_{yy} = 4$$

	$A = 6x$	$B = 0$	$C = 4$	$B^2 - AC$
$(1,0)$	6	0	4	$0 - 6 \cdot (4) < 0, A = 6 > 0 \Rightarrow (1,0)$ min nokta
$(-1,0)$	-6	0	4	$0 - 4 \cdot (-6) > 0 \rightarrow (-1,0)$ Eyer Noktası

(2)

2016-yaz dölü

Soru 3-a)  $x^2 + 2y^2 + z^2 = 7$  elipsoidinin  $\vec{r}(t) = t^{-1}\vec{i} + t\vec{j} + (3-t)\vec{k}$  eğrisine  $P(1,1,2)$  noktasında paralel olup-olmadığını araştırınız. (13 P)

Yüzeyin normali,  $F = x^2 + 2y^2 + z^2 - 7$  ile

$$\nabla F = \langle 2x, 4y, 2z \rangle \Big|_{(1,1,2)} = \langle 2, 4, 4 \rangle$$

Eğrinin ~~teğet~~ vektörü  $\vec{r}'(t) = \langle -\frac{1}{t^2}, 1, -1 \rangle$  ve

$$t=1 \text{ ile } \vec{r}'(1) = \langle -1, 1, -1 \rangle$$

$$\nabla F \cdot \vec{r}'(1) = \langle 2, 4, 4 \rangle \cdot \langle -1, 1, -1 \rangle = -2 \neq 0 \text{ old. den}$$

yüzey, eğriye paralel değildir.

Soru 3-b)  $x^2 + y^2 + z^2 = 4y + 2z + 5$  küresi ile  $3x^2 + 2y^2 - 2z = 3$  paraboloidi  $P(1,2,4)$  noktasında kesişmektedir. Bu noktadaki açığı bulunuz. (12 P)

$$\left. \begin{aligned} F(x,y,z) &= x^2 + y^2 + z^2 - 4y - 2z - 5 \\ G(x,y,z) &= 3x^2 + 2y^2 - 2z - 3 \end{aligned} \right\}$$

$$\nabla F = \langle 2x, 2y-4, 2z-2 \rangle \Big|_P = \langle 2, 0, 6 \rangle$$

$$\nabla G = \langle 6x, 4y, -2 \rangle \Big|_P = \langle 6, 8, -2 \rangle$$

$$\cos \theta = \frac{\nabla F \cdot \nabla G}{|\nabla F| |\nabla G|} = 0 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2} //$$



\*)  $g(\frac{x}{z}) = yz$  ise  $x \cdot z_x - y \cdot z_y = z$  olduğunu gösterin.

F:  $g(\frac{x}{z}) - yz = 0 \rightarrow$  Kapalı Fonk.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = - \frac{f_x}{f_z} = - \frac{\frac{1}{z} \cdot g'(\frac{x}{z})}{-\frac{x}{z^2} \cdot g'(\frac{x}{z}) - y} = \frac{z \cdot g'(\frac{x}{z})}{x g'(\frac{x}{z}) + y z^2}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = - \frac{f_y}{f_z} = - \frac{-z}{-\frac{x}{z^2} g'(\frac{x}{z}) - y} = - \frac{z^3}{x g'(\frac{x}{z}) + y z^2}$$

$$x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{x z g'(\frac{x}{z})}{x g'(\frac{x}{z}) + y z^2} + \frac{y z^3}{x g'(\frac{x}{z}) + y z^2} = \frac{z (x g'(\frac{x}{z}) + y z^2)}{x g'(\frac{x}{z}) + y z^2} = z \quad \checkmark$$

\*)  $\frac{(2,05)^2}{(0,95)^2}$  sayısını a) lineerleştirme ile b) diferansiyel hesap ile } yaklaşıklık olarak hesaplayın.

$f(x,y) = \frac{x^2}{y^2}$   $x_0 = 2$   $y_0 = 1$  olsun.

a)  $L(x,y) = f(x_0,y_0) + f_x(x_0,y_0) \cdot (x-x_0) + f_y(x_0,y_0) \cdot (y-y_0)$

$f_x = \frac{2x}{y^2}$   $f_x(2,1) = 4$   $f_y = -\frac{2x^2}{y^3}$   $f_y(2,1) = -8$   $f(2,1) = 4$

$$L(x,y) = 4 + 4(x-x_0) - 8(y-y_0) \approx f(x,y) \Rightarrow f(2,05, 0,95) \approx L(2,05, 0,95)$$

$$= 4 + 4(2,05-2) - 8(0,95-1)$$

$$= 4 + 4 \cdot (0,05) - 8 \cdot (-0,05) = 4,6$$

b)  $dz = f_x(x_0,y_0) dx + f_y(x_0,y_0) dy$

$f_x(2,1) = 4$   $f_y(2,1) = -8$

$x_0 = 2$   $y_0 = 1$   
 $x = 2,05$   $y = 0,95$

$dx \approx \frac{x-x_0}{\Delta x} = 2,05 - 2 = 0,05$

$dy \approx \Delta y = y - y_0 = 0,95 - 1 = -0,05$

$dz \approx \Delta z = f(2,05, 0,95) - f(2,1) = \frac{(2,05)^2}{(0,95)^2} - 4$

bulduklarımızı yerine koyalım:

$\frac{(2,05)^2}{(0,95)^2} - 4 \approx 4 \cdot (0,05) - 8 \cdot (-0,05) \Rightarrow \frac{(2,05)^2}{(0,95)^2} \approx 4 + 0,2 + 0,4 = 4,6$

\*  $f(x,y,z) = xe^{yz}$  fonksiyonunun.  $C: \begin{cases} x=t^2 \\ y=t+1 \\ z=2t \end{cases}$  eğrisinin

(4,3,4) noktasındaki teğet: boyunca (4,3,4) noktasındaki türevini hesaplayınız.

$$\nabla f = e^{yz} \vec{i} + xze^{yz} \vec{j} + xye^{yz} \vec{k} \quad \nabla f|_{(4,3,4)} = \langle e^{12}, 16e^{12}, 12e^{12} \rangle$$

C eğrisi:  $\vec{r}(t) = t^2 \vec{i} + (t+1) \vec{j} + 2t \vec{k}$

↓ Teğet:

$$\vec{r}'(t) = 2t \vec{i} + \vec{j} + 2 \vec{k}$$

(4,3,4) noktası için  $t=2$  olur.

$$\vec{r}'(2) = \langle 4, 1, 2 \rangle$$

$$|\vec{r}'(2)| = \sqrt{16+1+4} = \sqrt{21}$$

$$\vec{u} = \frac{\vec{r}'(2)}{|\vec{r}'(2)|} = \left\langle \frac{4}{\sqrt{21}}, \frac{1}{\sqrt{21}}, \frac{2}{\sqrt{21}} \right\rangle$$

$$(D_u f)|_{(4,3,4)} = \nabla f|_{(4,3,4)} \cdot \vec{u} = \langle e^{12}, 16e^{12}, 12e^{12} \rangle \cdot \left\langle \frac{4}{\sqrt{21}}, \frac{1}{\sqrt{21}}, \frac{2}{\sqrt{21}} \right\rangle = \frac{44}{\sqrt{21}} e^{12}$$

\*  $x^3+y^3+z^3-3xyz=4$  yüzeyinin (1,1,2) noktasındaki teğet düzlemi ve normal doğrusu?

$$F: x^3+y^3+z^3-3xyz-4=0$$

$$\nabla f = f_x \vec{i} + f_y \vec{j} + f_z \vec{k} = \langle 3x^2-3yz, 3y^2-3xz, 3z^2-3xy \rangle$$

$$\nabla f|_{(1,1,2)} = \langle -3, -3, 9 \rangle \rightarrow \text{Teğet düzleme normal}$$

$$\frac{-3}{a} \frac{-3}{b} \frac{9}{c} \rightarrow \text{Normal doğruya paralel}$$

$$(1,1,2) \text{ } x=y=z=0$$

Teğet Düzlem

$$-3(x-1)-3(y-1)+9(z-2)=0$$

Normal Doğru

$$x=1-3t$$

$$y=1-3t$$

$$z=2+3t$$

\* Eğer  $f$  ve  $g$  iki kez türevlenebilir tek değişkenli fonksiyonlar ise  $w = f(x-ct) + g(x+ct)$  için  $\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$  olduğunu gösterin.

$$\frac{\partial w}{\partial t} = -c f'(x-ct) + c g'(x+ct) \Rightarrow \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 f''(x-ct) + c^2 g''(x+ct)$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = f'(x-ct) + g'(x+ct) \Rightarrow \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = f''(x-ct) + g''(x+ct) \quad \downarrow \quad \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$$

\*  $z = x^2 - 4xy - 2y^2 + 12x - 12y - 1$  yüzeyine teğet olan yatay düzlem hangisidir? Teğet noktasını bulunuz.

Bir düzlem eğer denklemi  $z = k$  formunda ise yataydır. Bu ise denklemin  $x$  ve  $y$  den bağımsız olduğunu yani

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y} = 0 \text{ olduğunu gösterin.}$$

$$F: z - x^2 + 4xy + 2y^2 - 12x + 12y + 1 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} F_x = -2x + 4y - 12 = 0 \\ F_y = 4x + 4y + 12 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} x = -4 \\ y = 1 \end{array} \Rightarrow z = -31 \text{ bulunur.}$$

Aranan düzlem  $z = -31$ , nokta ise  $(-4, 1, -31)$  noktasıdır.

\*  $f(x, y) = \sqrt{2x^2 + e^{2y}}$  fonksiyonu verilsin.  $f(2.2, -0.2)$  için yaklaşık bir değer bulunuz.

$(2, 0)$  noktasında lineerleştirme yapalım.  $x_0 = 2$   $y_0 = 0$

$$f(2, 0) = 3$$

$$F_x = \frac{4x}{2\sqrt{2x^2 + e^{2y}}}$$

$$F_x(2, 0) = \frac{4}{3}$$

$$F_y = \frac{e^{2y}}{2\sqrt{2x^2 + e^{2y}}}$$

$$F_y(2, 0) = \frac{1}{3}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} L(x, y) = 3 + \frac{4}{3}(x-2) + \frac{1}{3}(y-0) \\ f(x, y) \approx L(x, y) \Rightarrow f(2.2, -0.2) \approx L(2.2, -0.2) \\ L(2.2, -0.2) = 3 + \frac{4}{3} \cdot (2.2-2) + \frac{1}{3} \cdot (-0.2) \\ = 3.2 \end{array} \right.$$



\*  $z = \arctan(x^2 - xy)$  yüzeyinin  $(0, -1)$  deki teğet düzlemini bulunuz.

$$x=0, y=-1 \Rightarrow z = \arctan 0 = 0 \Rightarrow \text{Nokta } (0, -1, 0)$$

$\nabla f|_{(0, -1, 0)} \rightarrow$  Teğet düzleme dik vektör ( $F: \arctan(x^2 - xy) - z = 0$ )

$$f_x|_{(0, -1, 0)} = \frac{2x - y}{1 + (x^2 - xy)^2} \Big|_{(0, -1, 0)} = \frac{1}{1} = 1$$

$$f_y|_{(0, -1, 0)} = \frac{-x}{1 + (x^2 - xy)^2} \Big|_{(0, -1, 0)} = 0 \quad f_z|_{(0, -1, 0)} = -1$$

$$\nabla f|_{(0, -1, 0)} = \vec{i} - \vec{k}$$

$$\text{Teğet Düzlem: } 1(x-0) + 0(y+1) - 1(z-0) = 0 \Rightarrow \boxed{x = z}$$

\*  $z = \sin(x+y^2)$  nin  $(\pi, 0)$  deki teğet düzlemi? Normal doğrusu?

$$x=\pi, y=0 \Rightarrow z=0 \Rightarrow \text{Nokta: } (\pi, 0, 0)$$

$F: \sin(x+y^2) - z = 0 \Rightarrow \nabla f|_{(\pi, 0, 0)} \rightarrow$  Düzlemin normali

$$\nabla f|_{(\pi, 0, 0)} = \cos(x+y^2) \Big|_{(\pi, 0, 0)} \vec{i} + 2y \cdot \cos(x+y^2) \Big|_{(\pi, 0, 0)} \vec{j} - \vec{k} = -\vec{i} - \vec{k}$$

$$\text{T. Düzlem: } -1 \cdot (x - \pi) + 0 \cdot (y - 0) - 1 \cdot (z - 0) = 0$$

$$-x + \pi - z = 0 \Rightarrow \boxed{x + z = \pi}$$

$\nabla f|_{(\pi, 0, 0)} \rightarrow$  Doğruya paralel vektör

$$\text{N. Doğru: } \begin{cases} x = \pi - t \\ y = 0 + 0t = 0 \\ z = 0 - t = -t \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} x = \pi - t, y = 0, z = -t \end{array} \right\}$$

\*  $f(x,y) = x + y \sin x$  ( $0 \leq x \leq \pi$ ) fonksiyonunun ekstremumlarını inceleyin.

$$f_x = 1 + y \cos x = 0 \quad (1)$$

$$f_y = \sin x = 0 \quad (2) \rightarrow \begin{array}{cc} x=0 & x=\pi \\ \downarrow (1) & \downarrow (1) \\ \boxed{y=-1} & \boxed{y=1} \\ \downarrow & \downarrow \\ (0,-1) & (\pi,1) \rightarrow \text{Kritik noktalar} \end{array}$$

$$A = f_{xx} = -y \sin x \quad B = f_{xy} = \cos x \quad C = f_{yy} = 0$$

	$A = -y \sin x$	$B = \cos x$	$C = 0$	$B^2 - AC$
$(0,-1)$	0	1	0	$1^2 - 0 = 1 > 0 \rightarrow (0,-1)$ Eyer N.
$(\pi,1)$	0	-1	0	$(-1)^2 - 0 = 1 > 0 \rightarrow (\pi,1)$ Eyer N.

\*  $x = u^2 + v^2$ ,  $y = u \cdot v$  ise  $(u,v) = (\sqrt{2},1)$  noktasında

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x = ?$$

$$\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)_x = \begin{cases} x,y \rightarrow \text{bağımsız değişken} \\ u,v \rightarrow \text{bağımlı değişken} \end{cases}$$

$$x = u^2 + v^2 \quad \begin{array}{l} \text{y'ye göre} \\ \text{türev} \end{array}$$

$$0 = 2u \cdot u_y + 2v \cdot v_y$$

$$\left. \begin{array}{l} u = \sqrt{2} \\ v = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow$$

$$0 = 2\sqrt{2} u_y + 2v_y$$

$$y = uv \quad \begin{array}{l} \text{y'ye göre} \\ \text{türev} \end{array}$$

$$1 = v \cdot u_y + u \cdot v_y$$

$$v = 1$$

$$1 = u_y + \sqrt{2} v_y$$

$$-\sqrt{2}/2\sqrt{2} u_y + 2v_y = 0$$

$$+ \frac{2}{2} u_y + \sqrt{2} v_y = 1$$

$$-2v_y = 2 \rightarrow u_y = \frac{\partial u}{\partial y} = -1$$



Ⓐ  $x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0$  yüzeyi ile  $x^2 + y^2 + z^2 = 11$  yüzeyinin kesişiminden oluşan eğriye  $P(1,1,3)$  noktasında teğet olan doğrunun parametrik denklemi?

Teğet doğru  $P$ 'de hem 1. yüzeyin hem de 2. yüzeyin gradyanına diktir.

$$F: x^3 + 3x^2y^2 + y^3 + 4xy - z^2 = 0 \Rightarrow \nabla F = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}$$

$$F_x = 3x^2 + 6xy^2 + 4y \quad F_x|_P = 13$$

$$F_y = 6x^2y + 3y^2 + 4x \quad F_y|_P = 13$$

$$F_z = -2z$$

$$F_z|_P = -6$$

$$\nabla F|_P = \langle 13, 13, -6 \rangle$$

$$G: x^2 + y^2 + z^2 - 11 = 0$$

$$\nabla G = G_x \vec{i} + G_y \vec{j} + G_z \vec{k}$$

$$G_x = 2x \quad G_y = 2y \quad G_z = 2z$$

$$G_x|_P = 2 \quad G_y|_P = 2 \quad G_z|_P = 6$$

$$\nabla G|_P = \langle 2, 2, 6 \rangle$$

$$\vec{v} = \nabla G|_P \times \nabla F|_P = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 6 \\ 13 & 13 & -6 \end{vmatrix} = 90\vec{i} - 90\vec{j} = \langle 90, -90, 0 \rangle \rightarrow \text{Doğrunun yön vektörü}$$

$$\begin{matrix} x_0 & y_0 & z_0 \\ P(1, 1, 3) \end{matrix}$$

$$x = x_0 + at = 1 + 90t$$

$$y = y_0 + bt = 1 - 90t$$

$$z = z_0 + ct = 3$$

$$\begin{cases} x = 1 + 90t \\ y = 1 - 90t \\ z = 3 \end{cases} \text{ teğet doğru}$$



Adı Soyadı	Öğrenci No	Grup No	1.S	2.S	3.S	4.S	TOPLAM
Bölümü							
Dersin Adı	MAT1072 MATEMATİK 2		Süre	100dk	Derslik		
Öğretim Üyesinin Adı Soyadı			İmza				

YÖK nun 2547 sayılı Kanunun Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 9. Maddesi olan "Sınavlarda kopya yapmak ve yaptırmak veya buna teşebbüs etmek" fiili işleyenler bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası alırlar.

1-a)  $\{a_n\} = \left\{ \left( \frac{n+1}{n+2} \right)^n \right\}$  dizisinin limitini bulunuz.  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  serisinin karakterini belirleyiniz. (12 Puan)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n+1}{n+2} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 - \frac{1}{n+2} \right)^{n+2} \right]^{\frac{n}{n+2}} = e^{-1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = e^{-1} \neq 0 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ serisi} \text{ } \rightarrow \text{ } \text{ıraksak bir seridir.}$$

1-b)  $f$  fonksiyonu, tek değişkenli ve türevlenebilir bir fonksiyon olmak üzere,  $z = x f\left(\frac{y}{x}\right)$  yüzeyi üzerinde herhangi bir  $P_0(x_0, y_0, z_0)$  noktasında, yüzeye teğet olan düzlemin orijinden geçtiğini gösteriniz. (13 Puan)

$$F = x f\left(\frac{y}{x}\right) - z$$

$$F_x = 1 \cdot f\left(\frac{y}{x}\right) + \left(-\frac{y}{x^2}\right) \cdot f'\left(\frac{y}{x}\right) \cdot x, \quad F_x(P_0) = f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \left(\frac{y_0}{x_0}\right) f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)$$

$$F_y = x \cdot \frac{1}{x} f'\left(\frac{y}{x}\right), \quad F_y(P_0) = f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right)$$

$$F_z = -1$$

Teğet Düzlem

$$\left( f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \left(\frac{y_0}{x_0}\right) f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) \right) (x - x_0) + f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) (y - y_0) - (z - x_0 f\left(\frac{y_0}{x_0}\right)) = 0$$

(0,0,0) da sağlamalıdır.

$$-\left( f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) - \left(\frac{y_0}{x_0}\right) f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) \right) x_0 + f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) (-y_0) + (-x_0 f\left(\frac{y_0}{x_0}\right)) = 0$$

$$-f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) \cdot x_0 + \left(\frac{y_0}{x_0}\right) f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) x_0 - f'\left(\frac{y_0}{x_0}\right) y_0 + x_0 f\left(\frac{y_0}{x_0}\right) = 0 //$$

3- a)  $\sin[\pi(0.01)(1.05) + \ln(1.05)]$  nin yaklaşık değerini toplam diferansiyel veya lineer yaklaşım kullanarak hesaplayınız. (12 Puan)

$$f(x,y) = \sin(\pi xy + \ln y) \quad f(0,1) = 0 \quad h = \Delta x = 0.01$$

$$k = \Delta y = 0.05$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \pi y \cos(\pi xy + \ln y), \quad \frac{\partial f(0,1)}{\partial x} = \pi$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \left(\pi x + \frac{1}{y}\right) \cos(\pi xy + \ln y) \quad \frac{\partial f(0,1)}{\partial y} = 1$$

$$f(0.01; 1.05) \approx 0 + 0.01 \cdot \pi + 0.05 \cdot 1 \approx 0.081416$$

3-b)  $f(x,y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{8}{y}$  fonksiyonunun kritik noktalarını bulunuz ve sınıflandırınız. (13 Puan)

bulunuz. (13 Puan)

$$\left. \begin{aligned} f_x = y - \frac{1}{x^2} = 0 &\Rightarrow y = \frac{1}{x^2} \\ f_y = x - \frac{8}{y^2} = 0 &\Rightarrow x = \frac{8}{y^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow x = \frac{8}{(\frac{1}{x^2})^2} \Rightarrow x - 8x^4 = 0$$

$$x = 0 \quad x = \frac{1}{2}$$

Kritik N.

$$x = 0 \notin D_f$$

$P(1/2, 4)$  için

$$f_{xx} = \frac{2}{x^3} \quad f_{yy} = \frac{16}{y^3} \quad f_{xy} = 1$$

$$f_{xx} \cdot f_{yy} - f_{xy}^2 = \frac{1}{(\frac{1}{2})^3} \cdot \frac{16}{4^3} - 1 = 3 > 0$$

$$f_{xx} = 16 > 0$$

$\Rightarrow P(1/2, 4)$  lokal min noktadır.



2b)  $f$  in tanım kümesi  $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \geq 0\}$

2017 - final

$x=0$  iken  $f_x$  tanımsız old. dan,  $\forall b \in \mathbb{R}$  için  $(0,b)$  şeklindeki noktalar Kritik noktalar

S. 2-a) Bir  $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  fonksiyonu, parçalı olarak,  
 3m kritik noktalarda  $f(x,y)=0$   
 ve  $\forall (x,y) \in D$  için  $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(\sqrt{x^2+y^2})}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ \frac{1}{2}, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$   
 $f(x,y) \geq 0$  old. dan, lim kritik noktalar  
 min. noktasıdır ve min değeri 0'dır.  
 ile veriliyor.  $f$  nin  $\mathbb{R}^2$  üzerinde sürekli olup-olmadığını araştırınız. (13 P)

$f_x = f_y = 0 \Leftrightarrow y=0$ .  
 0 halde  $\forall a > 0$  için  $(a,0)$  şeklindeki noktalar kritik noktalar

$$(x,y) \neq (0,0) \text{ için } f(x,y) = \frac{1 - \cos \sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2} \text{ olup}$$

$f$ ,  $\mathbb{R}^2 - \{(0,0)\}$  da sürekli dir.  $(x,y) = (0,0)$  da

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = f(0,0)$  ise  $f$ ,  $\mathbb{R}^2$  de sürekli olur.

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos \sqrt{x^2+y^2}}{x^2+y^2}$$

$$\begin{cases} u = x^2+y^2 \\ (x,y) \rightarrow (0,0) \text{ iken } u \rightarrow 0^+ \\ u \rightarrow 0^+ \text{ iken } x^2+y^2 \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos u}{u^2}$$

$$\stackrel{L}{=} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{\sin u}{2u} = \frac{1}{2} = f(0,0) \text{ old. dan } f, \mathbb{R}^2 \text{ de sürekli dir.}$$

S. 2-b)  $f(x,y) = y^2 \cdot \sqrt{x}$  ile tanımlı  $f$  fonksiyonunun bütün kritik noktalarını ve varsa ekstremum (maksimum-minimum) değer(ler)ini bulunuz. (12 P)

$$\left. \begin{array}{l} f_x = \frac{y^2}{2\sqrt{x}} \\ f_y = 2y\sqrt{x} \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} f_x = 0 \Rightarrow \forall x > 0 \text{ için } y=0 \\ f_y = 0 \Rightarrow x=0 \text{ veya } y=0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} (0,b) \text{ için} \\ f_x \text{ tanımsız old. dan} \\ (0,b) \text{ Kritik nokta} \end{array} \right.$$

$a \geq 0$  olmak üzere  $(a,0)$  Kritik noktalar

$\forall x \geq 0$  ve  $y$  için

$$f(x,y) - f(a,0) = y^2 \sqrt{x} \geq 0 \Rightarrow f(a,0) = 0 \text{ bir yerel minimumdur.}$$

$$\rightarrow f(x,y) - f(0,b) = y^2 \sqrt{x} \geq 0 \Rightarrow f(0,b) = 0 \text{ yerel minimum}$$