Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Březí	**Klejnárka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6531	Kutnohorské krystalinikum

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboce zaříznuté údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v moldanubické oblasti v regionu metamorfních jednotek. Převládajícím horninovým typem jsou pararuly. Severozápadní cíp zátopové oblasti spadá do oblasti kutnohorsko-svrateckého krystalinika, které je zde zastoupeno dvojslídnými svory. Kvartérní pokryv tvoří písčito-hlinité deluviální sedimenty o mocnosti 0,5 až 5 m, kvartérní sedimenty přecházejí do eluvia podložních metamorfovaných hornin. Většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	1199	amfibolit
7	deluviofluviální smíšený sediment	1205	dvojslídný svor
12	deluviální písčito-hlinitý sediment	1342	pararula

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území nejsou dokumentovány tektonické poruchy, s výjimkou severozápadního cípu oblasti zátopy, kde probíhá tektonická porucha směru SV-JZ oddělující kutnohorsko-svrateckou oblast od moldanubika, porucha má charakter přesmyku.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Horniny krystalinika lze považovat za málo propustné. Lepší propustnost má zvětralinový plášť a zóna přípovrchového rozpojení puklin, kde se nachází dominantní mělká zvodeň. Výskyt hlubších zvodní je vázaný na případné tektonické porušené zóny. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 5,8 x 10^{-6} až 6,3 x 10^{-5} m^2/s. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost a živější mělký oběh podzemní vody. Lokální směr proudění podzemní vody je k severu až severozápadu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V okolních obcích (Březí) ve vzdálenosti 230 až 260 m od předpokládaného břehu nádrže se nachází hydrogeologické vrty, které jsou pravděpodobně využívané jako domovní studny.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidovány staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

V jihovýchodní části nádrže (Nad Skarýdkem) je evidované staré poddolované území – pozůstatky historické těžby (16. století) polymetalických rud. Ve vzdálenosti 1000 až 1500 m východně od nádrže jsou ochranná pásma 5 studní JZD Zbýšov.

Shrnutí

Klejnárka má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody. Vzhledem k tomu, že bude zatopená celá plocha sedimentů údolní nivy, bude tento efekt navýšení zásob praktický zanedbatelný. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu. Hladina ve studnách JZD Zbýšov pravděpodobně nebude ovlivněná (navýšená), přesto lze tyto objekty použit pro sledování hladiny v případě výstavby přehrady.