Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Rajnochovice (Košovy)	**Juhyně**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
3221	Flyš v povodí Bečvy

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboké údolí rozšířené v místě přítoků – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v Karpatské soustavě v oblasti Flyšového pásma. Převládajícím horninovým typem jsou zpevněné mořské sedimenty – jílovce a pískovce až slepence Račanské jednotky. V severní části lokality se vyskytuje relikt terasových štěrkopísků (pleistocén). Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti až 5 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků, celková mocnost fluviálních a diluviálních sedimentů dosahuje až 9 m.



6	nivní sediment, fluviální	1905	pískovec, jílovec, belovežské souvrství
7	deluviofluviální smíšený sediment	1908	pískovec, jílovec, hostýnské vrstvy
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	1912	pískovec, jílovec, ráztocké vrstvy
38	nevytříděné štěrky	1914	pískovec, jílovec, kaumbergské souvrství
1902	pískovec, jílovec, slepenec	1915	pískovec, jílovec, tesácké vrstvy

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Údolí vodních toků je zčásti tektonicky predisponované. V severní části lokality se kříží tektonické poruchy směru S-J a JZ-SV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 3221 Flyš v povodí Bečvy. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází větší počet izolátorů a průlino-puklinových kolektorů s volnou hladinou podzemní vody a s proměnlivou transmisivitou v řádu T = 1 x 10^{-5} m^2/s. Chemický typ vody je Ca-Na-HCO_3. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Význam výskytu terasových štěrků, vzhledem k jejich rozloze, má lokální charakter. Směr proudění podzemní vody je k místní erozní bázi Juhyni.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry podzemních vod přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Nejbližší zdroje vody jsou v obci Rajnochovice.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V okolí lokality nejsou v SEKM evidovány staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území leží v přírodní rezervaci a ptačí oblasti Hostýnské vrchy. Na lokalitě a v jejím okolí jsou zmapovány dočasně uklidněné svahové deformace přírodního původu. Severovýchodně od lokality, ve vzdálenosti cca 700 m se rozkládá ochranné pásmo vodního zdroje Rajnochovice vrt RA-2; případnou výstavbou vodní nádrže nedojde j jeho ovlivnění. Lokalita se nachází v území s nízkým radonovým indexem.

Shrnutí

Juhyně má drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu, v místě, kde bude oblast zátopy zasahovat do reliktů říčních teras, může dojít k navýšení zásob podzemní vody infiltrací povrchové vody.