Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Poutnov	**Teplá**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6221	Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem

Morfologie, šířka údolní nivy

Středně hluboké údolí se zúžením v místě hráze – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v oblasti mariánsko-lázeňského bazického komplexu. Převládajícím horninovým typem, na lokalitě, jsou amfibolity vzniklé metamorfózou bazických hornin. V menší míře se zde vyskytují ruly a žíly vulkanických hornin náležejících ke Krušnohorskému plutonu. Kvartérní pokryv tvoří tenká vrstva deluviálních sedimentů (do 1 m) a v okolí vodních toků fluviálních a deluviofluviálních sedimentů o mocnosti do 7 m.



6	nivní sediment	1373	eklogit
12	písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment	1376	gabroamfibolit
796, 797	ruly	1594	žilný křemen
1366, 1367	amfibolit	1602	dioritový porfyrit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Údolí říčky Teplé je zřejmě predisponováno tektonickou poruchou. Hlavní směry tektonických poruch probíhají SZ-JV až S-J. Napříč lokalitou, jižně od obce Poutnov probíhá zlom ve směru Z-V.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 6221 Krystalinikum v mezipovodí Mže pod Stříbrem. Z hydrogeologického hlediska je horninové prostředí charakterizováno jediným nevymezeným, puklinově propustným, kolektorem podzemní vody v připovrchové zóně rozpojení skalních hornin. Hladina podzemní vody je volná, transmisivita nízká T = 9,9 x 10^{-6} až 2,0 x 10^{-4} m^2/s a chemický typ Ca-Na-HCO_3. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr odtoku podzemní vody je k erozní bázi tvořené údolím říčky Teplé.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. V obcích v okolí lokality se jistě nacházejí historické zdroje vody v podobě mělkých studní; tyto zdroje případné vybudování nádrže neovlivní.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V blízkém okolí případné vodní nádrže se nacházejí staré ekologické zátěže, evidované v databázi SEKM. Jedná se o staré skládky TKO Nová Farma a výše proti toku Teplé skládka TKO Teplá. Déle bývalý sklad pesticidů Nová Farma na jižním okraji případné zátopy a kontaminovaný areál Statek Poutnov (mimo dosah případné zátopy).

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
Lokalita je součástí ochranného pásma přírodního léčivého zdroje II B Mariánské Lázně, na jeho východní straně. Lokalita se nachází v CHKO Slavkovský les a v severní části je vyhlášená přírodní rezervace Údolí Teplé. Lokalita leží v oblasti se středním, na okrajích s nízkým radonovým indexem. Do říčky Teplá jsou vypouštěny přečištěné odpadní vody z obecních ČOV v obci Teplá a Nová Farma. V prostoru případné hráze vodní nádrže se nachází stavby pro odvodnění zemědělských půd.

Shrnutí
Teplá má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody (vzhledem k charakteru horninového prostředí jen minimálně). V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.