Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Javornice	**Javornice**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6230	Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky

Morfologie, šířka údolní nivy

Středně hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v středočeské oblasti v regionu Barrandienu. Převládajícím horninovým typem, na lokalitě jsou droby (místy hrubozrnné), prachovce a břidlice kralupsko-zbraslavské skupiny. V širším okolí se vyskytují žíly granitového porfyru a tělesa silicitů. Na paleoreliéfu proterozoických horniny se vyskytují relikty fluviálních a fluviolakustrinních štěrků, písků a jílů sladkovodního terciéru. Kvartérní pokryv tvoří spraše, sprašové hlíny a deluviální sedimenty a v okolí vodních toků fluviální a deluviofluviální sedimenty o mocnosti do 7 m.



6	nivní sediment	745	fylit
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	746	zelené břidlice
16	písky, štěrky	751	metagabro
132	jíly, písky a štěrky	2293	žilné magmatity náležící regionální jednotce lounského plutonu

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Tektonické poruchy nejsou v prostoru případné zátopy dokumentovány. V širším okolí jsou předpokládané linie zlomů ve směru SZ-JV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 6230 Krystalinikum, proterozoikum a paleozoikum v povodí Berounky. Z hydrogeologického hlediska je horninové prostředí charakterizováno jediným nevymezeným, puklinově propustným, kolektorem podzemní vody v připovrchové zóně rozpojení skalních hornin. Hladina podzemní vody je volná, transmisivita nízká T = 1,9 x 10^{-5} až 2,2 x 10^{-4} m^2/s a chemický typ Ca-Na-HCO_3. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Lokální směr odtoku podzemní vody je k erozní bázi tvořené Javornicí.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V dosahu případné vodní nádrže se nenacházejí staré ekologické zátěže, evidované v databázi SEKM. V širším okolí jsou evidovány staré skládky TKO v blízkosti obcí Březany, Hedčany a Kožlany u nich není pravděpodobní, že by měly vliv na případnou výstavbu vodní nádrže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

V okolí lokality nejsou vymezena ochranná pásma vodních zdrojů. Lokalita leží na okraji velkoplošného zvláště chráněného území Křivoklátsko. V části lokality u obce Hedčany by do prostoru zátopy zasahovaly meliorační stavby. Do Javornice jsou prostřednictvím bezejmenného přítoku vypouštěny přečištěné odpadní vody z městské ČOV Kožlany v množství cca 160 000 m^3/rok. Lokalita leží v oblasti s nízkým radonovým indexem.

Shrnutí

Javornice má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody. Případné vybudování vodní nádrže způsobí jen lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody (vzhledem k charakteru horninového prostředí jen minimálně).