Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Kladruby	**Úhlavka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6212	Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

Morfologie, šířka údolní nivy

Středně hluboké údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v moldanubické oblasti. Převládajícím horninovým typem, na lokalitě, jsou hlubinné magmatity moldanubického plutonu. Vyskytují se zde melanokratní granit až granodiorit. Kvartérní pokryv tvoří tenká vrstva (do 1 m) fluviálních a deluviofluviálních sedimentů, v okolí vodního toku o mocnosti do 5 m. V místě uvažované hráze zasahuje oblast zátopy do krystalinika, tvořeného kontaktními břidlicemi, fylity a metadrobami.



6	nivní sediment	1075	boititický fylit
12	písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment	1275	břidlice
770, 778	grafitický fylit, fylit	1546, 1548	granit
782	metadroba	1566	melanokratní granit až granodiorit

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Těleso moldanubického plutonu je postiženo tektonickými poruchami směru S-J. Na okrajích na kontaktu s krystalinikem se přidávají zlomy Z-V až SZ-JV směru. Tektonicky více postižená oblast je v okolí uvažované hráze.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 6212 Krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov. Z hydrogeologického hlediska je horninové prostředí charakterizováno jediným nevymezeným, puklinově propustným, kolektorem podzemní vody v připovrchové zóně rozpojení skalních hornin. Hladina podzemní vody je volná, transmisivita nízká T = 1 x 10^{-6} až 1 x 10^{-5} m^2/s a chemický typ Ca-Na-HCO_3. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr odtoku podzemní vody je k severovýchodu až severu – k erozní bázi tvořené tokem Úhlavky.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc. Zdroje podzemní vody v blízkém okolí lokality jsou evidovány v obcích Tuněchody (3100 m^3/rok), Milevo (4000 m^3/rok), Brod u Stříbra (4320 m^3/rok) a v kamenolomu u ČR Kladruby u Stříbra (5880 m^3/rok). V obcích v okolí lokality se jistě nacházejí historické zdroje vody v podobě mělkých studní; tyto zdroje případné vybudování nádrže neovlivní. Vybudováním vodní nádrže nedojde k měřitelnému ovlivnění zdrojů podzemní vody (kamenolom ČR Kladruby u Stříbra zanikne, včetně zdroje vody).

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V povodí Úhlavky se kromě skládky TKO u obce Tuněchody nenacházejí jiné staré ekologické zátěže, evidované v databázi SEKM.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území
Severně od obce Brod u Stříbra je vymezeno ochranné pásmo vodního zdroje pro studny S1 a S2. Lokalita se nachází v povodí vodárenské nádrže Hracholusky. V místě hráze a u obce Milevo jsou stanovena výhradní ložiska (kámen). Lokality leží v oblasti se středním radonovým indexem, nacházejí se zde také stará důlní díla (šurfy) pro průzkum radioaktivních surovin (Zhoř u Stříbra-Milevo).

Shrnutí
Úhlavka má v současnosti převážně drenážní účinek na podzemní vody mělkého oběhu. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. V místech kde se nachází kolektor s volnou hladinou a nesaturovanou zónou nad hladinou podzemní vody, bude ve výsledku lokálně navýšena zásoba podzemní vody (vzhledem k charakteru horninového prostředí jen minimálně). V blízkosti hráze bude docházet k infiltraci povrchové vody a podzemnímu odtoku směrem pod přehradu.