Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Javorník	**Hrubý potok**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
3222	Flyš v povodí Moravy

Morfologie, šířka údolní nivy

Středně hluboké údolí rozšířené v místě přítoků – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v Karpatské soustavě v oblasti Flyšového pásma. Převládajícím horninovým typem jsou zpevněné mořské sedimenty – jílovce a pískovce z období Křídy až Paleogénu. Kvartérní pokryv tvoří písčito-hlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty o mocnosti až 2 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků, celková mocnost fluviálních a diluviálních sedimentů dosahuje až 7 m.



6	nivní sediment, fluviální	13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment
7	deluviofluviální smíšený sediment	1932	pískovec, jílovec, svodnické souvrství
12	písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment	1933	pískovec, svodnické souvrství

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V zájmovém území nejsou tektonické lokality dokumentovány. Tektonické poruchy v širším okolí lokality mají charakter příkrovů, linie JZ-SV a zlomů ve směru SZ-JV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 3222 Flyš v povodí Moravy – severní část. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází větší počet izolátorů a průlino-puklinových kolektorů s volnou hladinou podzemní vody a s proměnlivou transmisivitou v řádu T = 1 x 10^{-5} m^2/s. Chemický typ vody je Ca-Na-HCO_3. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody mělkého oběhu je k místní erozní bázi Hrubému potoku.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry podzemních vod přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V okolí lokality nejsou v SEKM evidovány staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Svahy údolí nad Hrubým potokem jsou náchylné k sesuvům, téměř v celém zájmovém území jsou zmapovány dočasně uklidněné svahové deformace přírodního původu. Zaplavením údolí po případné výstavbě vodní nádrže by tyto sesuvy mohly být aktivovány. Lokalita se nachází v území s nízkým radonovým indexem.

Shrnutí

Hrubý potok má drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrží a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Vzhledem k charakteru horninového prostředí bude mít případná výstavba vodní nádrže vliv jen na mělký oběh podzemní vody.