Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody


Název lokality	*Vodní tok*
Záhorovice	**Kladenka**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
3222	Flyš v povodí Moravy

Morfologie, šířka údolní nivy

Středně hluboké údolí rozšířené v místě přítoků – přehrada zcela zaplaví sedimenty nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita leží v Karpatské soustavě v oblasti Flyšového pásma. Převládajícím horninovým typem jsou zpevněné mořské sedimenty – jílovce a pískovce a slínovce Bystrické (J) a Račanské jednotky (S). Na jihozápadním okraji lokality vystupují křídové pískovce a jílovce. Kvartérní pokryv tvoří písčito-hlinité až hlinito-písčité deluviální sedimenty o mocnosti kolem 2 m, většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků, celková mocnost fluviálních a diluviálních sedimentů dosahuje až 8 m.



6	nivní sediment, fluviální	1905	pískovec, jílovec, belovežské souvrství, račanská jednotka
7	deluviofluviální smíšený sediment	1921	pískovec, jílovec, slínovec, bystrické vrstvy, bystrická jednotka
12	písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment	1938	pískovec, jílovec, kaumberské souvrství, křída
1898	pískovec, jílovec, račanská jednotka		

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

Tektonické poruchy mají charakter příkrovů, linie Z-V a zlomů ve směru SSZ-JJV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu základní vrstvy 3222 Flyš v povodí Moravy – severní část. Dle základní hydrogeologické mapy tvoří horniny na lokalitě regionální izolátor a kolektor je pouze v připovrchové zóně. Mělký kolektor má průlino-puklinovou propustnost, volnou hladinou podzemní vody a nízkou transmisivitou v řádu T = 8,5 x 10^{-6} až 8,5 x 10^{-5} m^2/s. Chemický typ vody je Ca-Na-HCO_3. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Směr proudění podzemní vody je k jihu k místní erozní bázi Olšavě. Podzemní vody na lokalitě vyžadují složitější úpravu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované odběry podzemních vod přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěží

V okolí lokality nejsou v SEKM evidovány staré ekologické zátěže.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Zájmové území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a do střední části lokality zasahuje evropsky významná lokalita Rudický les. Na lokalitě a v jejím okolí jsou zmapovány dočasně uklidněné svahové deformace přírodního původu a v místě případné hráze aktivní svahové deformace přírodního původu. Jižní část lokality zasahuje do ochranného pásma přírodních léčivých zdrojů II C Luhačovice. Lokalita se nachází v území s nízkým radonovým indexem. Na lokalitě, zejména v její jižní a východní části, se rozkládají areály odvodnění. Lokalita je součástí území prognózního zdroje zemního plynu Bojkovice.

Shrnutí

Kladenka má drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Vzhledem k charakteru horninového prostředí bude mít případná výstavba vodní nádrže vliv jen na mělký oběh podzemní vody.