



Razones y Proporciones

Matemáticas

Carlos Rojas Sánchez

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Universidad del Mar

1. Introducción
2. Razones
3. Proporciones
4. Proporcionalidad Inversa
5. Razones en Medicina Veterinaria Zootecnista
6. Ejercicios
7. Soluciones
8. Regla de tres simple y compuesta
9. Regla de Tres Compuesta
10. Cálculo de Porcentajes

Introducción

Las **razones** y **proporciones** son conceptos fundamentales en matemáticas. Se utilizan para comparar cantidades y resolver problemas en diversas áreas de las ciencias exactas, como álgebra, geometría, economía, etc.

Razones

¿Qué es una razón?

Una **razón** es una comparación entre dos cantidades, que se expresa como una fracción. Se representa generalmente como:

$$\text{Razón} = \frac{a}{b}$$

Donde a y b son las cantidades que estamos comparando.

- Si $a = 10$ y $b = 5$, la razón es $\frac{10}{5} = 2$.
- Esto significa que por cada 1 unidad de b , hay 2 unidades de a .

Definición de Razón

Si a y b son cantidades ($b \neq 0$):

$$\text{Razón} = \frac{a}{b} \quad \text{o} \quad a : b$$

Ejemplo: $- 8 : 2 = 4$ - $2 : 8 = \frac{1}{4}$

Nota: Una razón no tiene unidades si ambas cantidades son del mismo tipo.

Representaciones de una Razón

- Fracción: $\frac{a}{b}$
- Proporción: $a : b$
- Ecuación con variable: si $a : b = m : n$, entonces

$$a = mk, \quad b = nk, \quad k > 0$$

Razones compuestas

Si $a : b = m : n$ y $b : c = p : q$, entonces:

- Escribimos $a = mk, b = nk, b = pt, c = qt$
- Igualamos b : $nk = pt \Rightarrow t = \frac{nk}{p}$
- Sustituimos $c = qt \Rightarrow a : c = mk : \frac{nqk}{p}$

Ejemplo: $x : y = 4 : 7, y : z = 2 : 5$

$$x = 4k, y = 7k, y = 2m, z = 5m \Rightarrow 7k = 2m, z = 5\frac{7k}{2} = \frac{35}{2}k$$

$$x : z = 4k : \frac{35}{2}k = 8 : 35$$

Razones entre tres o más números

Si $a : b : c = m : n : p$ entonces:

$$a = mk, \quad b = nk, \quad c = pk$$

Ejemplo: $2 : 3 : 4$, suma = 81

$$2k + 3k + 4k = 9k = 81 \Rightarrow k = 9$$

Números: 18, 27, 36

Tipos de problemas típicos

1. Suma total: usar k , sumar y resolver.
2. Diferencia: plantear ecuación con k .
3. Razones encadenadas: igualar la variable común.
4. Tres o más números: usar misma variable k .
5. Cambios en razones: plantear proporción y resolver ecuación.

Estrategia general

1. Identifica la(s) razón(es) $\rightarrow$ variables (k)
2. Plantea ecuaciones usando suma, diferencia o nuevas razones
3. Resuelve para k
4. Sustituye y encuentra los números
5. Verifica que se cumple la razón original

Ejemplo completo

Si $x : y = 2 : 5$ y su suma es 70:

$$x = 2k, \quad y = 5k$$

$$2k + 5k = 7k = 70 \Rightarrow k = 10$$

$$x = 20, \quad y = 50$$

Verificación: $20 : 50 = 2 : 5$

Proporciones

¿Qué es una proporción?

Una **proporción** es una igualdad entre dos razones. Es decir, dos fracciones que son iguales:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

Por ejemplo, si tienes la proporción:

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

Esto significa que la relación entre a y b es igual a la relación entre c y d .

Propiedad fundamental de las proporciones

La **propiedad fundamental de las proporciones** establece que en una proporción:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$$

El producto cruzado es igual:

$$a \times d = b \times c$$

- Si sabemos que $\frac{3}{4} = \frac{6}{x}$, podemos resolver x usando la propiedad cruzada:

$$3 \times x = 4 \times 6 \quad \Rightarrow \quad x = \frac{24}{3} = 8$$

Aplicaciones de las razones y proporciones

Las razones y proporciones son herramientas poderosas en diversos campos, como:

- **Cálculos de escalas:** Mapas, planos, maquetas.
- **Problemas de porcentajes:** Descuentos, aumentos salariales.
- **Proporcionalidad en geometría:** Figuras semejantes.
- **Cálculos de densidad:** Relación masa/volumen.

Ejemplo 1: Escala en un mapa

Imagina que tienes un mapa donde 1 cm representa 50 km en la realidad. Si la distancia en el mapa es de 3 cm, ¿cuál es la distancia real?

- La proporción sería:

$$\frac{1}{50} = \frac{3}{x}$$

- Aplicando la propiedad cruzada:

$$1 \times x = 50 \times 3 \quad \Rightarrow \quad x = 150 \text{ km}$$

Así que la distancia real es **150 km**.

Ejemplo 2: Trabajo y tiempo

4 máquinas producen 200 piezas en 5 horas. ¿Cuántas piezas producirán 6 máquinas en el mismo tiempo?

$$\frac{4}{6} = \frac{200}{x} \Rightarrow 4x = 1200 \Rightarrow x = 300$$

Resultado: 6 máquinas producirán 300 piezas.

Ejemplo 3: Mezcla química

Una solución tiene 8 g de sal en 200 g de agua. ¿Cuánta sal se necesita para 750 g de la misma mezcla?

$$\frac{8}{200} = \frac{x}{750} \Rightarrow x = 30$$

Resultado: Se necesitan 30 g de sal.

Ejemplo 4: Velocidad y distancia

Un auto recorre 120 km en 3 horas. ¿Cuánto recorrerá en 7 horas?

$$\frac{120}{3} = \frac{x}{7} \Rightarrow x = 280$$

Resultado: Recorrerá 280 km.

Ejemplo 5: Proporción en economía

Si 5 artículos cuestan \$300, ¿cuánto costarán 8 artículos?

$$\frac{5}{300} = \frac{8}{x} \Rightarrow x = 480$$

Resultado: 8 artículos cuestan \$480.

Ejemplo 6: Proporción inversa

6 trabajadores terminan una obra en 15 días. ¿Cuántos días necesitarán 10 trabajadores?

$$6 \times 15 = 10 \times x \Rightarrow x = 9$$

Resultado: 10 trabajadores tardarán 9 días.

Ejemplo 7: Escala microscópica

Una célula de 0.005 mm aparece con 2 cm en la imagen. ¿Cuál es la escala?

$$\frac{20}{0.005} = 4000$$

Resultado: Escala de ampliación 4000:1.

Ejemplo 8: Proporción múltiple

3 lápices cuestan \$18 y 5 cuadernos \$50. ¿Cuánto costarán 6 lápices y 8 cuadernos?

$$x_1 = 36, \quad x_2 = 80, \quad x_{\text{total}} = 116$$

Resultado: Costo total = \$116.

Conclusión

Las razones y proporciones son herramientas esenciales para resolver problemas matemáticos y cotidianos. Nos permiten comparar cantidades de manera efectiva y encontrar relaciones en situaciones prácticas.

Proporcionalidad Inversa

Proporción Inversa: Concepto

En una **proporción inversa**, al aumentar una magnitud, la otra disminuye en la misma razón.

$$a \times b = c \times d$$

Ejemplo simple: Si 4 personas tardan 6 días en pintar una casa, entonces 8 personas (el doble) tardarán la mitad de tiempo.

$$4 \times 6 = 8 \times x \Rightarrow x = 3$$

Conclusión: En las proporciones inversas, el producto de las dos magnitudes es constante.

Cómo reconocer una proporción inversa

Para identificar si la proporción es inversa:

1. Si al aumentar una magnitud, la otra disminuye → **inversa**.
2. Si ambas aumentan o ambas disminuyen → **directa**.

Ecuación general:

$$a_1 \times b_1 = a_2 \times b_2$$

Pasos para resolver:

- Identifica las dos magnitudes.
- Multiplica las magnitudes conocidas.
- Despeja la incógnita: $x = \frac{a_1 \times b_1}{a_2}$

Ejemplo 1: Trabajadores y tiempo

6 trabajadores hacen una obra en 15 días. ¿Cuántos días necesitarán 10 trabajadores?

$$6 \times 15 = 10 \times x \Rightarrow x = 9$$

Resultado: 10 trabajadores terminarán en 9 días.

Ejemplo 2: Velocidad y tiempo

Un automóvil recorre cierta distancia en 5 horas a 60 km/h.
¿Cuánto tiempo tardará si viaja a 100 km/h?

$$60 \times 5 = 100 \times x \Rightarrow x = 3$$

Resultado: tardará 3 horas.

Ejemplo 3: Presión y volumen (Ley de Boyle)

A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión.

Si una cantidad de gas ocupa 8 L a 100 kPa, ¿qué volumen ocupará a 200 kPa?

$$100 \times 8 = 200 \times x \Rightarrow x = 4$$

Resultado: el gas ocupará 4 L.

Ejemplo 4: Caudal y tiempo

Una tubería llena un tanque en 12 minutos. Si se abren dos tuberías iguales, ¿en cuánto tiempo se llenará el tanque?

$$1 \times 12 = 2 \times x \Rightarrow x = 6$$

Resultado: se llenará en 6 minutos.

Ejemplo 5: Inversión y rendimiento

Un grupo de inversionistas obtiene \$10,000 de ganancia al invertir durante 8 meses. ¿Cuál sería la ganancia si solo invierten 4 meses, suponiendo rendimiento inverso al tiempo?

$$10,000 \times 8 = x \times 4 \Rightarrow x = 20,000$$

Resultado: para igual rendimiento, deberían ganar \$20,000 en 4 meses.

Ejemplo 6: Iluminación y distancia

La intensidad de la luz varía inversamente con el cuadrado de la distancia. Si a 2 m la intensidad es 90 lux, ¿cuál será a 3 m?

$$I_1 d_1^2 = I_2 d_2^2 \Rightarrow 90(2)^2 = I_2(3)^2 \Rightarrow I_2 = \frac{360}{9} = 40$$

Resultado: la intensidad será 40 lux.

Razones en Medicina Veterinaria Zootecnista

Las razones matemáticas tienen un papel importante en la toma de decisiones en el campo de la medicina veterinaria y la zootecnia. Desde el análisis de proporciones de nutrientes en la alimentación animal hasta la determinación de dosis en tratamientos, las razones se aplican frecuentemente en el ámbito profesional.

En la medicina veterinaria zootecnista, las razones se utilizan para calcular:

- Proporciones de nutrientes en dietas animales.
- Cálculos de dosis de medicamentos.
- Comparaciones de crecimiento de animales bajo diferentes condiciones.
- Proporciones de animales sanos vs. enfermos en un rebaño.
- Relaciones entre el tamaño de una población y su tasa de crecimiento.

Ejemplo 1: Proporción de Nutrientes en la Dieta

Si en la dieta de un ganado vacuno, la cantidad de proteína es de 25 kg y la cantidad de carbohidratos es de 100 kg, la razón de proteínas a carbohidratos es:

$$\text{Razón de proteínas a carbohidratos} = \frac{25}{100} = 0.25$$

Esto significa que por cada kilogramo de carbohidrato, hay 0.25 kg de proteína.

Ejemplo 2: Cálculo de Dosis de Medicamentos

Si un medicamento requiere una dosis de 10 mg por cada kilogramo de peso corporal de un animal y el animal pesa 4 kg, la dosis total sería:

$$\text{Dosis total} = 10 \times 4 = 40 \text{ mg}$$

Ejemplo 3: Comparación de Crecimiento de Animales

Si en dos grupos de cerdos uno crece a una tasa de 0.5 kg/día y el otro a 0.6 kg/día, la razón de crecimiento entre los dos grupos es:

$$\text{Razón de crecimiento} = \frac{0.5}{0.6} = 0.83$$

El segundo grupo crece un 17% más rápido que el primero.

Ejemplo 4: Relación entre Animales Sanos y Enfermos

En una granja, se tiene un total de 150 animales, de los cuales 120 están sanos y 30 están enfermos. La razón de animales sanos a enfermos es:

$$\text{Razón de sanos a enfermos} = \frac{120}{30} = 4$$

Esto significa que por cada animal enfermo, hay 4 animales sanos.

Ejemplo 5: Proporción de Leche en la Alimentación de Terneros

Si un ternero recibe 5 litros de leche al día y consume 15 kg de forraje, la razón de leche a forraje es:

$$\text{Razón de leche a forraje} = \frac{5}{15} = 0.33$$

Esto indica que por cada kilogramo de forraje, el ternero recibe 0.33 litros de leche.

Ejercicios

Ejercicios Parte 1/3

1. En un establo hay 200 vacas, de las cuales 50 están enfermas. ¿Cuál es la razón de vacas sanas a vacas enfermas?
2. Un ganado recibe una mezcla de 40 kg de heno y 30 kg de silo. ¿Cuál es la razón de heno a silo?
3. Si un perro requiere una dosis de 15 mg de un medicamento por cada 10 kg de peso corporal, ¿cuál será la dosis para un perro que pesa 25 kg?
4. Un veterinario tiene 120 dosis de vacuna para 300 animales. ¿Cuál es la razón de dosis de vacuna a animales?

Ejercicios Parte 2/3

5. En una granja avícola, el ratio de huevos producidos por gallina es 2.5. Si hay 100 gallinas, ¿cuántos huevos se producen al día?
6. Un ganadero alimenta a sus cerdos con 120 kg de maíz y 60 kg de avena. ¿Cuál es la razón de maíz a avena?
7. En un experimento de crecimiento animal, se miden dos grupos de ovejas, el Grupo A aumenta de peso 0.4 kg/día y el Grupo B 0.5 kg/día. ¿Cuál es la razón de crecimiento entre los dos grupos?

Ejercicios Parte 3/3

8. Si un veterinario debe administrar un medicamento en base al peso del animal, y el medicamento se dosifica a razón de 5 mg por kg de peso corporal, ¿cuál sería la dosis para un perro de 12 kg?
9. Un grupo de vacas consume una mezcla de 150 kg de pasto y 50 kg de concentrado. ¿Cuál es la razón de concentrado a pasto?
10. En un rebaño de caballos, el número de caballos con problemas de salud es de 10, mientras que el número de caballos sanos es 50. ¿Cuál es la razón de caballos enfermos a caballos sanos?

Soluciones

1. En un establo hay 200 vacas, de las cuales 50 están enfermas. ¿Cuál es la razón de vacas sanas a vacas enfermas?

Solución:

La cantidad de vacas sanas es $200 - 50 = 150$. La razón de vacas sanas a vacas enfermas es:

$$\frac{150 \text{ vacas sanas}}{50 \text{ vacas enfermas}} = 3$$

Por lo tanto, la razón es 3:1.

2. Un ganado recibe una mezcla de 40 kg de heno y 30 kg de silo. ¿Cuál es la razón de heno a silo?

Solución:

La razón de heno a silo es:

$$\frac{40 \text{ kg de heno}}{30 \text{ kg de silo}} = \frac{4}{3} \approx 1.33$$

Por lo tanto, la razón es aproximadamente 1.33:1.

3. Si un perro requiere una dosis de 15 mg de un medicamento por cada 10 kg de peso corporal, ¿cuál será la dosis para un perro que pesa 25 kg?

Solución:

La dosis por kg es $\frac{15 \text{ mg}}{10 \text{ kg}} = 1.5 \text{ mg/kg}$. Para un perro de 25 kg, la dosis será:

$$25 \text{ kg} \times 1.5 \text{ mg/kg} = 37.5 \text{ mg}.$$

4. Un veterinario tiene 120 dosis de vacuna para 300 animales. ¿Cuál es la razón de dosis de vacuna a animales?

Solución:

La razón de dosis a animales es:

$$\frac{120 \text{ dosis}}{300 \text{ animales}} = 0.4 \text{ dosis/animal.}$$

5. En una granja avícola, el ratio de huevos producidos por gallina es 2.5. Si hay 100 gallinas, ¿cuántos huevos se producen al día?

Solución:

Si cada gallina produce 2.5 huevos, entonces:

$$100 \text{ gallinas} \times 2.5 \text{ huevos/gallina} = 250 \text{ huevos.}$$

Se producen 250 huevos al día.

6. Un ganadero alimenta a sus cerdos con 120 kg de maíz y 60 kg de avena. ¿Cuál es la razón de maíz a avena?

Solución:

La razón de maíz a avena es:

$$\frac{120 \text{ kg de maíz}}{60 \text{ kg de avena}} = 2.$$

Por lo tanto, la razón es 2:1.

7. En un experimento de crecimiento animal, se miden dos grupos de ovejas, el Grupo A aumenta de peso 0.4 kg/día y el Grupo B 0.5 kg/día. ¿Cuál es la razón de crecimiento entre los dos grupos?

Solución:

La razón de crecimiento entre los dos grupos es:

$$\frac{0.5 \text{ kg/día}}{0.4 \text{ kg/día}} = 1.25.$$

El Grupo B crece 1.25 veces más rápido que el Grupo A.

8. Si un veterinario debe administrar un medicamento en base al peso del animal, y el medicamento se dosifica a razón de 5 mg por kg de peso corporal, ¿cuál sería la dosis para un perro de 12 kg?

Solución:

La dosis para el perro de 12 kg sería:

$$12 \text{ kg} \times 5 \text{ mg/kg} = 60 \text{ mg.}$$

9. Un grupo de vacas consume una mezcla de 150 kg de pasto y 50 kg de concentrado. ¿Cuál es la razón de concentrado a pasto?

Solución:

La razón de concentrado a pasto es:

$$\frac{50 \text{ kg de concentrado}}{150 \text{ kg de pasto}} = \frac{1}{3} \approx 0.33.$$

La razón es aproximadamente 0.33:1.

10. En un rebaño de caballos, el número de caballos con problemas de salud es de 10, mientras que el número de caballos sanos es 50. ¿Cuál es la razón de caballos enfermos a caballos sanos?

Solución:

La razón de caballos enfermos a caballos sanos es:

$$\frac{10 \text{ caballos enfermos}}{50 \text{ caballos sanos}} = 0.2.$$

La razón es 0.2:1.

Regla de tres simple y compuesta

La **Regla de Tres Simple** permite calcular un valor desconocido cuando dos magnitudes están relacionadas por una proporción.

Tipos:

- **Directa:** si una magnitud aumenta, la otra también.
- **Inversa:** si una magnitud aumenta, la otra disminuye.

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} \quad (\text{Directa}) \qquad \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_2}{B_1} \quad (\text{Inversa})$$

Ejercicios: Regla de Tres Simple

1. En un mapa, 2 cm representan 30 km. ¿Cuántos kilómetros representan 5 cm?
2. Una máquina produce 250 piezas en 4 horas. ¿Cuántas piezas producirá en 7 horas?
3. 6 obreros construyen una pared en 18 días. ¿Cuántos días tardarán 9 obreros?
4. Un vehículo recorre una distancia en 6 horas a 60 km/h. ¿Cuánto tiempo tardará a 90 km/h?
5. Si con 400 g de harina se preparan 10 panes, ¿cuánta harina se necesitará para 25 panes?

1. Escala en un mapa (Directa)

En un mapa, 2 cm representan 30 km. ¿Cuántos km representan 5 cm?

$$\frac{2}{30} = \frac{5}{x} \Rightarrow 2x = 150 \Rightarrow x = 75$$

Respuesta: 5 cm representan 75 km reales.

2. Producción de máquina (Directa)

250 piezas en 4 horas, ¿cuántas en 7 horas?

$$\frac{250}{4} = \frac{x}{7} \Rightarrow 4x = 1750 \Rightarrow x = 437.5$$

Respuesta: Producirá 437.5 piezas (aprox. 438 piezas).

3. Trabajo de obreros (Inversa)

6 obreros $\rightarrow$ 18 días 9 obreros $\rightarrow$ x días

$$6 \times 18 = 9 \times x \Rightarrow x = \frac{108}{9} = 12$$

Respuesta: Tardarán 12 días.

4. Velocidad y tiempo (Inversa)

60 km/h $\rightarrow$ 6 h 90 km/h $\rightarrow$ x

$$60 \times 6 = 90 \times x \Rightarrow x = 4$$

Respuesta: Tardará 4 horas.

5. Receta (Directa)

400 g $\rightarrow$ 10 panes $x \rightarrow$ 25 panes

$$\frac{400}{10} = \frac{x}{25} \Rightarrow 10x = 10000 \Rightarrow x = 1000$$

Respuesta: Se necesitan 1000 g de harina.

Regla de Tres Compuesta

La **Regla de Tres Compuesta** se aplica cuando intervienen **más de dos magnitudes** que influyen en el resultado de manera directa o inversa.

Procedimiento general:

1. Identificar las magnitudes relacionadas.
2. Determinar si la relación con la incógnita es directa o inversa.
3. Plantear una proporción compuesta y resolver.

$$x = \frac{A_1 \times B_1 \times C_1 \times \dots}{A_2 \times B_2 \times C_2 \times \dots}$$

Ejercicios: Regla de Tres Compuesta (1/2)

6. 4 máquinas producen 600 piezas en 5 horas. ¿Cuántas producirán 6 máquinas en 8 horas?
7. 8 pintores pintan una casa en 15 días. ¿Cuántos días necesitarán 12 pintores para 3 casas?
8. 5 trabajadores fabrican 200 componentes en 10 días. ¿Cuántos fabricarán 8 en 15 días?

Ejercicios: Regla de Tres Compuesta (2/2)

9. Una bomba llena un depósito en 12 minutos. ¿Cuánto tiempo tardarán 3 bombas en llenar 4 depósitos?
10. Para preparar 300 L de una solución se usan 5 reactivos en 4 h. ¿Cuántos litros se obtendrán con 8 reactivos en 6 h?

6. Producción industrial

4 máquinas $\rightarrow$ 600 piezas en 5 h 6 máquinas $\rightarrow$ 8 h $\rightarrow$ x piezas
Directamente proporcional a máquinas y tiempo:

$$x = 600 \times \frac{6}{4} \times \frac{8}{5} = 600 \times 1.5 \times 1.6 = 1440$$

Respuesta: 1440 piezas.

7. Pintores y tiempo

8 pintores $\rightarrow$ 1 casa $\rightarrow$ 15 días 12 pintores $\rightarrow$ 3 casas $\rightarrow$ x días
Casas (directa), pintores (inversa):

$$x = 15 \times \frac{3}{1} \times \frac{8}{12} = 15 \times 3 \times 0.666 = 30$$

Respuesta: 30 días.

8. Trabajo combinado

5 trabajadores $\rightarrow$ 200 comp. en 10 días 8 trabajadores $\rightarrow$ 15 días $\rightarrow$ x comp. Directa con trabajadores y días:

$$x = 200 \times \frac{8}{5} \times \frac{15}{10} = 200 \times 1.6 \times 1.5 = 480$$

Respuesta: 480 componentes.

9. Caudal de agua

1 bomba → 1 depósito → 12 min 3 bombas → 4 depósitos → x min
Depósitos (directa), bombas (inversa):

$$x = 12 \times \frac{4}{1} \times \frac{1}{3} = 12 \times 1.333 = 16$$

Respuesta: 16 minutos.

10. Mezcla química

5 reactivos $\rightarrow$ 4 h $\rightarrow$ 300 L 8 reactivos $\rightarrow$ 6 h $\rightarrow$ x L Directa con reactivos y tiempo:

$$x = 300 \times \frac{8}{5} \times \frac{6}{4} = 300 \times 1.6 \times 1.5 = 720$$

Respuesta: 720 L de solución.

Cálculo de Porcentajes

El **porcentaje** expresa una razón con denominador 100.

$$p\% = \frac{p}{100}$$

Ejemplo: Si un alimento contiene 18% de proteína, significa que por cada 100 g de alimento, 18 g son proteína.

Regla general

Para calcular el porcentaje de una cantidad:

$$\text{Parte} = \frac{\text{Porcentaje}}{100} \times \text{Total}$$

Para hallar el total:

$$\text{Total} = \frac{\text{Parte} \times 100}{\text{Porcentaje}}$$

Para hallar el porcentaje:

$$\text{Porcentaje} = \frac{\text{Parte}}{\text{Total}} \times 100$$

Ejercicios (1/2)

1. Un suplemento alimenticio contiene 24% de proteína. ¿Cuántos gramos de proteína hay en 250 g del producto?
2. Un medicamento se prepara al 10%. ¿Cuántos mL de principio activo hay en 80 mL de solución?
3. De 120 vacas, 15 presentan mastitis. ¿Cuál es el porcentaje de incidencia?
4. Un perro de 25 kg debe recibir 0.2 mL/kg de un fármaco. Si el frasco contiene 10 mL al 5%, ¿qué cantidad total de principio activo recibirá?
5. Un alimento para aves tiene 12% de grasa. ¿Cuánta grasa hay en 3 kg de alimento?

Ejercicios (2/2)

1. Una vacuna tiene eficacia del 92%. Si se aplicó a 500 animales, ¿cuántos quedan sin inmunidad?
2. Un lote de leche contiene 4.2% de grasa. ¿Cuántos litros de grasa pura hay en 800 L de leche?
3. La tasa de natalidad en un rebaño fue del 78% sobre 90 hembras. ¿Cuántas crías nacieron?
4. Un laboratorio reporta una pérdida del 15% en la concentración de un reactivo. Si originalmente tenía 200 g/L, ¿cuál es la nueva concentración?
5. El peso de un ternero aumentó de 35 a 49 kg en un mes. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento?

Ejercicio 1: Proteína en suplemento

Enunciado: El suplemento contiene 24% de proteína. ¿Cuántos gramos de proteína hay en 250 g del producto?

Cálculo:

$$\text{Proteína} = \frac{24}{100} \times 250 = 0.24 \times 250 = 60 \text{ g.}$$

Respuesta: 60 g de proteína en 250 g de suplemento.

Ejercicio 2: Principio activo en solución

Enunciado: Medicamento al 10%. ¿Cuántos mL de principio activo hay en 80 mL de solución?

Cálculo:

$$\text{Activo} = \frac{10}{100} \times 80 = 0.10 \times 80 = 8 \text{ mL.}$$

Respuesta: 8 mL de principio activo en 80 mL de solución.

Ejercicio 3: Porcentaje de incidencia (mastitis)

Enunciado: De 120 vacas, 15 presentan mastitis. ¿Cuál es el porcentaje de incidencia?

Cálculo:

$$\text{Incidencia} = \frac{15}{120} \times 100 = \frac{1}{8} \times 100 = 12,5\%.$$

Respuesta: 12.5% de incidencia (12.5% de las 120 vacas).

Ejercicio 4: Dosificación total y principio activo

Enunciado: Perro de 25 kg debe recibir 0.2 mL/kg de fármaco. El frasco contiene 10 mL al 5%. ¿Qué cantidad total de principio activo recibirá?

1. Volumen total de solución a administrar:

$$V_{\text{sol}} = 25 \text{ kg} \times 0.2 \frac{\text{mL}}{\text{kg}} = 5 \text{ mL}.$$

2. Principio activo en esa cantidad (5% del volumen administrado):

$$\text{Activo} = \frac{5}{100} \times 5 = 0.05 \times 5 = 0,25 \text{ mL}.$$

Respuesta: Se administran 5 mL de solución, que contienen 0.25 mL de principio activo.

Ejercicio 5: Grasa en alimento avícola

Enunciado: Alimento con 12% de grasa. ¿Cuánta grasa hay en 3 kg?

Convertimos 3 kg a gramos para mayor claridad: $3 \text{ kg} = 3000 \text{ g}$.

$$\text{Grasa} = \frac{12}{100} \times 3000 = 0.12 \times 3000 = 360 \text{ g}.$$

Respuesta: 360 g de grasa en 3 kg de alimento (ó 0.36 kg).

Ejercicio 6: Animales sin inmunidad

Enunciado: Vacuna con eficacia 92%. Se aplicó a 500 animales.
¿Cuántos quedan sin inmunidad?

Porcentaje sin inmunidad: $100\% - 92\% = 8\%$.

$$\text{Animales no inmunes} = \frac{8}{100} \times 500 = 0.08 \times 500 = 40.$$

Respuesta: 40 animales quedarían sin inmunidad (aprox.).

Ejercicio 7: Grasa en leche (volumen de grasa)

Enunciado: Leche con 4.2% de grasa. ¿Cuántos litros de grasa pura hay en 800 L de leche?

$$\text{Litros de grasa} = \frac{4.2}{100} \times 800 = 0.042 \times 800 = 33,6 \text{ L.}$$

Respuesta: 33.6 litros de grasa pura (considerando densidad $\approx 1 \text{ kg/L}$ para estimaciones volumétricas).

Ejercicio 8: Tasa de natalidad

Enunciado: Tasa de natalidad 78% sobre 90 hembras. ¿Cuántas crías nacieron?

$$\text{Crías esperadas} = \frac{78}{100} \times 90 = 0.78 \times 90 = 70,2.$$

En práctica, las crías son enteras $\rightarrow$ redondeo razonable: ≈ 70 crías (puede informarse como 70 o 70-71 según contexto).

Respuesta: aproximadamente 70 crías.

Ejercicio 9: Pérdida de concentración

Enunciado: Pérdida del 15% en la concentración de un reactivo. Original: 200 g/L. ¿Nueva concentración?

$$\text{Nueva conc.} = 200 \times \left(1 - \frac{15}{100}\right) = 200 \times 0.85 = 170 \text{ g/L.}$$

Respuesta: 170 g/L.

Ejercicio 10: Incremento de peso

Enunciado: Ternero sube de 35 a 49 kg en un mes. ¿Cuál fue el porcentaje de incremento?

Aumento absoluto:

$$\Delta = 49 - 35 = 14 \text{ kg.}$$

Porcentaje de aumento relativo al peso inicial:

$$\text{Porc.} = \frac{14}{35} \times 100 = 0.4 \times 100 = 40\%.$$

Respuesta: Incremento del 40%.

- **Formulación de piensos:** porcentajes de proteína, grasa y fibra.
- **Farmacología:** concentraciones y diluciones.
- **Epidemiología:** prevalencia e incidencia de enfermedades.
- **Reproducción:** tasa de parición, fertilidad y mortalidad.

El dominio del cálculo porcentual permite tomar decisiones precisas en la práctica profesional.