<2019 본3 학년말고사 – 소아청소년과->

학년말 야마, 본2 야마, 당해 한양대 출제 임종평에서 몇 문제 씩, 나머지 탈야마

총 40문제 중 40문제 복원

1. 6세 남아가 잠 자다가 오른쪽 입주변과 얼굴에 경련이 있어 내원했다. 의식은 명료했다. EEG 상 centrotemporal spikes 보였다. 장기간 처방할 약제로 옳은 것은?

   A. Carbamazepine

   B. Phenytoin

   C. Phenobarbital

   D. Diazepam

   E. Topiramate

2. 소아 만성 기능성 복통증후군에 대해 옳은 것은?

   A. 일상생활을 영위 못할 정도는 아니다.

   B. 밤에 자주 아프다.

   C. 주로 통증이 상복부이다.

   D. 6세 이전에 흔하다.

   E. 금식과 식사에 영향을 안 받는다.

3. 6세 남아가 상기도 감염 2일 후 혈뇨가 발생해 내원했다. 혈뇨는 하루 지속되고 없어졌다. 요검사 상 요단백(-) 요잠혈(2+) 가장 의심되는 것은?

   A. 알포트 신드롬

   B. PSGN

   C. IgA nephropathy

   D. 용혈성 요독증후군

4. 3세 여아가 내원했다. 진찰 상 성장장애 있었고 몸통과 엉덩이에 상처가 있었다. 팔,다리,머리,갈비뼈에 시기가 다른 골절 발견. 의심되는 것?

   A. 연골무형성증

   B. 아동학대

5. 2세 여아 2일 간 지속되는 지속되는 구토와 설사로 내원했다. 오늘만 구토 3번 설사 10번 했다. 기저귀 가는 횟수 줄었으나 소변은 나왔다. 입술 말라있고 기운 없고 자꾸 자려 했다. 현재 14kg고 마지막 잰 몸무게 15kg 였다. 혈압 110/60mmHg, 맥박이 184회/분. [탈수의 중등도-1일 수분 유지량-phase 1 수액량-phase 2 수액량] 으로 알맞게 짝지어진 것은?

   A. 중등도-1500ml-300ml-2200ml

6. 10세 여아 발열, 기침, 콧물로 내원. 주변도 비슷한 증상. 결막 충혈 있었고 입안에 하얀 반점 있었다. 피부 발진이 있었다가 사라진 후에 피부가 벗겨졌다. 다음 질환으로 인한 합병증 중 사망률이 높은 것은?

   A. 폐렴

   B. 뇌염

   C. 신장문제

   D. 관절통

7. 재태 39주 2400g, 키 49cm, 두위 36cm 로 태어난 아기에서 문제 원인일 가능성이 가장 적은 것은?

   A. 임신 중 전자간증

   B. 임신 말기 영양부족

   C. 산모의 만성 합병증을 동반한 당뇨

   D. 산모의 만성 고혈압

E. 선천성 풍진

8. 5세 남아 2일 전부터 인후통 발열 있었다. 기침은 심하지 않았다. 딸기혀 사진 줬고 몸통에 구진성 발진 있었다. 치료는?

A. 아목시실린

B. 아스피린

C. 아세트아미노펜

D. 클라리스로마이신

E. IVIG

9. 생후 4일된 아기에서 T.bil 17, Hb 8.5, Reti 16%, CRP 0.01(정상 <0.03)일 때 가장 가능성 있는 질환?

A. 구상적혈구증

B. 모유황달

C. 선천성 감염

D. 생리적황달

10. 영유아에서 호흡곤란이 잘 일어나는 이유로 맞는 것은?

A. 기관지 평활근이 적고 미숙

B. 후두 연골이 발달하여...

C. 기관지 내경이 넓고 후두개가 짧아서 구강호흡을 한다.

D. 분비물이 적게 분비된다.

11. GERD 검사법으로 맞는 것은?

A. 식도조영술로 90% 진단 가능하다.

B. 식도내시경으로 역류의 심한 정도 알 수 있다.

C. 식도스캔으로 기도 흡인여부 알 수 있다.

D. Manometry로 역류되는 volume 알 수 있다.

E. 위산도검사로 상부 식도의 침범까지 알 수 있다.

12. 조혈모세포 생착을 위해 정맥주사로 골수나 말초 백혈구를 얼마나 넣어야 하는가?

A. 1-4X10^8

13. 6세 남아가 유치원 소풍 중 갑자기 발생한 호흡곤란으로 응급실에 왔다. 호흡수는 35회/분으로 빠른 편이었으며, 호흡 시 흉곽 함몰 소견이 동반되었다. 동맥혈 가스검사 결과 다음과 같을 때 체내 산염기 상태는?

pH 7.26 PO2 75mmHg, PCO2 65mmHg, HCO3 24mEp/L

A. 보상된 대사성 산증

B. 보상된 호흡성 산증

C. 보상되지 않은 대사성 산증

D. 보상되지 않은 호흡성 산증

E. 호흡성 산증과 대사성 산증의 혼합

14. 여아 4세 경부종물 0.4x0.9cm mass, 열감x, 발적x, 동통x, movable. 추후 시행해야할 조치는?

A. 경과관찰

B. FNAB

C. 항생제

D. 제거

15. AR 가계도 주고 다음과 같이 유전되는 질환은?

A. 갈락토세미아

B. Duchenne 근육 병증

C. 말판 신드롬

16. 설사로 내원함. 혈압 괜찮고 맥박 약하고 빨랐다. 혀가 말라있었다. 나트륨 142 요 나트륨 15?

A. 0.9% NS


B. 사이클로스포린

C. 사이클로포스파마이드

D. 수분제한

E. 만니톨

17. 반복적인 실신을 보이는 여아. 치료는?




A. Adenosine

B. Digoxine

C. Verapamil

18. 생후 30개월 된 여아가 안구돌출이 있으면서 하지 동통으로 인하여 잘 걸으려고 하지 않아서 응급실로 내원하였다. 환아는 내원당시 진찰 소견상 좌측 상복부에 종괴가 만져졌다. 조직소견이 다음과 같이 나타났다. 진단은?



A. 망막모세포종


B. 횡문근육종

C. 배모세포종

D. willm's tumor

E. 신경모세포종

19. 이 sign을 보이는 병을 일으키는 유전자



A. Dystrophin

B. SMN-1

C. SMN-2

20. 5세 남아 뇌수막염 발열, 경부강직,

CSF : WBC 180 (lympho 100%), 압력 12cmh2o

RBC 8, 단백질 23

진단은?

A. 바이러스성 뇌수막염

B. 결핵성 뇌수막염

C. 세균성 뇌수막염

21. 범혈구 감소증과 골수 검사에서 세포충실도가 감소해있는 비중증(중등도) 재생불량 빈혈 9세 소아. 추가 검사에서 hemoglobin F 증가해있

었고 chromosome breakage 확인되었다. 필요한 처방은?

A. hematopoietic stem cell transplantation


B. hemotopoietic growth factor

C. transfusion only

D. antithyrocyte+myoglobulin

E. prednisone

22. 출생전 심각한 감염이나 유전적 문제로 발생하는 저신장과 성장 실패 곡선은?



A. A

B. B

C. C

D. D

E. 답 없음

23. 담즙정체증으로 생후 1개월부터 현재 생후 5개월까지 치료받고 있는 체중 7kg환자. 병명은 신생아 간염. OT/PT : 159/119, TB/DB : 9.9/4.5. 1개월보다 증가한 수치들이다. 추가적인 처방 필요하다고 판단하였다. 필요한 약제는?

A. Vitamin E 400IU

B. Vitamin D3 400IU

C. Vitamin K 5mg

D. 스테로이드 한달치료

E. 철분제 매일 복용

24. 철결핍 빈혈 의심되어 철분제 치료한 환자 치료 반응 보기 위해 필요한 검사항목과 시기는?

A. 혈색소 3개월

B. 망상적혈구 7일

C. 혈청철 1개월

D. 혈청페리틴 7일

25. 생후 40일 된 환자. 30일간 지속되는 기침으로 내원. 기침은 발작적이고 15초 동안 지속. 연속적인 기침후에 흡소리를 내었고, 기침 후에 구토를 하였다. 입주변 청색증과 가끔씩 무호흡. 백혈구 13000(림프구80, PMN 16, 단핵구4)

A. Erythromycin

B. Aminoglucoside

C. Penicillin

D. Cephalosporin

E. Vancomycin

26. 유아 소화기 질환에 관해 옳은 것은?

A. 2개월 아이에게 salmonella 대변에서 검출되면 항생제 준다

B. Giardia 걸리면 설파제 준다

C. WHO ORS는 IV hydration 주고 아이의 mental이 돌아오면 입으로 먹게한다.

D. 10kg에서 9kg 됐는데 소변 안 나오면 ORS 500ml 줘야 한다.

E. 10회 이상 설사하면 장운동억제제 준다.

27. 산모가 HBsAg+ 인데 preterm으로 아기 1700g를 낳았다. 어떤 처치 필요?

A. 태어나자 마자 IVIG 준다.

B. 생후 12시간 이내에 IVIG와 vaccine을 동시에 투여한다.

C. 나머지는 말도 안되는 것들

28. APGAR Score 구하라. 호흡 느리고 불규칙, 온몸 파랗다, 자극에 무반응, 심박수 50, 사지 약간 굴곡.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

29. 출생 후 반응 없는 아기, 발바닥 자극 줘도 자발호흡 없음. HR 90미만인 아기. 다음 치료는?

A. 산소 양압환기

B. 양압환기와 심장마사지

C. 다리 뒤로 들어서 등 때리기

30. 체중이 증가 하지 않아 내원한 아이. 이전에 폐렴을 3번 앓은 병력이 있다. 청색증이 없고, 심음 청진에서 S2에서 증가된 소리, 왼쪽 흉골 좌하부에서 심잡음 들림.

A. VSD

B. 폐동맥협착

C. 폐정맥이형성

D. ASD

31. 경련을 했다고 온 소아. 짧은 경련을 보였으며 심전도에서 QT prolongation을 보였다고 한다. Glc 75mg/dl Na 138mEq/L P 8 iCa 2.1

A. Ca gluconate

B. mannitol

C. 10% 포도당

32. 재채기 심하고 코막힘 때문에 내원, 맑은 콧물 나오고 코 간지러움도 심하다. 집먼지진드기에 감작되어있었다. 처음으로 처방할 약?

A. 비강내 스테로이드

B. 항히스타민제

C. 항류코트린제

33. 아이가 소변이 없고 혀가 말랐다. 혈액검사 상 serum albumin 떨어져있었음. 다리에 부종 있었다. 24h 소변에서 protein 4200mg 나옴. 치료는?

A. Prednisone

B. Cyclosphorine

C. Cyclophosphamide

D. 20 % albumin

34. 정상분만한 환아가 황달을 주소로 내원했다. TSH 70, Tyrosine 0.3. 그에 할 치료는?

A. 효소 대체요법

B. 축적 물질 배출

C. 식이 요법

D. 최종 산물 투여

E. 조효소 투여

35. 2주 전 인후통 있었던 남아. 콜라색 소변 본다. 진단에 중요한 것은?

A. C3

B. ANA

C. CRP

D. 인후배양

E. 소변 b2 myoglobulin

36. 가와사키 질환 진단기준에 맞지 않는 것

A. 아급성 손발 끝 막양 낙설

B. 다양한 모양의 홍반

C. 5일 이상 지속되는 발열

D. 맥박 상승 및 혈압 감소

37. 18개월 남아 발달 부족한 것? 잡고 걸을 수 있지만 혼자 못걸음. 엄마, 아빠 외에 10-15개 단어 말함. 눈 마주침 정상, 낯선 곳에서 수시로 운다. 연필로 끄적거리지만 직선은 못그림.

A. 대근육발달지연

B. 소근육발달지연

C. 전반적 발달 지연

D. 언어 발달 지연

E. 사회적 발달 지연

38. 아토피 진단 부소견으로 맞는 것은?

A. 피부 검사 양성

B. 가려움증

C. 가족력

D. 만성과 재발

E. 특징적 부위와 나이에 따른 가려움

39. 천식 아이가 low dose ICS와 LABA 쓰고 있었는데 생활 불편하고 주 2-3회 증상완화제 필요했음. 향후 치료는?

A. 항류코트리엔

B. 고용량 흡입 스테로이드

C. 중등도 용량 흡입 스테로이드

D. 속효성 베타 작용제 주기적 흡입

40. 컹컹거리는 기침. 흡기시 협착음. 열나고 쉰목소리. 원인은?

A. Parainfluenza

B. Adenovirus

C. Hib