
<2021 본 3 학년말고사- 소아청소년과>

총 **45 문제** 중 **42 문제** 복원

소아청소년과 치고는 야마 많이 탄 편이었음.
당해 한양대 임종평에서도 꽤 출제됨

1. 초등학교에 다니는 9 세 여아가 8 일간 지속된 발열과 발작적인 마른기침으로 왔다. 두통과 복통도 같이 호소하고 있다. 체온은 38.4℃, 체간에 사진과 같은 홍반구진상발진(maculopapular eruption)이 있고 양측 폐에서 나음이 청진되었다. 다음은 혈액 검사 결과 및 가슴 X-선 사진이다. 다음 설명 중 옳은 것은?



- 복통, 심막염, 뇌수막염, 근육통 등 폐외 증상이 동반될 수 있다
- 매년 유행하며 주로 여름에 유행한다
- 페니실린계로 치료한다.
- 냉응집소는 이 질환에서만 특징적이다.
- 면역력이 약한 영유아가 잘 걸린다

2. 발열, 기침, 콧물로 내원한 환아. 결막 충혈이 있고 피부에 발진이 있으며 다음 사진과 같은 증상이 있었다. 다음 질환으로 인한 합병증 중 사망률이 높은 것은?




- 폐렴
- 중이염
- 관절염
- 뇌염
- 아급성 경화 전뇌염

3. 3 세 소아가 10 일간 상기도 감염 증상을 보이다가 어제부터 발작적인 기침이 발생하였다. 기침의 양상은 발작적인 짧은 호기성 기침이 연발되다가 끝에 길게 숨을 들이쉬며 "흘"하는 소리를 내는 것이었다. 혈액검사 결과가 다음과 같을 때, 치료는?

WBC 13,200 (PMN 16%, Lympho 84%)

- 세팔로스포린
- 페니실린
- 아미노글리코사이드
- 반코마이신
- 에리스로마이신

4. 2 세 남아, 다음과 같은 질병 양상 보였을 때 진단은?



- 돌발진
- 홍역
- 풍진

5. 10 세 여아 몇개월전부터 음모 나옴. 유방 발달도 약간 있었음. 검사결과 유방 태너 2 단계, 음모 태너 2 단계. 아직 Puberty 오지 않음.
진단은?

- 정상 사춘기
- 진성 성 조숙증

6. 5 살 남자가 의식저하로 응급실 내원.
소변 케톤 (+3) 혈당 600 처치는? (답모름)

- 0.9% normal saline
- 중탄산염

7. 12 세 여아가 키가 작아서 내원했다. 골 연령은 8 세이고 성장속도는 1 년에 3cm 이다. 신장은 3rd percentile 미만, 체중은 25th percentile 에 속하고 복부비만이 있었다. tanner 3 단계일 때 확진 검사 방법은? (엄마아빠 키 평균키 주어짐. IGF 검사 안 함.)

- 아르기닌 투여후 성장호르몬 측정
- 포도당 투여후 성장호르몬 측정
- IGF-1 측정

8. 남자 아이 약간의 경련 등의 hypocalcemia 증상으로 내원한 문제. Ca 5.8, vitD 25(정상범위), P 9.6(정상치가 4 정도까지였음), PTH 9(정상치 10-65). 치료는?

- 활성 비타민 D 투여
- PTH 투여
- 투석
- 항경련제 투여
- 마그네슘 투여

* Hypomagnesemia 로 인한 PTH 약간 저하와 hypocalcemia 로 생각됨

9. 4 개월 여아가 얼굴이 파랗게 보여 병원에 왔다. 심하게 울다가 청색증이 더 심해졌다. 출생 직후부터 심잡음이 들린다는 이야기를 들었었다. 해야 할 치료는?


- 모르핀 근주
- 프로스타글란딘
- 디곡신
- 항생제 투여
- 이뇨제 정주

10. 4 세 남아 열이 나서 병원에 왔다. 청색증은 없었지만 땀이 많이 났다. 신생아 때 심장병 있다 했으나 치료받지 않았다. 신체검진 상 좌 흉골연에 3/6 도의 수축기 심잡음과 심첨부 4/6 도의 이완기 심잡음이 들렸고, 제 2 심음의 폐동맥 성분이 향진 되어 있었다. 가장 의심되는 진단은?




- Eisenmenger syndrome
- ASD

11. 6 세 여아가 예방 접종 맞으러 갔다가 심잡음이 들린다 하여 내원했다. 누운 자세에서 심잡음이 더 잘 들렸다. (심잡음 어디서 어떻게 들리는지 설명 더 있었음.)



- PDA
- 경정맥 잡음
- 경동맥 잡음
- 스틸 심잡음
- ASD

12. 44 세 남자가 흉부 방사선 사진에서 이상한 음영이 관찰되어 병원에 왔다. 흉통은 없었고 12 살에 7 일간 지속되는 고열과 목의 임파선 비대로 편도선 수술을 받은 병력이 있다. 심전도는 정상이며, 시행한 관상동맥조영술은 다음과 같다. 원인은?



- 류마티스열
- 좌측 관상동맥-폐동맥 이상기시증
- 관상동정맥 누공
- 가와사키병
- 류마티스 관절염

13. 알레르기 비염의 증상 중 비충혈에 효과가 가장 좋은 것은?

- 비강 항히스타민제
- 경구 항히스타민제
- 비강 스테로이드
- 경구 충혈억제제
- 항콜린제

14. 아나필락시스에 대해 옳은 것은?
- 초기 응급치료로 H1 길항제를 사용한다.
- 초기 응급치료로 에피네프린을 근육 주사 한다.
- 소아에서 가장 흔한 원인은 방사성 조영제에 의한 것이다.
- 피부 소견만으로 진단할 수 있다
- 호흡 곤란 증상만으로 진단할 수 있다.

15. 모유 영양에 대한 설명으로 옳은 것은?
- 초유가 모유에 비해 지방이 많다
- 모유가 분유에 비해 지방이 많다
- 유선염일 때 모유 수유를 중단하지 않아도 된다.
- 모유 수유 시에 유방을 다 비워내지 않아도 된다.
- 모유의 단백질은 주로 casein 이다.

16. 모유 영양을 하는 1 개월 영아에서 반드시 보충해주어야 하는 영양소는?
- Vitamin K
- Vitamin D
- Vitamin E
- Fluoride
- Iron

17. 3 개월 영아에서 철분을 보충해주는 가장 좋은 방법은?
- 모유
- 황색채소
- 과일
- 철분강화 곡물

18. 급성 췌장염 소견에 대한 치료로 일주일 넘게 금식 했던 환아가 배가 고파 보호자가 간식을 사와 먹었다. 아이가 복통을 호소하며 사지에 경직 증상이 생겼다. 다음 중 추적해야 하는 수치는?
- Calcium
- Phosphorus
- Urea
- Ammonia

19. 7 세 아이 몸에 밀크커피색 반점이 있다. 겨드랑이에도 반점이 있고 어머니도 동일한 증상과 함께 뇌종양이 있다. 진단은?



- 색조실조증
- 결절경화증
- 스터지웨버증후군
- 신경섬유종
- 다발경화증

20. 15 세 여자. 1~2 년전부터 시작된 두통이 있고 2~3 달전부터 심해졌다. 빛을 보면 증상 악화되기도 하였고 팔의 감각저하가 동반되기도 하였다. 평소 학교 스트레스 많았고 두통으로 인해 결석하기도 하였다. 조치는?
- 생활습관 교정
- 뇌파검사
- 뇌영상검사
- 심리상담

21. (Y) 6 세 남아가 잠자다가 입 주변과 얼굴에 경련 있어 내원하였다. 의식 명료했고 EEG 상 centrotemporal spikes 보였다. (EEG 주어짐) 장기간 처방할 약제로 옳은 것은?
- Carbamazepine
- Phenytoin
- Phenobarbital
- Diazepam
- Topiramate

22. 만삭, 자연분만. 출생 후 복사온열기 아래에 두고, 담요 덮고, 입, 코 흡인하고, 등, 발바닥 자극했는데도 반응 없는 아이. 심박 80. 치료는?
- 마스크로 양압 환기
- 양압환기하며 심장마사지
- 거꾸로 들고 등 두드리기 Calcium

23. 36 주 2 일 3600g, 전자간증으로 혈압 조절하는 산모. 출생 후 복사온열기 아래에 두고, 담요 덮고,

입, 코 흡인하고, 등, 발바닥 자극했는데도 반응 없는 아이. 심박 70. 치료는?

- T piece resuscitatior 양압환기
- 강하게 등, 발 때리며 자발호흡 유도
- 산소치료

24. 26 주 750g 태어난 후 청색증, 빈호흡 등 보여 폐활성제 주고 기계환기했더니 호전되어 72 시간 후 삽관 뺌. 이후 다시 호흡곤란 증세 나타났고, 근긴장도 저하 있었고, 모로징후는 없었다. 흉부 방사선 상 심비대와 폐혈관 음영 증가가 관찰되었다. 진단은?

- 동맥관 개존증
- 신생아 폐고혈압
- 신생아
- 기관지 이형성증

25. 40 주 3.9kg 목에 탯줄 감겨 숨 제대로 쉬지 않음. 1 분 Apgar 2 점, 5 분 Apgar 4 점으로, pH 6.98, CO2 49.8 O2 63 HCO3 11.8 BE -20 치료는?

- 저체온요법
- 항생제
- 스테로이드

26. 30 주 1250g. 폐 사진 줌. 빈호흡, 청색증 등. 치료는? (RDS 문제였던 것으로 예상)

- IV Ibuprofen
- 폐표면활성제

27. 다음 설명에 해당하는 질환은?
X linked 가 흔하고, 상염색체 열성이나 산발로 일어나는 경우도 있다. T cell 관련은 정상.
산모에게서 받은 항체가 사라지는 6-9 개월에 세균 감염이 잦게 나타난다. Ig A,M,G 모두 95% 이하로 떨어지며 총 감마글로불린이 100mg/dl 이하로 나타난다. 치료료는 부족한 감마글로불린을 보충한다.

- Digeorge syndrome
- 범저감마글로불린혈증
- Chediak-Higashi Syndrome
- Wiskott–Aldrich syndrome

28. 만삭아. 5 분 Apgar socre 점수?
심박수 50, 손발 청색, 사지 굴곡, 카테터 반응 없음, 호흡 느리고 불규칙

- 3
- 4
- 5
- 6

29. 39 주 2400g 키 49cm, 머리둘레 34cm 으로 비대칭적으로 성장. 원인으로 흔하지 않은 것?

- 산모의 만성적인 고혈압
- 산모의 만성적인 합병증을 동반한 당뇨
- 산모의 임신 말기 영양결핍
- 선천성 풍진
- 임신 중 전자간증 Calcium

30. 생후 2 일된 아이가 황달로 내원했다. Total bilirubin 20, Hb 8.0 Reti 15%, CRP 0.01 일 때 진단은?

- 모유 황달
- 생리적 황달
- ABO 부적합
- 선천성 감염

31. 생후 10 일된 남아가 신생아 선별검사 상(생후 3 일) 낮은 T4 를 주소로 내원했다. Free T4, T4, T3, TSH (모두 정상보다 훨씬 낮음). 갑상선 사진 줌. 진단은?

- 뇌하수체 이상
- 딴 곳 갑상샘
- 갑상샘 호르몬 합성장애

32. 소변보지 않음을 주소로 내원. 출산 당시 임신성 당뇨로 인슐린 먹던 산모. Glc 20, Ca 9.7 P 4.5 치료?

- 10% 포도당
- IV gluconate

33. 아동학대 의식을 잃은 5 세 아이가 어머니에게 안겨서 왔다. 다발성 골절, 뇌 CT 상 출혈 소견, 발생 시기가 다른 멍이 온몸에서 발견되었다. 옳지 않은 것은?

- 성학대가 가장 흔한 유형이다.

- 아이 보살핌에 대한 부모의 교육 방식의 태도가 가장 흔한 문제이다. (방임 의미하는 보기)
- 친부모에 의한 것이 흔하다.

34. 발달 시기 몇 개월에 나타나는가?



- 4-5 개월
- 10-12 개월
- 15-18 개월

35. ABO 부적합에 대한 설명으로 옳지 않은 것?

- 모체에서 시행한 쿰스 거사는 음성인 경우가 흔하다.
- Rh 부적합에 비해 증상이 경하다.
- 산모 O 형, 태아 A 또는 B 형일 때 생긴다.
- 태아 적혈구 수명 연장 때문에 발생한다

36. 8kg 6 개월 된 남아, 6 시간 전부터 소변 나오지 않음, 3 일간 설사, 모유수유는 절반이하로 감소 BP 75/45 PR 190 BT 37.2 RR 70 O2 saturation 92% , 입술 마르고 tone 떨어짐, 해야할 처치는?

- 에피네프린 지속 점적 주입
- 생리식염수 160ml 주입
- 정맥 주사 대신 골내주사로 약제 주입해도 된다
- 교질액(colloid) 보충
- 항생제 주입

37. 10 세 남아 무릎 아래 통증 및 종창으로 내원하였다. 과거 3 세에 안과에서 오른쪽 안구 적출 후 방사선 치료 병력있다. 환자의 영상 검사 사진은 다음과 같다. 환자의 질병 발병과 관련된 유전자는?



- PMAL-RARA
- AML
- P 53
- Rb

38. 5 세 남아가 안면 창백을 주소로 내원하였다. 신체진찰 상 환자의 오른쪽 손가락이 2 개로 기형이 동반되었다. Hb 4.5, WBC 1,500(ANC 320), PLT 39,000. HbF 는 상승해있었다. BM cellularity 는 10%였다. 환자의 초기 치료로 적절한 것은?

- 조혈모세포이식
- Prednisone
- Antithymocyte globulin


39. 8 개월 남아가 3 일전부터 콧물, 재채기가 있었고, 1 일전부터 전부터 기침이 심해지면서 먹지 못하고 쳐졌다고 한다. 양쪽 가슴에 갈비사이 뒤당김이 있다. 가슴청진에서 날숨에서 쌕쌕거렸고, 심잡음은 없다. 치료는?

- 에피네프린 흡입
- 수액보충
- 항생제

40. 1 세 여아가 갑작스러운 의식 소실로 왔다. 맥박과 호흡음은 느껴지지 않고, 혈압은 측정할 수 없었다. 해야될 처치로 옳은 것은?

- 산소를 투여한다
- 우선 기관삽관을 준비한다
- 흉부단층촬영을 위해 잠시 심마사지를 중지해야한다
- 심마사지는 150 회/분 이상으로 빠르게 시행한다.

41. 평균 기도압력을 높이는 방법으로 2 에 해당하는 방법은?



- 흡기의 flow rate 증가
- 최대 흡기 압력 증가
- 흡기와 호기 시간 비 조정
- 호기 말 양압 증가
- 호흡횟수의 증가

42. 5 세 남아가 발열로 내원, 경부강직 있었고 CSF 는 다음과 같다. 진단은?

CSF: WBC 180(Lympho 100%), 압력 12cmH2O, RBC8 단백질 23

- 바이러스성 뇌수막염
- 결핵성 뇌수막염
- 세균성 뇌수막염