2026학년도 소아청소년과 학년말고사 답지(260413)

* 총 40문항(40문항 복기), 60분 시험(CBT)
총평: 전반적으로 야마를 타긴 했으나, 야마 변형도 있었음. 시험 전 '실습 시험'에서 많이 출제하겠다고 하셨음.

1. 18개월 환아, 38도의 발열, 구토로 응급실 내원하였다. 내원하기 전 우측 팔을 떨었으며 응급실 도착 후 20분간 지속하던 경련을 멈추었다. 경련 멈춘 후 엄마 잘 알아보지만 평소보다 더 보채는 양상이었고, 손바닥, 발바닥에 수포가 확인되었다. WBC 12000, Hb 12, PLT 20000, 혈당 90, CRP 1.2, 이외 전해질 수치 등 정상 범위였으며 응급으로 시행한 Brain CT에 특이소견은 확인되지 않았다. 이후 시행할 처치로 가장 적절한 것은?
① IV benzodiazepine
② 뇌척수액 검사
③ 뇌파 검사
④ 급속 수액 치료 후 즉시 귀가

2. 13개월 환아가 4일 전부터 39.5도의 발열이 발생하며 경련이 있었다. 경련은 이내 멈추었고 1일 전 열은 내렸지만 열이 내림과 동시에 발진이 몸통 부위에 나타났다. 발진은 연분홍색 반구진성 발진의 양상이었고 신체진찰 상 몸통 이외에 팔과 다리에 발진이 퍼져있는 것이 확인되었다. 진단은?
① 돌발진
② 가와사키병
③ 홍역
④ 성홍열
⑤ 백일해

3. 2개월 여아가 예방접종 맞기 위해 내원했다. 흉부 진찰 시 특이소견은 없었다. 그런데 아이 돌봐주는 할머니가 1주일 전 활동성 결핵 판정 받았고, 아이 흉부 X-ray는 이상 소견 없다. 이후 시행할 처치로 가장 적절한 것은?
① 항결핵제
② IGRA
③ TST
④ 경과관찰
⑤ 항생제

4. 6개월 아이가 계속 반복되는 상기도 감염력으로 병원에 내원하였다. 아이의 외삼촌이 비슷한 증상으로 병원 다닌 적이 있다고 한다.

IgG 98, IgA 〈5, IgM 18 CD 19 B cell 낮음, CD 4 T cell 700, CD 8 T cell 1500

진단은?
① X-linked agammaglobulinemia
② Common variable immunodeficiency
③ Selective IgA deficiency
④ Severe combined immunodeficiency

5. 18개월 아이가 시행한 Serum specific IgE test 결과가 다음과 같다. 이후 시행할 처치로 가장 적절한 것은?

Total IgE 400 IU/mL 계란 Class 3, 우유 Class 4

① 식품유발 검사 하고 결정
② 피부반응 검사 시행
③ 계란과 우유 둘다 먹이면 안됨
④ 계란과 우유 둘다 먹여도 됨
⑤ 계란은 먹여도 되지만 우유는 먹이면 안됨

6. 생후 20개월 된 남아가 발열을 동반한 호흡곤란과 쌕쌕거림으로 왔다. 과거력으로 아토피성 피부염이 있었고 가족력에서 어머니가 알레르기비염이 있었다. 이전에도 쌕쌕거리는 증상 있어 1-2회 병원 내원했었고 세기관지염 진단 받았었다. 가장 적절한 치료제는?
Lab: 호산구, IgE 상승
① 항히스타민제
② SABA 흡입기
③ 경구 스테로이드제
④ 국소 항생제


7. 12개월 영아가 예방접종 받으러 내원하였다. 과거력 상 3개월 전 가와사키 병 진단 받고 IVIG + aspirin 투여하였다. 다음 중 미뤄야 되는 예방 접종은?
① Hib
② 인플루엔자
③ DTaP
④ MMR
⑤ HAV

8. 생후 10일 된 신생아가 수유 중 입술 주위에 청색증이 관찰되어 병원에 왔다. 신체 검진 상 작은 아래턱과 입천장갈림증 관찰되었다. 심음 청진 상 복장뼈 왼쪽 아래 가장자리에서 3/6도의 범수축기 심잡음이 들렸으며, 심초음파 검사에서 팔로네징후가 확인되었다. 환아의 혈액검사 결과가 다음과 같을 때, 가장 의심되는 질환은?

혈색소 13.5 g/dL, 백혈구 9,600/mm^3, 혈소판 450,000/mm^3 혈청 포도당 95 mg/dL, Na/K 135/3.9 meq/L 총 칼슘 5.5 mg/dL (참고치 7.0~12.0) 인 9.5 mg/dL (참고치 4.8~8.2) CRP 0.8 mg/dL

① DiGeorge syndrome
② Wiskott-Aldrich syndrome
③ Chediak-Higashi syndrome
④ Severe combined immunodeficiency, SCID
⑤ X-linked agammaglobulinemia

9. 14세 남아가 내원했고, 아래와 같은 EKG 소견을 보였다. 다음 중 EKG 소견과 그에 대한 설명이 적절한 것을 고르시오.



① 1도 방실차단: 심각한 심혈관계 합병증을 일으킬 수 있기 때문에 응급 치료가 필요하다.
② 2도 방실차단, Mobitz type I: 증상이 없다면 대부분 특별한 치료가 불필요하며 경과 관찰한다.
③ 2도 방실차단, Mobitz type II: 예후가 양호하므로 심박동기 삽입 없이 경과 관찰해도 괜찮다.
④ 완전방실차단: 심근염이 발생할 수 있지만, 일반적으로 예후가 좋아 경과 관찰해도 괜찮다.
⑤ PSVT: 급성기 치료로 Adenosine 정맥 주사가 필요하다.

10. (Y) 7세 남자 아이 키 작다고 내원했다. 키 117cm (1백분위수), 몸무게 20.4kg (10백분위수)였다. 1년에 4cm씩 컸다. 뼈연령은 5세였다. 복부 비만이 있었다. 아버지 185cm, 어머니 162cm이고 갑상선호르몬 기능검사 정상이었다. 다음 해야 할 확진 검사는?
① 금식 후 성장호르몬 농도 측정
② 수면 중 성장호르몬 농도 측정
③ 인슐린 투여 후 성장호르몬 농도 측정
④ 금식 후 IGF-1 농도 측정
⑤ 운동 후 IGF-1 농도 측정

11. (Y) 13 세 여아 키 작다고 내원했다. 키 10 백분위, 체중 10 백분위였으며 1년에 6cm 컸다. 뼈연령은 10세이고 Tanner stage 2단계. 아버지 키 175cm, 어머니 키 160cm 이다. 아버지는 키가 고등학교 때 많이 컸다고 하였고 어머니는 초경 16세였다. 진단은?
① 체질성 성장지연
② 터너증후군
③ 쿠싱증후군
④ 가족성 저신장
⑤ 성장호르몬 결핍증

12. (Y) 모유 영양에 관하여 적절한 것은?
① 조기 모유 황달시 모유수유를 지속한다.
② 초유에는 평소 모유보다 더 많은 지방이 함유되어있다.
③ 모유의 지방 함량은 우유보다 많다.
④ 모유의 단백질은 주로 casein이다.
⑤ 완전 모유 수유시 2개월부터 철분을 보충해줘야 한다.

13. (Y) 소아 만성 기능성 복통 증후군에 대해 옳은 것은?
① 주로 아침에 아프다.
② 주로 설사를 동반한다.
③ 일상생활 (학교수업 등)을 할 수 없을 정도로 아프진 않다.
④ 주로 6세 이후에 흔하다.
⑤ 주로 상복부 통증을 호소한다.

14. 유아 소화기 질환에 관해 옳은 것은?
① 4개월 아이에게 salmonella 대변에서 검출되면 항생제 준다.(혈액/소변검사 음성)
② Giardia 걸리면 설파제 준다.
③ IV hydration 3일간 주고 아이의 mental이 돌아오면 WHO ORS 입으로 먹게 한다.
④ 10kg에서 9kg 됐는데 소변 안 나오면 ORS 500ml 줘야 한다.
⑤ 1일 10회 이상 설사하면 장운동억제제 준다.

15. 39주 태어난 2세 아이가 구토를 주소로 내원했다. 구토는 점점 심해졌고 초록색이었다. 아이가 쳐지지는 않았다. X-ray가 다음과 같을 때, 의심되는 질환과 치료를 적절하게 연결한 것은?



(Double bubble sign X-ray)

① Duodenal atresia - surgical repair
② HPS - feeding 지속
③ NEC - NPO & 항생제
④ Colon intussusception - surgery

16. (Y) 5세 남아가 장염에 걸린 후 점점 다리를 움직이기 힘들어해 내원했다. 오후에 더 심해지더니 서 있기를 힘들어했다. 다리 심부건 반사가 저하되어 있었다. 수액치료를 했지만 증상이 더 심해졌다. 적절한 치료는?

뇌척수액 검사 : 압력 150mmH2O, 단백질 90 적혈구 0 백혈구 0 Lab 정상

① IVIG
② Steroid
③ 경과관찰
④ 급속 수액치료 후 귀가
⑤ IV mannitol

17. (Y) 터너증후군 환아 사진 및 염색체 검사 결과 (XO) 제시되었다. 설명으로 옳은 것은?
① 골연령과 역연령이 같다.
② 성장호르몬 자극검사를 하면 peak GH가 낮다.
③ 사춘기 급성장이 정상적으로 나타난다.
④ 성장속도가 6cm/1년이다.
⑤ 출생 시 체중이 정상보다 크다.

18. (Y) 생후 8일된 남자 아이가 신생아 선별 검사에서 갑상선 자극 호르몬 수치가 높아서 시행한 갑상선 기능 검사 결과가 다음과 같았다. 원인으로 가장 흔한 것은?

트라이아이오도티로닌: 100 ng/gL (75-260) 유리 티록신: 0.3 ng/dL (0.9-2.6) 갑상선 자극호르몬: 58 uU/mL (0.5-6.5)

① 딴곳 갑상샘
② 갑상샘 무형성
③ 효소 결핍
④ 만성 림프구성 갑상선염

19. (Y) 10세 남아 2시간 전 의식이 소실된 상태로 발견되어 응급실에 실려 왔다. 2주 전부터 소변을 자주 봤고 4일 전부터 배가 아프고 토하였다고 한다. 혈압 100/60 mmHg, 맥박 110회/분, 호흡 26회/분, 체온 37.3℃이다. 혀와 구강 점막이 말라있다. 복부 압통은 없다. 검사 결과는 다음과 같다. 진단은?

혈액: 백혈구 10,000/mm3, 혈색소 12.0 g/dL, 혈소판 260,000/mm3, 혈액요소질소/크레아티닌 25/1.5 mg/dL, 포도당 400 mg/dL, 케톤 1100 mg/dL, Na+/K+/Cl- 122/3.4/89meq/L 동맥혈가스(대기호흡): pH 7.1, HCO3- 5meq/L

① 당뇨병성 케톤산증
② Glycosuria
③ RTA
④ Hyperosmolar nonketoacidic state

20. 3일 전부터 기침, 콧물 있었던 3세 남아가 엄마랑 함께 내원하였다. 최근에 베트남 여행을 갔다 2일 전 한국으로 귀국했다 하며 1일 전부터 입에 하얀 반점과 결막 충혈 소견 동반됐다. 8개월 동생과 같이 거주중이고 형과 동생은 나이에 맞게 기본 예방 접종 모두 완료하였다. 동생은 증상이 없다. 동생에게 시행해야 하는 처치는?
① 예방접종
② 항바이러스제
③ 항생제
④ 면역글로불린
⑤ 경과 관찰

21. (Y) 10세 소아가 뱀에 물렸다. 올바른 것은?

① 파상풍 예방 접종 맞아야한다

② 독이 있는 뱀과 없는 뱀은 이빨자국으로 구분할 수 없다.

③ 우리나라는 항응고와 항혈전보다 신경독성이 있는 독이 많다

④ NSAID

⑤ 얼음찜질이 도움이 된다.

22. (Y) 영유아 호흡기 특징으로 옳은 것은?

① 2세에 성인 호흡으로 전환된다

② 상기도 안지름은 크고 후두개는 작다

③ 성인에 비해 점액샘 밀도가 낮아 분비가 적다

④ 연골이 잘 발달되어 있어 협착이 잘 안된다

⑤ 늑간근의 제 2 연축섬유가 많아 지속적 호흡에 유리하다

23. (Y) 재태연령 28주, 1.4kg로 태어난 신생아로, 청색증과 호흡곤란, 흉벽 당김이 있다. 영상 소견의 경우 다음과 같다. 다음 질환의 병태생리 중 틀린 것은?



① 폐 표면장력이 감소되어 있다

② 폐 순응도(Compliance)가 감소되어 있다.

③ 일정 압력(Pressure)당 폐공기량(Volume)이 감소되어 있다.

④ 폐 표면활성제의 부족으로 무기폐가 생긴다.

⑤ 분만에 비해 C/sec하는 경우 더 많이 발생한다.

24. (Y) 아나필락시스에 관하여 옳은 것을 고르시오.

① 응급조치로 H2 antagonist를 정맥주사한다.

② 응급조치로 epinephrine을 정맥주사한다.

③ 소아청소년과 병원 외에 대표적 원인은 식품이다.

④ 피부, 점막 증상이 있어야 진단할 수 있다.

⑤ 혈압 저하가 있어야 진단할 수 있다.

25. 13세 여아가 매년 환절기때마다 생기는 코가려움, 코막힘, 재채기, 콧물, 훌쩍거림, 눈가려움 증상을 주소로 왔다. 어려서 아토피 피부염을 앓았으며 어머니가 어렸을 때 천식을 앓았었다고 한다. 혈액 검사는 다음과 같았다. 환자의 코막힘에 대해 처방할 약은?

호산구 1000/mm3, 혈청 IgE 570 IU/mL

① 스테로이드 국소 분무제

② 경구 테오필린

③ 항생제


④ 전신 스테로이드제

⑤ 흡입 스테로이드제

26. (Y) 5세 남아가 상기도 감염이 있은지 며칠 뒤 경련, 두통, 구토를 호소했다. 다음은 촬영한 CT 사진이다.

BP 110/80, BT 38.1, RR 20, HR 80

가장 적절한 진단명은?



① 급성파종 뇌척수염 (ADEM)

② Sturge-Weber syndrome

③ Moyamoya disease

④ 부신백색질장애

27. (Y) 7세 여아 유방 발달로 내원. 뼈나이 7세, 유방 태너 2단계, 음모 태너 1단계. 진단은?

① 정상 사춘기


② 진성 성 조숙증

③ 조기 음모 발생

④ 조기 유방 발육

⑤ 사춘기 지연

28. (Y 변형) 평균 기도압력을 높이는 방법으로 2에 해당하는 방법은?



① 흡기 유속 증가
② 최대 흡기 압력 증가
③ 호흡 횟수 변경 없이 흡기 시간을 연장시킨다
④ 호기말 양압을 증가시킨다
⑤ 호기 시간을 줄여서 인공환기의 환기수를 증가시킨다

29. (Post test Y) 아래 chest X-ray에 관한 설명으로 옳은 것은?



① 오른쪽 옆으로 누워 촬영하였다.
② 좌측 pleural effusion이 있다.
③ 기관 삽관되어 있다.
④ 우측 폐에 기흉이 있다.

30. (Y) (소아 CXR 주어짐) 다음 중 사진에서 보이지 않는 것은?
① Arterial line
② Foley catheter
③ Central venous catheter
④ Gastric tube
⑤ Endotracheal tube

31. 생후 2일 환아. 반복적 무호흡으로 desaturation event 다수 있었으며 건드리면 숨을 쉬는 것이 확인되었다. 환아의 무호흡에 대한 처치로 올바르지 않은 것은?
Lab 모두 정상으로 제시됨.
① PPI
② caffeine citrate
③ gentle tactile stimulation
④ monitoring 강화
⑤ CPAP

32. (Y) 임신 27주에 ROM, labor 있어 산모가 제왕절개를 했다. 생후 1분에 심박수 50, 호흡 없고, 온몸이 창백했으며, 사지 늘어져 있고 카테터 자극에 반응 없었다. PPV 후 생후 5분 심박수 110, 호흡 느리고 불규칙해졌다. 1분 apgar score는?
① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

33. (Y) 만삭아. 5분 Apgar socre 점수는?

심박수 50, 손발 청색, 사지 굴곡, 카테터 반응 없음, 호흡 느리고 불규칙

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

34. 생후 12시간 아이가 몸이 노랗게 변하였다. 검사결과는 다음과 같을 때, 추청되는 원인은?

Direct bilirubin 0.2 total bilirubin 17.8 Hb 8.0

① 용혈 황달
② 생리적 황달
③ 조기 모유 황달
④ 모유 황달
⑤ 담도 폐쇄

35. (Y) 39주, 2,400g, 키 49cm, 두위 34cm의 환아가 비대칭 적으로 성장하였다. 원인으로 흔치 않은 것은?

① 선천성 풍진

② 산모의 만성적인 고혈압

③ 산모의 만성적인 합병증을 동반한 당뇨

④ 산모의 임신 말기 영양결핍

⑤ 임신 중 전자간증 Calcium

36. 산모가 HBsAg+ 인데 preterm으로 아기 1700g를 낳았다. 필요한 처치로 가장 적절한 것은?

① 태어나자 마자 IVIG 준다.

② 생후 12시간 이내에 IVIG와 vaccine을 동시에 투여한다.

③ 퇴원 후 예방접종한다

④ 나머지는 말도 안되는 것들

37. 6개월 된 남아가 8주 이상 지속되는 심한 가려움증과 홍반, 인설을 동반한 습진성 피부질환을 주소로 왔다. 병변은 아래 사진과 같이 볼과 발목, 발등쪽에 있었으며 심하게 긁어 딱지가 생겨 있었다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 다음 중 환자의 치료로 적절한 것은?



① 국소 부신피질스테로이드

② 국소 면역조절제

③ 국소 항생제

④ 경구 항히스타민제

38. 신생아 열손실 요인은?

① flexion posture

② large head-to-body ratio

③ High surface area-to-weight ratio

④ a lot of brown fat

⑤ thick subcutaneous fat layer

39. 임신 과정에서 문제 없었던 산모에서 태어난 신생아 경련중이었다. 혈액검사 수치는 다음과 같다. 다음으로 해야할 처치는?

Glucose 28 Mg 2.0 Ca 9.2

① Dextrose 10% Bolus

② 경과관찰

③ MgSO4

④ PO Calcium

40. 24개월 환아가 부모와 함께 내원했다. 아이는 두 단어를 붙여 말할 수 있었고 혼자 걷거나 뛰지는 못하였다. 물건으로 탑을 쌓고 놀았고 엄마의 행동을 따라하였다. 아이의 발달 상태는?

① 전반적 발달 장애

② 운동 발달 장애

③ 언어 발달 장애

④ 정상