<2019 본3 학년말고사 – 신경과->

야마 50-60%. 기존 야마에서 변형되어 나오는 문제들도 있었음. 말초신경 쪽 문제에서 모두 고르시오 형태로 선지가 많이 나와서 복원 정확하지 않습니다.

총 38문제 중 38문제 복원

1. Reversibile cerebral vasoconstriction syndomre의 치료제로 적절한 것은?

   A. Nimodipine

   B. Magnesium IV

   C. Prednisolone

   D. Atenolol

   E. Telmisartan

2. GBS(Guillan-Barre syndrome)에 대해 옳은 것은?

   A. 가족력이 있는 것으로 알려져 있다.

   B. 신경전도검사에서 신경전도속도가 감소할 수 있다.

   C. acute onset이고, 양측의 proximal motor weakness가 나타난다.

   D. CPK와 같은 효소가 상승한다.

   E. 가장 흔한 아형은 AMSAN(Acute motor sensory axonal neuropathy)이다.

3. 50세 여자가 사지위약감을 주소로 내원하였다. 내원 수일 전 독감예방접종을 하였으며 위약감은 사지에서 몸통으로 진행하였다고 한다. 심부건반사는 감소하였으며 내원 당일 오후 숨 쉬기 힘들다고 하였다. 아래 환자의 질환 중 옳은 것은?

   ㄱ. CSF study에서 WBC > 70개/mm^3이다.
   ㄴ. CSF study에서 protein 100mg/dL 정도이다.
   ㄷ. 고용량 스테로이드가 treatment of chocie이다.
   ㄹ. 호흡근이 마비될 수도 있으므로 산소포화도를 monitoring하고 동맥혈검사를 시행해야 한다.
   ㅁ. ganglioside 항체와 관련이 있다.
   ㅂ. 안면마비, 안검하수가 있을 때에는 tensilon test를 시행한 후 경과가 호전되는 지 봐야 한다.

   A. ㄴㅁㅂ

   B. ㄴㄷㄹㅂㅁ

   C. -

   D. -

   E. -

4. Neglect syndrome에서 나타나는 증상이 아닌 것을 모두 고르시오.

   A. Anosognosia

   B. Asomatognosia

   C. Acalculia

   D. Finger agnosia

   E. Sensory extinction

5. dizziness, palpitation, blurred vision, faintness 증상으로 내원 schellong test 진행, 3분 후 130/80 HR 70에서 110/60 HR80 됨. 진단은?

   A. Orthostatic hypotension

   B. ____ tachycardia

   C. Neuromyotonia

   D. Vasovagal syncope

   E. Drug-induced autonomic failure

6. PKD(Paroxysmal kinesigenic dystonia)의 특징으로 옳지 않은 것은?

   A. 치료 시 반응 안 좋다.

   B. 남자에서 여자보다 흔하다.

   C. 치료는 phenytoin, Carbamazepine 등 AED를 쓴다.

   D. 증상의 지속시간은 수초~5분이내이다.

   E. 갑작스런 움직임, 놀람 등으로 유발된다.

7. 다음 부위 질환에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르시오? (NMJ 가리키는 그림)

   ㄱ.약물에 의해 악화된다.

   ㄴ.흉선 수술 해야 할 수 있다.

   ㄷ.ICE cube test 하면 되는거라 진단 자체는 간단하다.

   ㄹ.악화와 완화를 반복하는 질환이다.

   ㅁ.자가면역 질환으로 NMO를 검사한다.

   ㅂ.

   A. ㄴㅁㅂ

   B. ,

   C. ,

   D. ,

   E. ,

8. 일차성 두통의 가능성이 가장 높은 것은?

   A. 갑자기 발생한 심한 두통

   B. 50세 이후에 처음 발생한 두통

   C. 신경학적 증상이 동반된 두통

   D. 생리 전후로 발생하는 두통

   E. 발열이 동반되는 두통

9. Peripheral vertigo의 특징으로 맞는 것은?

   A. Alexander law를 따른다.

   B. 이명, 난청 동반 드물다.

   C. Fixation에 의해 고정 잘 되지 않는다.

   D. 보행장애나 다른 신경학적 장애 동반이 흔하다.

   E. 회복이 잘 되지 않는다.

10. (야마)가장 예후가 좋은 호흡은? (부위 그림과 이름 둘 다 있었음.)

    A. Cheyne-stokes

    B. Apneustic

    C. Cluster breathing

    D. Sustained regular hyperventilation

    E.

11. Pons에 infarct 생겼는데, 8시간 전에 자기 전에는 멀쩡했고 1시간 전에 일어났을 때 Left hemiparesia 및 구음장애 생겨 내원하였다. 치료는?

    A. 항혈소판제

    B. 항히스타민제

    C. rTPA

    D. 혈압 조절

    E. 항생제

12. (야마)노랑 CSF에 몇 주간 미열, 두통, 오심 있었고 CSF(Lympho 73%, pmn 27%)이고 사진 네개에서 뇌실질 침범한거.

    A. 결핵성

    B. ㅇ

    C. ㅇ

    D. ㅇ

    E. ㅇ

13. 51세 남성, 쓰러질 것 같은 느낌과 좌측 하지 위약감으로 내원. 체온 36.5 BP 140/110 RR 18/min HR 80. DWI/ADC map 주고 infarct 찾는 소견.

    A. 숨뇌 출혈

    B. 다리뇌 출혈

    C. 다리뇌 경색

    D. 중뇌 출혈

    E. 중뇌 경색

14. 다음 중 NOAC을 쓰는 경우는?
    선지 워낙 복잡하게 나와있어서 자세하게 외우

지 못했으니깐 CHADVASC score 공부하세요.

A. 3년 전 MR replacement 받고, AF 있으며 warfarin 복용하고 있었는데 뇌경색 생김

B. 51세 남자, lacunar infarction 생김

C. 2시간 전 구음장애, left hemiparesia 있어 내원. AF 있음.

D. 2년 전 고혈압 진단 받고 aspirin 먹고 있음.

E. 20대에 모야모야병 진단받아 아스피린 복용하던 여자환자. 45세에 우측 무슨동맥 뇌경색 재발함.

15. 2시간 전 뇌출혈 환자 치료는?

A. tPA

B. 항응고제

C. 항혈소판제

D. 대증요법

E. 로라제팜 정주

16. Essential tremor의 특징이 아닌 것은?

A. 술 마시면 악화된다.

B. 가족력 50% 정도에서 있다.

C. 20대, 50대 bimodal peak

D. postural, action tremor을 보인다

E. 치료약제로 Propranolol과 같은 beta blocker써볼 수 있다.

17. (야마)23세 여자 안면 spasm 있어서 내원. 1년전 부갑상선항진증 진단. 환자가 보일 수 있는 증상으로 옳은 것은?

A. 혈압 잴 때 cuff 감고 확장시키면 감은 쪽 손이 수축

B. 발바닥을 뾰족한 물건으로 쓸어 올릴 때 엄지발가락의 dorsiflexion과 발가락의 fanning

C. 손바닥을 자극시킬 때 mentalis m. 수축

D.

E.

18. 20대 여성. 지하철을 타고 돌아오던 중 갑작스러운 의식소실. 내원 후 신경학적 검사 시행한 결과 우측 안구 편위 및 우측 G4나머지 G5였음. 평소 동아리활동으로 술을 자주 먹고 우울하다는 소리를 많이 함. 치료로 옳지 않은 것은?

A. EEG찍고 antivan 준다.

B. Hyperacute infarction을 의심할 수 있으므로 brain CT 찍은이후 이상 없으면 tPA투여한다.

C. 혈중검사해서 thiamin, naloxone 준다.

D. 우선적으로 뇌영상검사를 시행한다.

19. Central vertigo 특징?

A. 주시 방향 따라 안진 달라지고 보행장애가 심하다.

B. 이명, 현훈, 귀 충만감 동반 잘 된다.

C. 앉았다가 일어나면 mixed torsional nystagmus

D. 감기병력 mixed torsional nystagmus

E. Head impulse 양성?

20. (야마)64/F 상하지 마비증상. 당화 혈색소 8.4인 환자에게 도움이 되는 약을 모두 고른 것은?

가. Pregabalin

나. Gabapentin

다. Carbamazepine

라. Amitryptiline

마. Steroid

바. NSAID

사. Propranolol

21. (야마)목에서 엄지손가락으로 뻗치는 통증, 관련된 dermatome?

A. C5

B. C6

C. C7

D. C8

E. T1

22. (야마)당뇨로 혈당강하제 복용하고 있던 자로 의식저하, 혼수로 내원하였다. 공막 반사, 동공 반사는 정상이었고, Babinski(+), DTR(+)이었다. 환자 앙와위 자세에서 우측 귀에 44도 물 넣었을 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

A. 좌측 안구 편위

B. 좌측 안진

C. 우측 안구 편위

D. 아래쪽 안진

E. 반응 없음


23. (야마)2시간 전에 발생한 좌측 근력 저하, 구음장애, 무시 증후군으로 내원한 환자의 CT 소견이다. 급성 뇌경색 소견. 이 때 가장 필요한 처치는? (주)

tPA

24. (야마)2시간 전에 발생한 좌측 근력 저하, 구음장애, 무시 증후군으로 내원한 환자의 CT 소견이다. 급성 뇌경색 소견. 이 때 해야 할 처치를 몇 시간 내에 해야 하는가?(주)

4.5시간

25. (야마)시야 문제 어디가 문제가 있을까? (양안 모두 왼쪽 반만 보이는 소견, macular sparing 되어 있음. 아래 사진은 lt.와 rt.이 실제 문제와 다름, 시야 검사로 나왔다는 것만 참고.)



A. Optic nerve

B. Optic chiasm


C. Temporal lobe

D. Parietal lobe


E. Occipital lobe


26. (야마)다음 중 해부학적 구조를 가장 잘 판단할 수 있는 영상은? 영상 하나씩 axial view로 주어졌습니다. (아래 영상 순서대로 T1, T2, T2 FLAIR, DWI. 사진은 구글링 한 것)

A.



B.



C. 

D. 

27. (야마) 다음 중 급성 뇌경색을 가장 잘 판단할 수 있는 영상은? (위랑 똑같은 영상).

    A. T1

    B. T2

    C. FLAIR

    D. DWI

28. (야마) 38세 남자, 행동이상, 고열, 혼동을 주소로 내원. 뇌척수액 검사: 압력 180 WBC 17(lym 80%) 포도당 60 단백질 54 혈청포도당 98 적절한 치료는?

    A. Acyclovir

    B. INH, RFP, EMB

    C. Amphotericin

    D. Metronidazole

    E. Dexamethasone

29. (야마) 64세 남자가 1달 전부터 기억력이 나빠진다고 보호자가 데리고 왔 전부터는 헛것이 보인다고 하고 엉뚱한 소리를 했다고 한다. 10년 전부터 고혈압 진단을 받고 약물을 복용 중이었으며 외상 혹은 뇌졸중으로 인한 뇌손상의 병력은 없다고 했다. 직장을 다니는 동안에는 일주일에 1-2회 정도 음주를 했지만 3년 전 은퇴 후부터는 술도 끊었다고 한다. 혈압 120/80mmHg, 맥박수 75회/분, 호흡수 18회/분, 체온 36.5℃ 이었다. 신경학적 검사에서 시야장애와 함께 상방안구운동의 제한이 관찰되었고, 양쪽 특히 오른쪽으로 현저한 경축과 함께 근간대경련이 관찰되었다. 걸을 때 중심을 잡지 못하고 좌우로 흔들리는 보행장애가 관찰되었다.

    A. 혈관성치매

    B. 루이체치매

    C. 알츠하이머

    D. ㅇ

    E. ㅇ

30. (야마) Rhomberg test 관련해서 나온 문제. 어두울 때 쓰러지려고 함. 눈을 감으면 서 있기 어려운데 눈을 뜨면 괜찮음. 어디의 문제인가?

    A. Posterior column

    B. Cerebellum

    C. Vestibular

    D.

31. (야마) 의식저하를 주소로 내원한 여성, 양쪽 안검하수와 눈 움직임 이상, 좌측 마비를 보임, 다음 중 가장 이상이 있을 가능성이 높은 혈관은?

    A. 기저동맥

    B. 전뇌동맥

    C. 후뇌동맥

    D. 중뇌동맥

    E. 내경동맥

32. Idiopathic Parkinson 에서 가장 중요한 임상양상?

    A. Bradykinesia

B. Cogwheel rigidity

C. Resting tremor

D. None of all

E. Postural instability

33. (야마) 표시한 부위 감각 소실. 손상 신경은?



A. Median nerve

B. Ulnar nerve

C. ㅇ

D. ㅇ

E. ㅇ

34. Parietal lobe 문제 있는 MRI 사진 주고, 다음 사진에서 나타나지 않을 것 같은 증상은?

A. Finger agnosia

B. Right-left disorientation

C. Personality change

D. Quarianopia

E. Acalculia

35. (야마) 근위약과 함께 CPK가 상승했다. 원인 질환은?

A. Inflammatory myopathy

B. Lambert Eaton syndrome

C. Steroid induced myopathy

D. Cerebral infarction

E. Brachial plexopathy

36. (야마) Neuromuscular disorder에 관한 설명으로 옳은 것은?

A. ALS의 주된 증상은 tremor와 bradykinesia 이다.

B. Polymyopathy를 일으키는 주된 질환은 교원성 질환이다.

C. Myogenic neuropathy는 neurogenic neuropathy와 달리 증상이 focal하고 fasciculation이 발생한다.

D. Neuromuscular disorder의 positive symptom으로 cramp, twitching, myokimia 등의 motor symptom이 있고 pain, tingling sensation, paresthesia, allodynia 등의 sensory symptom이 있다.

37. Neuromuscular disorder에 관한 설명으로 옳은 것은? .

A. Neuromuscular disorder의 positive symptom으로 cramp, twitching, myokimia 등의 motor symptom이 있고 pain, tingling sensation, paresthesia, allodynia 등의 sensory symptom이 있다.

B. Neurogenic neuropathy는 myogenic neuropathy와 달리 증상이 focal하고 fasciculation이 발생한다.

C. Polymyopathy를 일으키는 주된 질환은 DM

D.

E. All of above

38. CSF 소견 neutrophil dominant , CSF glucose 30mg/dl 적절한 치료의 조합으로 옳은 것은

A: 항생제 B : 항바이러스제 C: 항결핵제 D: steroid E : IICP control

A. ADE

B.

C.