<2021 본 3 학년말고사- 신경과>

총 **50 문제** 중 **48 문제** 복원

전반적인 탈야마. 체감 난이도 어려웠음. KMLE 에서 많이 베껴서 냈음.


1. 한쪽 안검하수 있는 사람, 정면을 보려 하면 오른쪽 눈이 오른쪽 아래로 내려갔다. 동공반사는 정상이었고 양쪽 동공 크기도 똑같음. 당뇨, 고혈압 기저질환으로 있는 사람으로 어떤 신경에 문제가 생겼는가.

- Rt. oculomotor nerve
- Rt. trochlear nerve
- Rt. abducens nerve

2. 젊은 며느리, 으아아악 소리 내어 가족들이 깜짝 놀라 가보니 기절해 있었다. drug toxin test 에서 benzodiazepin 이 양성이 나왔을 때 지금 투여해야 할 약물은?


- flumazenil (답)
- glucose
- thiamine
- methylphenidate
- lorazepam

3. 시야 검사 다음과 같다. 어디에 병변이 있을까.



- 시상
- 뇌하수체
- 송과선


4. 시야검사



어디에 병변? (3 번과 그림이 달랐던 것 같기도 하고 하나는 말로 풀어서 설명했던 거 같기도 해요. 난이도는 어렵지 않았음)

- 시신경 교차로

5. (사진 주고)다음 중 병변이 있는 동맥은?



- ICA
- ECA
- CCA
- Subclavian artery
- Vertebral artery


6. (야마) 70 세 남자가 1 주 전부터 시작된 어지럼증으로 병원에 왔다. 1 년 전부터 오른귀에서 귀울림이 들렸고, 1 주 전부터는 걸을 때 오른쪽으로 쏠리는 증세가 나타났다. 신경학적 진찰에서 안구운동장애는 없었고, 오른쪽 이마주름의 마비가 있었으며 입이 왼쪽으로 돌아갔다. 오른쪽 청력이

감소되었고 롬버그 검사에서 오른쪽으로 넘어지는 경향을 보였다. 병터 부위는?

- 숨뇌
- 중뇌
- 시상
- 이마엽
- 소뇌-뇌다리각

7. 원인이 되는 혈관은?

(medial medullary syndrome)



- Vertebral artery
- AICA
- PICA
- SCA
- Basilar artery


8. 오른쪽 눈을 자극했을 때에는 양쪽 눈 모두 반응이 없었으나, 왼쪽 눈을 자극했을 때에는 양쪽 눈을 모두 감음. 다음 중 문제가 있는 신경은?

- Rt. trigeminal
- Rt. facial
- Lt. facial
- Rt. trigeminal & facial

9. 38 세 남성이 최근에 시야가 불편하다는 주소로 상담을 받으러 신경과에 왔다. 계단을 내려갈 때 발을 헛딛는 경우가 많았고, 한 물체를 볼 때 두개로 보인다고 호소했다. 상담 중 눈을 마주치기 위해 머리가 살짝 왼쪽으로 기울어져 있었고, 아래볼수록 복시 심해진다고 하였다. 어떤 신경의 이상인가?

- Right trochlear nerve
- Right oculomotor nerve
- Left trigeminal nerve
- Left Vestibulocochlear nerve
- Right vagus nerve

10. 10 세 남아가 반복적인 오른쪽 반마비가 있어 병원에 왔다. 어릴 때에는 심하게 울거나 뜨거운 라면을 먹을 때 발생하였다. 최근에는 운동을 할 때 특히 더 심해지는 양상을 보였다.



- 수차례 마비가 나타났고, 이는 10 여분 지속되다가 사라졌다. 자주 두통을 호소하였다.
- 뇌혈관조영사진은 아래와 같다. 알맞은 진단은 무엇인가?
- 모야모야병
- 뇌동정맥기형
- 호흡중지발작

11. 16 세 여자가 반복되는 실신을 주소로 내원하였다.

덥거나 사람이 많은 곳에서 잘 쓰러지고 잘 쓰러지고, 쓰러진 직후 정신이 돌아왔다고 하였다. 전구증상으로 어지럽고 식은땀 흘리고, 몇 초후에 의식 찾는데, 의식 찾고 나면 몸이 떨리거나 뻣뻣해지는 증상 있었다. 이상있을 가능성 높은 검사는?

- Tilt table test
- Holter 심전도
- tensilon test
- Dix hallpike test

12. 16 세 남자 2 년전부터 전날 밤새거나 하면 그 다음날 컵 집으려 할 때 갑작스러운 팔에 경련이 발생하여 컵 깼다. 광자극했을 때에도 마비증상을 보였다. 약물은?

- valproate
- carbamazepine
- f/u
- phenytoin
- phenobarbital

전형적인 Juvenile myoclonic epilepsy 의 증례로 나왔습니다. 답은 전신발작의 TOC 인 Valproic acid 입니다.

13. 25 세 남성 반복되는 의식 소실 및 경련으로 내원하였다. 속에서부터 차오르는 뜨거운 느낌 있었다고 하며, 멍하게 한 곳을 응시하면서 입맛을 다시는 등의 증상이 있었다고 한다. 다음 중 필요한 약물은?

- valproate
- carbamazepine
- phenytoin
- phenobarbital

풀이) complex partial seizure(temporal lobe epilepsy)로 생각되므로 carbamazepine

14. 39 세 남성 3 일 전 부부 관계 후 갑작스러운 두통이 발생했다. 현재는 통증이 나아졌다고 한다. 필요한 처치 두 개 고르시오. (DWI 로 infarction 엄청 심한 영상 주어짐)

- emergent decompression
- 항혈소판
- sumatriptan SQ
- 응급혈전제거술
- NSAID

15. 30 대 남성이 뒷목과 어깨 마사지를 받은 후 발생한 두통으로 내원하였다. 두통은 누우면 호전되고 앉거나 일어서면 악화되었다. 진단은?

- intracranial hypotension
- 척추동맥 박리
- 두개강내 출혈

16. 20 대 남성이 농구하다가 상대 선수에게 오른쪽 어깨를 부딪힌 후에 왼쪽 팔 감각이 잠깐 소실되었다가 돌아왔다. 경동맥 잡음 들림

- 경동맥 박리
- 후교통동맥 동맥류
- 두개강내 출혈
- 전두엽 경색

17. 22 세 여자가 어제부터 다리가 마비되어 걸을 수 없게 되어 병원에 왔다. 1 년 전 오른쪽 눈이 일주일 동안 잘 보이지 않았고, 오른쪽 손이 한 달 간 저린 적이 있었다. 안저검사에서 오른쪽 시신경 위축이 관찰되었다. 양측 하지 근력은 2 등급(grade II), 깊은힘줄반사는 +++/+++이었고, 양발에서

바빈스키징후가 관찰되었다. 감각검사에서 배꼽 이하로 통각 및 진동각이 감소되었다. 진단은?

- 다발경화증
- 선천근육퇴행위축
- 중증근무력증
- 길랑-바레 증후군
- 근육위축가쪽경화증

18. 55 세 여자가 1 주일부터 잠을 잘 못자는 것으로 내원. 말이 어눌해졌고, 침을 흘렸으며 근강직과 떨림을 보였다. 1 개월 전부터 metoclopramide 를 복용하였다. 진단은?

- 파킨슨증후군
- 정좌불능
- 지연성운동장애
- 급성근긴장이상증
- 신경이완제 악성증후군

19. 응급실로 온 환자. 불렀을 때 반응 없고, 통증 자극에도 반응 없는 상태임. 이 환자의 의식 상태는?

- 명료
- 기면
- 혼미
- 혼수
- 섬망

20. 59 세 남자환자가 급성 심근경색으로 치료 중 심장정지가 발생하였다. 약 30 분간 심폐소생술을 받고 정상 박동으로 회복되었으나, 이후 48 시간 동안 혼수상태였다. 조금씩 의식이 돌아와 3 주 후에는 스스로 자고 깨는 상태가 되었고, 입에 물을 흘려 넣어줄 때 마시는 것도 가능하게 되었다. 그러나 가족에게도 아무 반응을 보이지 않고 통증에 대해서도 몸을 조금 움직이는 정도밖에 반응을 보이지 않았다. 이러한 상태는 이후 며칠간 지속되었다. 진단은?

- 뇌사
- 지속 식물인간상태
- 감금증후군
- 뇌염 후 대뇌변동
- 무동무언증

21. 어느날부터 갑자기 의식 떨어져서 내원. 사진을 MR angiography 사진을 하나 주고 뇌 MRI 사진을 하나 줬습니다..이 환자에게서 나타날 수 있는 호흡은? 아마 좌측 MCA infarction 이 나왔던듯..(호흡음 이름을 그대로 주지 않고 호흡 양상 그래프 사진으로 각 선지에 줬습니다.)

- Cheyne stokes
- Central neurogenic hyperventilation
- Apneustic breathing
- Cluster breathing
- Ataxic breathing

22. 51 세 비만인 남자 환자가 자꾸 일과 중에 운전하다가 졸아서 이를 해결하기 위해 내원. 환자 AHI<50, 환자 가족이 봤을 때 잠버릇이 많이 안좋았다고 하고 이미 이에 대해서 금주, 비만 치료 등을 진행하고 있는데 현재 상황에 대한 급성기 치료로 옳은 것은?

- CPAP
- Ativan
- Flumazenil
- O2
- Phenobarbital

23. 52 세 여자가 10 일전부터 시작된 설사, 복통, 몸살, 운동마비를 주소로 내원하였다. 양쪽 다리에서 양쪽 팔로 진행하는 양상으로 운동마비, 허리통증이 발생하였고 의식은 명료하였으며 감각신경은 정상이었다. 대소변 기능에는 이상이 없었다. 가장 의심되는 질환은?

- 급성횡단척수염
- 신경매독
- 중증근무력증
- 길랑바레 증후군
- 피부근염

24. 20 분간 경련해서 응급실로 내원한 여자. 해당 여성에게 급성기로 해줘야하는 두가지 치료 고르시오.

- lorazepam
- diazepam
- alprazolam
- epinephrine
- propofol

25. Decerebrate position 의 환자가 있다. 안구반사 및 VOR (-), 구역반사는 있고, 호흡음 불규칙하며, 동공 6mm 로 양쪽 모두 산동되어있다. 어떤 부위의 손상일지 고르시오.

- diencephalon
- midbrain
- cerebral cortex
- pons
- medulla

26. 환자에게 자극줬더니 양쪽 팔은 굽히고, 다리는 쭉 펴는 모습을 보였다. 양쪽 동공은 모두 0.3mm 였으며, 안구 반사도 정상이었다. 환자의 호흡이 깊었다가 무호흡이었다가를 반복하는 모습을 보였다. 어떤 부위의 손상일지 고르시오.

- diencephalon
- midbrain
- cerebral cortex
- pons
- medulla

27. 환자가 언젠가부터 성격이 변했고, 사소한 일에도 쉽게 화를 내기 시작했으며, 최근에는 손주를 보고 이름을 까먹는 일이 일어났다. 해당 환자 치료는?

- donepezil
- phenytoin
- phenobarbital

28 (야마) 73 세 남자가 약 10 개월 전부터 갑자기 말수가 적어지고 기억력이 저하된다고 보호자와 왔다. 20 년 전 고혈압으로 진단받고 약물치료 중이었고, 10 년 전 뇌출혈과 1 년 전 뇌경색 진단을 받고 약물치료중이다. 기억력저하와 함께 시간과 장소를 엉뚱하게 말하기도 하고, 한 달 전부터는 갑자기 더 나빠져서 독립적인 일상 생활이 힘들어졌다고 보호자가 말하였다. 혈압 140/85mmHg, 맥박수 75 회/분, 호흡수 18 회/분, 체온 36.5'c 이었다. 신경학적검사에서 오른족 팔과 다리의 근력이 저하되어 있었고 MRC grade IV/IV, 깊은 힘줄 반사는 증가되어 있었으며 오른쪽 다리에서 바빈스키 징후가 관찰되었다. 발음할 때 조음장애가 관찰되었다.

- 혈관성 치매
- 전두측두치매
- 루이체 치매
- 알츠하이머

29. 60 대 여성이 의식저하로 병원 내원하였다. 10 년 전부터 당뇨병으로 혈당강하제를 복용중이었다. 대광반사 정상, 양쪽 동공 크기 3mm 로 같았다. 전정안구반사 정상이었다. 환자가 심리학적인 문제로 나타났고 신경학적인 문제는 없다고 하자. 이 환자에서 오른쪽 귀에 44'C 의 물을 넣었을 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- 좌측 안구 편위, 우측 안진
- 우측 안구 편위, 좌측 안진
- 좌측 안진
- 우측 안구 편위

30. (야마) 76 세 남자가 1 년전부터 보폭이 좁아졌다며 병원에서 왔다. 9 개월 전부터 파킨슨병이 의심되어 약물치료를 받았으나 효과가 없다고 한다. 6 개월 전부터 요실금이 나타났다. 학력은 고등학교 졸업이며 간이정신상태검사 (MMSE)는 16 점이다. 걷기 시작할 때 발바닥이 땅바닥에 붙은 듯 출발을 제대로 못한다.

걸을 때 보폭은 좁지만, 양다리의 근력 저하는 없다. 진단은?

- 정상압수두증

31. (야마) 64 세 남자가 1 달전부터 기억력이 나빠진다고 보호자가 데리고 왔다. 1 주 전부터는 헛것이 보인다고 하고 엉뚱한 소리를 했다고 한다. 10 년 전부터 고혈압 진단을 받고 약물을 복용 중이었으며 외상 혹은 뇌졸중으로 인한 뇌손상의 병력은 없다고 했다. 직장을 다니는 동안에는 일주일에 1~2 회 정도 음주를 했지만 3 년 전 은퇴후부터는 술도 끊었다고 했따. 혈압 120/80mmHg, 맥박수 75 회/분, 호흡수 18 회/분 체온 36.5 도이었다. 신경학적 검사에서 시야장애와 함께 상방안구운동의 제한이 관찰되었고, 양쪽 특히 오른쪽으로 현저한 경축과 함께 근간대 경련이 관찰되었다. 걸을 때 중심을 잡지 못하고 좌우로 흔들리는 보행장애가 관찰되었다.

- 루이소체 치매
- 알츠하이머 치매
- 혈관성 치매

32. 교감신경 활성화의 예로 옳은 것은?


- 땀분비
- 침샘분비
- 축동

33. 기저질환으로 고혈압, 당뇨 있는 환자가 극심한 두통으로 내원하여 촬영한 CT 이다. 치료는?



- 대증적 치료
- 항혈소판제
- 항응고제
- tPA

34. SAH(사진으로 주어짐)의 자발적 원인으로 가장 흔한 것은 무엇인가?



- aneurysm
- trauma
- infection

35.(야마) (세균성 뇌수막염) 발열, 뇌막자극 증상 있고 의식 처지는 환자, CSF 검사 결과는 다음과 같다.
백혈구 500(PMN 90%), 단백질 300, 포도당 3(혈당 110) 1 차적으로 할 수 있는 치료는 무엇인가?

- ceftriaxone
- vancomycin
- ciprofloxacin
- acyclovir
- amphotericin B

36. (야마) 45 세 남자가 3 일 전 발생한 38.5 도의 발열과 두통, 하루 전 발생한 경련과 의식혼미로 내원하였다. EEG 에서 temporal lobe spike and slow wave complex 소견이 보였다. 뇌막자극 증상 있으며 CSF 검사 결과는 다음과 같다.
백혈구 100(림프구 80%), 포도당 65(혈청 포도당 110) 치료는 무엇인가?

- acyclovir
- amphotericin B
- cefotaxime
- ceftriaxone

37. 보호자와 함께 내원한 환자가 계산을 잘 못하고, 왼쪽 오른쪽 구분을 못한다며 병원에 내원했다. (비우성반구에서의 Gerstmann syndrome 증상) 이 사람이 이상이 있는 부위를 고르시오.

- Frontal lobe
- Temporal lobe
- Parietal lobe
- Occipital lobe

38. (야마) 64 세 여자가 지난 석 달간 허공을 멍하게 응시하고 잘 넘어지고 몸동작이 매우 느려지고 우울해졌다고 한다. 진찰실로 들어올 때 환자는 몸을 굽힌 자세로 발을 질질 끌며 걸었다. 혈압은 누워서 측정하였을 때 150/100 mmHg, 서서 측정하였을 때 110/80 mmHg 이었고, 팔은 경직되어 있었으며 안정시 진전(resting tremor)이 있었다. 다음 중 어느 부위의 병변이 있을 때 이와 같은 질환이 나타나는가?

- 조가비핵
- 흑색질
- 창백핵
- 시상하부
- 미상핵

39. (야마) 다음 중 중추성 안진을 시사하는 소견은?

- 아래보면 아래쪽으로 안진이 심해진다.
- Frenzel glass
- 시선 고정하면 억제된다.
- 어디봐도 심해진다.
- 이명과 난청을 동반한다.

40. 조선소 일하는 사람이 손목 앞쪽의 통증을 느껴 병원을 찾았다. Tinnel sign 보였으며, 평소 일하는 곳에서 진동에 많이 노출되지는 않는다고 한다. 이 사람의 진단으로 올바른 것을 고르시오.

- carpal tunnel
- 수완진동 증후군
- Compartment syndrome
- 레이노 증후군

41. 10 세 여아가 몇 달전부터 눈꺼풀을 못 드는 증상이 있었으며, 증상은 오전보다 오후에 더 심해졌고, 누워서 고개를 들고 있으라 하면, 오래 버티지 못하고 고개를 떨어뜨렸다. 손으로 주먹 쥐었다 폈다하는 동작에도 금방 지쳤다고 한다. 진단으로 올바른 것?

- 중증근무력증
- GBS
- 근위축증
- 사립체근염

답논란. 근위축 or MG 로 갈림

42. Y. 1 시간 전에 근력저하, 구음 장애등 증상 나타나 응급실로 내원한 환자. 응급실에서 시행한 검사상 EKG 정상으로 이때 가장 필요한 처치

- IV tPA
- aspirin
- IV heparin

43. 40 대 남성이 매년 1-2 개월동안 집중적인 두통발작을 경험하였다. 결막은 충혈 되었으며 두통이 느껴질 때 눈물과 콧물이 동반된다고 한다. 가장 가능성이 높은 질환은?

- 군발성 두통
- 삼차신경통
- 편두통
- 긴장성 두통

44. 중년 여성이 우측 턱뼈와 입술 위가 아프다고 내원하였다. 양치하거나 웃거나 음식을 씹을 때 하루에 약 15 회, 수 초에서 수십 초 간 아프다고 한다. 가장 가능성이 높은 질환은?

- 군발성 두통
- 삼차신경통
- 편두통
- 긴장성 두통

45. (Y) 27 세 직장 여성이 3 년 전부터 시작된 두통을 주소로 내원. 두통은 한달에 6 회 정도 35 분씩 지속되며, 오른쪽 측두부위에 국한된 박동성의 두통이었다. 두통전에 섬광암점이 있고, 두통, 구역, 구토 증상이 동반되었다. 어머니와 언니가 비슷한 증상을 보였다고 한다. 신경학적 검사, CT, 단순 두개 경추촬영와 뇌파는 정상소견을 보였다. 천식을 앓고 있다고 한다. 이 질환의 예방을 위해 적절한 것은?

- 적포도주를 마신다.
- 베타 차단제를 복용한다.
- 피로 회복을 위해 주말에 늦잠을 잔다.
- 규칙적인 일상생활

46. 중년 남성. 싸우는 꿈을 꿨는데 꿈 속에서 한 행동을 실제로 자면서 하여 배우자의 팔을 쳐 배우자가 맞았다고 한다. 이 환자에게 해야 할 검사는?

- 수면다원검사
- 뇌파검사
- 뇌 CT
- 뇌척수액 검사

47. 70 세 여성이 수영 강습을 받던 중 "여기가 어디지" 등 혼란스러워하는 모습을 보여 주변 사람들이 걱정했다고 한다. 이후 환자는 이 상황에 대해 기억하지 못한다고 한다. 가장 가능성이 높은 질환은?

- TIA
- TGA

48. (KMLE) 29 세 여자가 갑자기 시작된 두통, 구토 및 배뇨장애로 병원에 왔다. 3 주전 정상 분만을 하였다. 평소 건강하였으며 화 낼 줄 모르는 성격이었는데 쉽게 화 냈다. 신경학적 검사에서 오른쪽 다리에 가벼운 근력 저하가 관찰되었다. 뇌 손상 부위는?

- Frontal lobe
- Parietal lobe
- Temporal lobe
- Occipital lobe
- Cerebellum