<2022 본 3 학년말고사-신경과>


총 **50 문제** 중 **47 문제** 복원

거의 대부분 학년말 야마 탔습니다.

1. 한쪽 안검하수 있는 환자로, 고혈압과 당뇨를 기저질환으로 가지고 있다. 환자가 정면을 보았을 때 오른쪽 눈이 오른쪽 아래로 내려가 있는 것을 관찰 할 수 있었다. 어떤 신경에 문제 생겼는가?

- **Rt. oculomotor n.**
- Rt. trochlear n.
- Rt. abducens n.
- Lt. oculomotor n.
- Lt. trochlear n.

2. 시야 검사 결과가 다음과 같을 때 어디에 병변이 있다고 할 수 있는가?



- 시신경
- **시신경 교차로**
- 마루엽 (Parietal lobe)
- 관자엽 (Temporal lobe)
- 뒤통수엽 (Occipital lobe)

3. 50/F, 시야가 좁아지는 증상으로 병원 내원. 시력 검사 결과 양안 1.0, 시야 검사 결과 Bitemporal hemianopsia 소견으로 미루어 보았을 때 환자는 어디에 병변이 있다고 할 수 있는가?

- 시상
- 뇌교
- 중뇌
- **뇌하수체**

4. 73/M, 1 분 동안 정신을 잃고 쓰러진 뒤 깨어남. 환자의 사진 검사 상 아래와 같은 병변이 있을 때 병변의 위치는 어디인가? (선지 한국어였던 것 같음. ICA = 속목동맥)





(최대한 비슷한 사진, Mandible 도 보이는 사진이었고, 화살표는 없음)


- **ICA**
- ECA
- CCA
- Subclavian a.
- Vertebral a.

- **Vertebral a.**
- AICA
- PICA
- SMA
- Basilar a.

5. 70/M, 1 주 전부터 시작된 어지러움증으로 병원 내원. 1 년 전부터 오른 귀에서 귀울림이 들렸고, 1 주 전부터는 걸을 때 오른쪽으로 쏠리는 증세가 나타났다. 신경학적 진찰에서 안구운동장애는 없었고, 오른쪽 이마주름의 마비가 있었으며 입이 왼쪽으로 돌아갔다. 오른쪽 청력이 감소되었고 롬버그 검사에서 오른쪽으로 넘어지는 경향을 보았을 때 환자의 병터는 어디인가?

- 숨뇌
- 중뇌
- 시상
- 이마엽
- **소뇌-다리각**

6. 사진 상 다음과 같은 결과가 나왔을 때 원인이 되는 혈관을 고르시오.



7. 오른쪽 눈을 자극했을 때에는 양쪽 눈 모두 반응이 없었으나, 왼쪽 눈을 자극했을 때에는 양쪽 눈을 모두 감았다. 문제가 있는 신경을 고르시오.

- **Rt. trigeminal n.**
- Rt. facial n.
- Lt. trigeminal n.
- Rt. trigeminal & facial n.
- Lt. trigeminal & facial n.

8. 63/F, 의식 저하로 응급실에 내원. 불렀을 때 반응이 없었고 통증 자극에도 반응이 전혀 없었다. 이 환자의 의식 상태는 무엇인가?


- 명료
- 기면
- 혼미
- **혼수**
- 섬망

9. 35/M, 갑자기 발생한 심정지를 주소로 내원한 환자. 내원한 지 6 개월이 지났으며, 내원 당시 25 분 간의 심폐소생술 끝에 심박동이 돌아왔다. 이후 환자 의식 지금까지 혼수상태이며 의사소통이 불가능하다. 환자의 뇌줄기 반사 및 자율 신경

반사는 정상이고, 환자의 수면-각성 주기가 유지되는 상태라고 할 때 진단은 무엇인가?

- 뇌사
- **식물인간 상태**
- 무동무언증
- 가성혼수
- 최소 의식상태

10. 53/F, 좌측 중뇌동맥 경색으로 인해 병원에 내원한 환자. 입원 3 일 후 갑작스럽게 의식 저하가 발생하였다. 신경학적 진찰 결과 좌측 동공이 확대되었으며 그와 함께 호흡의 양상도 변화하였다. 환자에게 나타날 수 있는 호흡의 양상을 고르시오.



(답 2 로 추정)

11. 25/F. 갑자기 멍해진 것을 주소로 내원. 말 싸움을 하다가 갑자기 이러는 경우가 있다고 한다. 신경학적 진찰 결과 대광반사 정상, 양쪽 동공 크기는 3mm 로 같았으며 전정안구반사 정상 소견을 보였다. 신경 영상에서도 특별한 소견이 관찰되지 않았다. 환자가 신경학적 문제가 아닌 심리적 문제로 해당 증상이 발생했다고 가정해보았을 때 환자의 우측 귀에 44℃의 물을 넣었을 때 나타나는 현상으로 옳은 것을 고르시오.

- **좌측 안구 편위, 우측 안진**
- 우측 안구 편위, 좌측 안진
- 좌측 안구 편위, 상방 안진
- 우측 안구 편위, 하방 안진

12. 53/F, 최근 이상한 점이 있다며 내원. 좌측과 우측을 구별하지 못하고, 간단한 곱셈을 하지 못하였으며, 책을 읽지 못하고 자신의 이름을 종이에 쓸 수 없었다. 환자의 병변이 있을 것으로 예상되는 위치는 어디인가?

- 이마엽 (Frontal)
- **마루엽 (Parietal lobe)**
- 관자엽 (Temporal lobe)
- 뒤통수엽 (Occipital lobe)

13. 64/F, 지난 3 달 간 허공을 멍하게 응시하고 잘 넘어지며, 몸동작이 매우 느려지고 우울한 증상을 보이는 환자이다. 진찰실로 들어올 때 환자는 몸을 굽힌 자세로 발을 질질 끌며 걸었다. 혈압은 누워서 측정하였을 때 130/100mmHg, 서서 측정하였을 때 110/80mmHg 이었고, 팔은 경직되어 있었으며, 안정 시 진전 (Resting tremor)이 있었다. 다음 중 어느 부위의 병변이 있을 때 이와 같은 질환이 나타나는가?

- 조가비핵
- 미상핵
- 창백핵
- **흑색질**
- 시상하부

14. 29/F, 갑자기 시작된 두통, 구토 및 배뇨 장애로 내원. 3 주전 정상 분만을 한 환자로, 평소에는 건강하였으며 화를 낼 줄 모르는 성격이었으나 최근 쉽게 화를 내었다. 신경학적 검사에서 오른쪽 다리에 가벼운 근력 저하가 관찰되었다. 환자의 뇌 손상 부위로 적절한 곳을 고르시오.

- **이마엽 (Frontal)**
- 마루엽 (Parietal lobe)
- 관자엽 (Temporal lobe)
- 뒤통수엽 (Occipital lobe)
- 소뇌 (Cerebellum)

15. 50/F, 신체 진찰 결과 다음과 같은 양상일 때 의심되는 병변으로 알맞은 것은?


- HTN/DM/Dyslipidemia (+/+/+)
- 손발 끝 따끔한 양상
- 통증 양측으로 발생
- Knee jerk 감소
- DTR (+/+)
- Babinski sign (-)

- Right thalamic infarction
- Left pontine infarction
- Tarsal tunnel syndrome
- **Diabetic polyneuropathy**
- Plantar fasciitis

16. Decerebrate position 의 환자가 있다. 안구 반사 및 VOR (-), 구역 반사는 있고, 호흡음 불규칙하며, 동공 6mm 로 양쪽 모두 산동 되어있다. 어떤 부위의 손상일지 고르시오.


- 숨뇌
- **중간뇌**
- 다리뇌
- 대뇌 반구

17. 70 세 남성 자기 전 8 시간에는 멀쩡했고 시간 전에 일어났을 때 left hemiparesia, 구음 장애가 있었다. 치료로 옳은 것은?



- **항혈소판제**
- 항히스타민제
- r tPA
- 혈압 조절
- 항생제


18. 15 세 여아가 반복적인 오른쪽 반마비가 있어 병원에 왔다. 어릴 때에는 심하게 울거나 뜨거운 라면을 먹을 때 발생하였다. 최근에는 운동을 할 때 특히 더 심해지는 양상을 보였다.



이 병의 진단은?

- **<u>모야모야병</u>**
- 뇌동정맥기형
- 호흡중지발작

19. 39 세 남성 3 일 전 부부 관계 후 갑작스러운 두통이 발생했다. 현재는 통증이 나아졌다고 한다. 현재 두통은 욱신거리는 양상이다. 오심과 구토는 없다. 필요한 처치 두 개 고르시오.




- Emergent decompression
- **<u>항혈소판</u>**
- Sumatriptan SQ
- **<u>응급혈전제거술</u>**
- <u>NSAID</u>

  * 뇌 image 하나 더 있었음. Emergent decompression 이 전혀 필요해 보이지 않는 부종 전혀 없는 사진이었음.

  * triptan 은 두개혈관들을 수축시킴. 이 환자는 뇌경색 있으므로 이 환자에서 편두통에 대해서 triptan 못 쓰므로 NSAIDs 써야될 것으로 추정됨.

  * 응급혈전제거술은 LNT(Last known normal time)으로부터 6 시간 이내에 써야 함으로 안됨.

20. 기저 질환 고혈압 당뇨 있던 57 세 남자 오늘 아침부터 걷기 힘들고 몸이 흔들거린다며 내원하였다. 혈압 140/90, 맥박 72 회 호흡 15 회/min. 체온 36.5'이다. 조음장애, 왼쪽 팔다리 근력 저하 (MRC 3/5), 운동 실조가 있다. 뇌 자기공명영상 DWI 에서는 다음과 같은 소견이 관찰된다.



병변의 위치는?

- 숨뇌
- 중간뇌
- 대뇌반구
- 시상
- **<u>다리뇌</u>**

- 피부근염

21. 다음의 MRI 소견을 가진 환자에서 나타날 만한 소견으로 옳은 것은? (MRI 사진 비슷한 거 찾아보려고 했는데 못 찾음. cortical sparing 되고 high signal intensity 가 ACA, MCA territory 전체에 있었음.)

    - 동공 반사가 소실되고 확동된다.
    - Decerebrate posture 를 취한다,
    - **분당 20 회 정도의 숨을 빠르게 몰아서 쉬었다가 내쉬는 양상의 호흡을 하였다. (Cheyne-Stokes pattern 암시하는 선지)**
    - Caloric test 에서 반응이 없다.

22. 65 세 남성. 양쪽 상하지 근력저하로 내원. 10 일 전 예방접종 이력이 있다. 이후 감기 증상으로 감기약 복용 중. 증상은 하지에서 시작해서 상지로 올라오는 느낌. 진단에 도움되는 검사는?

    - **뇌척수액검사**
    - 반복신경자극검사
    - Ice cube test
    - 뇌자기공명영상
    - Tensilon test

23. 52 세 여자가 10 일전부터 시작된 설사, 복통, 몸살, 운동마비를 주소로 내원하였다. 양쪽 다리에서 양쪽 팔로 진행하는 양상으로 운동마비, 허리통증이 발생하였고 의식은 명료하였으며 감각신경은 정상이었다. 대소변 기능에는 이상이 없었다. 가장 의심되는 질환은?

    - 급성횡단척수염
    - 신경 매독
    - 중증근무력증
    - **길랭바레 증후군**

24. 10 세 여아가 몇 달전부터 눈꺼풀을 못 드는 증상이 있었으며, 증상은 오전보다 오후에 더 심해졌고, 누워서 고개를 들고 있으라 하면, 오래 버티지 못하고 고개를 떨어뜨렸다. 손으로 주먹 쥐었다 폈다하는 동작에도 금방 지쳤다고 한다. 진단으로 올바른 것?

    - **중증근무력증**
    - 길랑-바레 증후군
    - 근위축증

25. 22 세 여자가 어제부터 다리가 마비되어 걸을 수 없게 되어 병원에 왔다. 1 년 전 오른쪽 눈이 일주일 동안 잘 보이지 않았고, 오른쪽 손이 한 달간 저린 적이 있었다. 안저검사에서 오른쪽 시신경 위축이 관찰되었다. 양측 하지 근력은 2 등급(grade II), 깊은힘줄반사는 (+++/+++) 이었고, 양발에서 바빈스키징후가 관찰되었다. 감각검사에서 배꼽 이하로 통각 및 진동각이 감소되었다. 진단은? (선지 한국어, 영어 full term 병기)

    - GBS
    - ALS
    - MG
    - **NMOSD**

26. 45 세 남자가 3 일 전 발생한 38.5 도의 발열과 두통, 하루 전 발생한 경련과 의식혼미로 내원하였다. EEG 에서 temporal lobe spike and slow wave complex 소견이 보였다. 뇌막자극 증상 있으며 CSF 검사 결과는 다음과 같다. 백혈구 150(림프구 80%), protein 85, 포도당 65(혈청 포도당 110) 치료는 무엇인가?

    - **Acyclovir**
    - Amphotericin B

- Cefotaxime
- Ceftriaxone

27. (세균성 뇌수막염) 발열, 의식 처지는 환자, CSF 검사 결과는 다음과 같다. 백혈구 1100(PMN 90%), 단백질 276, 포도당 10(혈당 110). 1 차적으로 할 수 있는 치료는 무엇인가? (뇌막자극징후에 대한 언급 없음.)

- **Ceftriaxone**
- Vancomycin
- Ciprofloxacin
- Acyclovir
- Amphotericin B

28. 76 세 남자가 3 개월 전부터 인지 기능이 저하되었다며 병원에 왔다. 6 개월 전부터 파킨슨병이 의심되어 약물치료를 받았으나 효과가 없다고 한다. 최근에는 배뇨장애가 나타났다. 진단은?

- **정상압수두증**
- 알코올성 치매
- 항콜린성 약물 유발 치매
- 혈관성 치매

29. 55 세 여자가 1 주일부터 잠을 잘 못자는 것으로 내원. 말이 어눌해졌고, 침을 흘렸으며 근강직(muscle rigidity)과 떨림(tremor) 을 보였다. 1 개월 전부터 metoclopramide 를 복용하였다. 진단은?

- **파킨슨 증후군**
- 정좌불능
- 지연성운동장애
- 급성근긴장이상증
- 신경이완제 악성증후군

30. 1 년 전부터 가끔 피부에 벌레 기어가는 느낌이 들어 내원하였다. 통증은 없었다. 환자의 positive motor symptom 으로 맞는 것은? (선지 한국어, 영어 병기)

- 피부가 연속적이고 비교적 리듬이 있게 움직이는 것으로 보임
- 신경학적 검진 상 구음장애 있고, 사지 근력이 전체적으로 저하되어 MRC G5-로 나타남
- 신체검진 상 가슴이 여성처럼 발달함
- 3 년 전 당뇨 진단받았고, 1-2 년 전부터 성기능에 이상이 생겼음
- 환자의 외삼촌, 형도 같은 증상 있다고 함

- Fasciculation
- Myotonia
- **Myokymia**
- Spasm
- Cramp

31. 여자 환자가 20 분간 경련하여 응급실로 내원하였다. 응급실 당직의가 기도를 확보하고 수액을 공급하였다. 환자에게 투여할 약물은?

- Alprazolam
- **Lorazepam**
- Propofol
- Thiamine
- Epinephrine

32. 19 세 여자 환자가 팔다리를 떨며 119 를 통해 응급실로 내원하였다. (19:30) 대학교 시험기간이라 잠을 못 잤다고 하였다. 시험 본 후 친구들과 식사하던 중에 한 곳을 응시하며 옷을 잡아당기는 행위를 반복적으로 하다가 팔다리 뻣뻣하게 굳은 후

떨며 쓰러졌으며 응급실 내원 당시에도 떨고 있었다. (증상 시작 19:05) 가장 우선적으로 해야 할 처치는?

- 뇌 영상(CT/MRI) 검사
- **Lorazepam 투여**
- 뇌파 검사
- 약물 복용력 알기 위해 therapeutic drug monitoring 시작
- Clonazepam 투여

33. 다음 병변의 자발적 원인으로 가장 흔한 것은 무엇인가? 환자가 화장실에서 볼일을 보다가 발생하였다고 함.



- **Aneurysm**
- Trauma
- Infection

34. 20 대 남성이 농구를 하다가 상대 선수에게 오른쪽 어깨를 부딪힌 후에 왼쪽 팔 감각이 잠깐 소실되었다가 돌아왔다. 우측 턱 하부에서 경동맥 잡음이 들렸다. 오른쪽 동공이 좌측에 비해 축동되어 있고, 오른쪽 눈꺼풀이 처져있었다. 원인으로 적절한 것은?

- **경동맥 박리**
- 두개강내 출혈
- 전두엽 경색
- 후교통동맥 동맥류

35. 70 대 여성. 1 개월 전에 갑자기 인지 기능이 저하됨. 기저질환 고혈압, 당뇨로 치료받는 환자. 혈압 주어졌는데 혈압 높았습니다. 원래 따뜻한 사람이었는데 갑자기 성격이 난폭해졌다. 왼쪽 팔을 온전히 쓰지 못하며 걸을 때 다리를 끌면서 걷는다. 여러 번 가봐서 잘 아는 아들의 집을 가는 방법이 기억이 안 난다. 가장 의심되는 질환?

- **혈관성 치매**
- 알츠하이머 치매
- 루이소체 치매

36. (KMLE) 60 세 남자가 인지기능 저하 , 환시 , 파킨슨병의 운동증상 등을 주소로 내원하였다. 이와 같은 증상들이 질병 초기에 나타나는 질환은 다음 중 무엇인가?

- 헌팅턴병 (Huntington ' s disease)
- 이마관자엽 치매 (frontotemporal dementia)
- **레비소제치매 (Lewy body dementia)**
- 알츠하이머병(Alzheimer' s disease)
- 크로츠이펠트야코프병 (Creutzfeldt-Jakob disease)

37. 73/F(나이 부정확. 70 대였음.) 약 1 년 전부터 발생한 인지 능력이 저하되어 병원에 왔다. 기억력 감퇴는 서서히 진행되었다. 기저 질환 고혈압 외에 알고 있는 것 없다. 복용 중인 약물 없다. 집에서 검은색

형체가 지나다닌다고 하였다. 안과 진료에서 눈에 이상 없다고 하였다. 집에 뱀이 지나간다고 하고 가족이 돈을 안 갚는다고 가족과 다투기도 하였다. 가장 적절한 진단은? (확실히 보행 장애, tremor 등 Parkinsonism symptom 들은 언급 없었습니다.)

- 알코올성치매
- 혈관성치매
- 알츠하이머치매
- **루이소체치매**
- 조현병

(Parkinsonism symptom 이 없기 때문에 AD 를 고른 동기들도 있었습니다. 그러나 루이소체 치매가 우세하였습니다. 루이소체 치매이려면 치매가 파킨슨증에 선행하거나 파킨슨증이 시작된 후 12 개월 이내에 치매가 나타나야 함.)

38. (Y, 선지 한국어로) 30 대 남성이 뒷목과 어깨 마사지를 받은 후 발생한 두통으로 내원하였다. 두통은 누우면 호전되고 앉거나 일어서면 악화되었다. 진단은?

- **두개내 저압**
- 척추동맥 박리
- 두개강내 출혈

39. 45. (Y) 19 세 여성이 3 년 전부터 시작된 두통을 주소로 내원. 두통은 한달에 6 회 정도 35 분씩 지속되며, 오른쪽 측두부위에 국한된 박동성의 두통이었다. 두통 전에 섬광암점이 있고, 두통, 구역, 구토 증상이 동반되었다. 어머니와 언니가 비슷한 증상을 보였다고 한다. 신경학적 검사, CT, 단순 두개 경추촬영과 뇌파는 정상소견을 보였다. 천식을 앓고 있다고 한다. 이 질환의 예방을 위해 적절한 것은?

- 적포도주를 마신다.
- 베타 차단제를 복용한다.
- 피로 회복을 위해 주말에 늦잠을 잔다.
- **규칙적인 일상생활**

40. (Y) 중년 여성(40 대였던 것 같음.) 턱뼈와 입술 위가 아프다고 내원하였다. 전기 찌릿한 것처럼 아픔. 양치하거나 웃거나 음식을 씹을 때 아픔. 한번 아플 때 수십 초 간 아프다고 한다. 가장 가능성이 높은 질환은?

- 군발성 두통
- **삼차신경통**
- 편두통
- 긴장성 두통

41. (Y) 중년 남성. 싸우는 꿈을 꿨는데 꿈 속에서 한 행동을 실제로 자면서 하여 배우자의 팔을 쳐서 배우자가 맞았다고 한다. 이 환자에게 해야 할 검사는?

- **수면다원검사**
- 뇌파검사 뇌 CT
- 뇌척수액 검사

42. (Y 와 유사) (나이 불확실. 중년이었음.) 남자 환자. 코골이 때문에 가족과 각방 쓸 정도로 코골이가 심하다. 85kg, 165cm. Apnea-hypopnea index 20, 환자 가족이 봤을 때 잠버릇이 많이 안 좋았다고 함. 체중 감소 외에 우선적으로 적용할 수 있는 치료는?

- **CPAP (한국어와 영어 full term 병기)**
- Ativan
- Flumazenil

- O2
- Phenobarbital

43. (Y, 선지 한국어였음) 70 세 여성이 수영 강습을 받던 중 "여기가 어디지" 등 혼란스러워하는 모습을 보여 주변 사람들이 걱정했다고 한다. 이후 환자는 이 상황에 대해 기억하지 못한다고 한다. 가장 가능성이 높은 질환은?

    - TIA
    - **TGA**

44. (Y, 선지 한국어로) 16 세 여자가 반복되는 실신을 주소로 내원하였다. 덥거나 사람이 많은 곳에서 잘 쓰러지고, 쓰러진 직후 정신이 돌아왔다고 하였다. 전구증상으로 어지럽고 식은땀 흘리고, 몇 초 후에 의식 찾는데, 의식 찾고 나면 몸이 떨리거나 뻣뻣해지는 증상 있었다. 이상 있을 가능성 높은 검사는?

    - **기립경 검사**
    - Holter 심전도
    - Tensilon test
    - Dix hallpike test

45. (19Y) (나이는 10 후반~20 대였음.) 여성. dizziness, palpitation, blurred vision, faintness(이상 증상 4 개 한영 병기) 증상으로 내원하였다. Schellong test 진행하였다. 누워서 5 분 경과했을 때 BP 130/80 HR 70, 일어서서 3 분 후 BP 110/60 HR 80. 진단은?

    참고. Schellong test: 누워서 5 분 이상 경과하고 혈압, 맥박 측정한 뒤 일어서서 1 분, 3 분 후 각각 혈압, 맥박 측정하는 검사. (Shellong test 가 뭔지 문제에서 알려줌.)

    - **Orthostatic hypotension**
    - postural tachycardia
    - Neuromyotonia
    - Vasovagal syncope

46. 65 세 여자가 최근 수주간 식욕부진과 소화장애로 음식을 섭취하지 못하여 내원하였다. 상부위장관내시경, 대장내시경을 위해 금식을 지시하였다. 5% 포도당을 주입한 후 이틀 뒤 의식이 저하하였다. 신경학적 진찰상 자극을 주면 깨어나 반응이 있었고 양측 눈 바깥쪽으로 안구운동 장애 있었고 위아래로 눈떨림이 있었다. 가장 우선적으로 적절한 치료?

    - Lorazepam
    - **Thiamine**
    - Cobalamin
    - Folic acid
    - Ascorbic acid

    음주 언급은 없지만 베르니케 뇌병증으로 추정됨.

47. (Y) 80/F, 거실에서 갑자기 으아아악 소리가 들려 가족들이 가보니 환자 기절해 있었다. Drug toxin test 에서 Benzodiazepine 이 양성이 나왔을 때 지금 투여해야 할 약물은?

    - **Flumazenil**
    - Glucose
    - Thiamine
    - Methylphenidate
    - Lorazepam