2026학년도 신경과 학년말고사 (260414)

* 60문제 중 53문제 복기, 60분 시험(CBT)

1. 25세 여성 환자가 갑자기 멍해진 것을 주소로 내원하였다. 말싸움을 하다가 갑자기 이러는 경우가 있다고 한다. 신경학적 진찰 결과 대광반사 정상, 양쪽 동공 크기는 3mm로 같았으며 전정안구반사 정상 소견을 보였다. 신경 영상에서도 특별한 소견이 관찰되지 않았다. 환자가 신경학적 문제가 아닌 심리적 문제로 해당 증상이 발생했다고 가정해보았을 때, 환자의 우측 귀에 44℃의 물을 넣었을 때 나타나는 현상으로 옳은 것을 고르시오.
① 좌측 안구 편위, 우측 안진
② 우측 안구 편위, 좌측 안진
③ 좌측 안구 편위, 상방 안진
④ 우측 안구 편위, 하방 안진

2. 4세 남아, 점진적인 근력 약화를 주소로 내원하였다. 환아는 바닥에 앉은 자세에서 일어날 때 땅, 무릎, 허벅지 순으로 짚고 일어나는 모습을 보였다. 부모는 특이 증상이 없으나 8세 친형이 동일한 증상으로 현재 걷지 못하고 외삼촌이 같은 증상을 보이다가 청소년기에 사망한 가족력이 있다. 가능성이 높은 진단은?
① Duchenne muscular dystrophy
② Poliomyelitis
③ Amyotrophic lateral sclerosis
④ Myotonic dystrophy
⑤ Subacute combined degeneration

3. 19세 여성이 3년 전부터 시작된 두통을 주소로 내원하였다. 두통은 한 달에 6회 정도 35분씩 지속되며, 오른쪽 측두부위에 국한된 박동성의 두통이었다. 두통 전에 섬광암점이 있고, 두통, 구역, 구토 증상이 동반되었다. 어머니와 언니가 비슷한 증상을 보였다고 한다. 신경학적 검사, CT, 단순 두개경추촬영과 뇌파는 정상소견을 보였다. 천식을 앓고 있다고 한다. 이 질환의 예방을 위해 적절한 것은?
① 적포도주를 마신다.
② 베타 차단제를 복용한다.
③ 피로 회복을 위해 주말에 늦잠을 잔다.
④ 규칙적인 일상생활을 한다.
⑤ 아세트아미노펜을 복용한다.

4. Neural axis와 그에 해당하는 질환으로 올바르게 연결된 것을 고르시오.
① Peripheral nerve - Multiple sclerosis
② Muscle - Lambert eaton syndrome
③ Lower motor neuron Spino-bulbar musculoatrophy (SBMA, kennedy syndrome)
④ Upper motor neuron - Tabes dorsalis
⑤ Neuromuscular junction - Sarcoidosis에 의한 mononeuritis complex

5. LMN 하부에 병소에 나타날 수 있는 positive motor symptom은?
① Muscle twitching
② Muscle wasting
③ Increased DTR
④ Fatigue
⑤ Contracture

6. 21세 여자가 1일 전부터 다리가 마비되어 걸을 수 없게 되어 병원에 왔다. 1년 전 오른쪽 눈이 일주일 동안 잘 보이지 않았다가 점차 호전되었고, 오른쪽 손이 한 달 간 저렸다가 점차 호전된 적이 있었다. 특별히 병원을 찾지는 않았다고 하였다. 안저검사에서 오른쪽 시신경 위축이 관찰되었다. 양측 하지 근력은 MRS (Modified Rankin Scale; 3/3) 이었고, Babinski reflex는 (+++/+++) 였고, 양 발에서 Babinski sign이 관찰되었다. 감각검사에서 배꼽 이하로 통각 및 진동각이 감소되었다. 진단은?
① GBS (Guillain-Barre Syndrome)
② ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis)
③ MG (Myasthenia Gravis)
④ NMOSD (Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder)
⑤ SMA (Systemic Multiple Atrophy)

7. 54세 여성이 안검하수, 복시, 근력저하를 주소로 내원했다. 아침에 일어났을 때보다 오후가 될수록 증상이 나빠졌다. 흉부 영상검사 결과는 다음과 같다. 진단으로 옳은 것은?
① Myasthenia gravis
② Eaton-Lambert syndrome
③ Muscular dystrophy
④ Dermatomyositis
⑤ Subacute combined degeneration of spinal cord

8. 조선소 일하는 사람이 손이 아프다고 병원을 찾았다. 손목 앞부분을 손으로 눌렀더니 통증을 느꼈다. 평소 일하는 곳에서 진동에 많이 노출되지는 않는다고 한다. 이 사람의 진단으로 올바른 것을 고르시오.
① 레이노 증후군
② 수지진동 증후군
③ 손목터널 증후군
④ 전신진동 증후군
⑤ 컴파트먼트 증후군

9. 52세 여자가 10일전부터 시작된 설사, 복통, 몸살, 운동마비를 주소로 내원하였다. 양쪽 다리에서 양쪽팔로 진행하는 양상으로 운동마비, 허리통증이 발생하였고 의식은 명료하였으며 감각신경은 정상이었다. 대소변 기능에는 이상이 없었다. 가장 의심되는 질환은?
① 급성횡단척수염
② 신경매독
③ 중증근무력증
④ 피부근염
⑤ 길랑바레 증후군


10. 50세 여성이 시야가 좁아지는 증상으로 병원 내원하였다. 시력 검사 결과 양안 1.0, 시야 검사 결과 Bitemporal hemianopsia 소견으로 미루어보았을 때 환자는 어디에 병변이 있는가?
① 시상
② 뇌교
③ 중뇌
④ 뇌하수체
⑤ 대뇌

11. 10세 여아가 몇달 전부터 눈꺼풀을 못드는 증상이 있었으며, 증상은 오전보다 오후에 더 심해졌고, 누워서 고개를 들고 있으라하면 오래버티지 못하고 고개를 떨어뜨렸다. 손으로 주먹을 쥐었다 폈다 하는 동장에도 금방 지쳤다. 병변의 위치는?
① NMJ
② Nerve root
③ UMN
④ Muscle
⑤ Anterior horn

12. Dix-hallpike 검사에서 환자 고개를 오른쪽으로 돌리고 아래로 20도 눕혔더니 위쪽으로 torsional nystagmus가 관찰되었다. 왼쪽으로 돌렸을 땐 안진이 생기지 않았다. 어디에 문제가 있는가?
① Lt. anterior SCC
② Lt. posterior SCC
③ Rt. anterior SCC
④ Rt. posterior SCC
⑤ Rt. horizontal SCC

13. 70세 남성이 1주전부터 시작된 어지럼증으로 병원 내원하였다. 1년 전부터 오른쪽 귀에서 귀울림이 들렸고, 1주 전부터는 걸을 때 오른쪽으로 쏠리는 증세가 나타났다. 안구운동장애는 없었고, 오른쪽 이마주름의 마비가 있었으며 입이 왼쪽으로 돌아갔다. 오른쪽 청력이 감소하였고, 롬버그 검사에서 오른쪽으로 넘어지는 경향을 보였을 때 병터의 위치는?
① 숨뇌
② 중뇌
③ 시상
④ 이마엽
⑤ 소뇌-다리각

14. 기저 질환으로 HTN, DM 있는 50세 남자, 아침부터 걷기 힘들고 몸이 흔들거린다며 내원하였다. BP 140/90, HR 70, RR 15, BT 36.5이다. 조음장애, 왼쪽 팔다리의 근력저하 (MRC 3/5), 운동 실조가 있다. Brain MRI DWI에서 다음과 같은 소견이 관찰될 때 진단은?



① 다리뇌 경색
② 다리뇌 출혈
③ 중뇌 경색
④ 중뇌 출혈
⑤ 숨뇌 경색

15. Decerebrate position의 환자가 있다. 안구 반사와 VOR (-), 구역 반사는 intact, 호흡음 불규칙, 동공 양측 6mm로 산동되어 있다. 손상된 부위는?

① 중간뇌
② 다리뇌
③ 숨뇌
④ 시상
⑤ 대뇌 반구

16. 50세 여성이 신체 진찰 결과 다음과 같은 양상일 때 의심되는 병변으로 알맞은 것은?

- HTN/DM/Dyslipidemia (+/+/+)
- 손발 끝 따끔한 양상 통증 양측으로 발생
- Knee jerk 감소
- DTR (+/+)
- Babinski sign (-)

① Right thalamic infarction
② Left pontine infarction
③ Tarsal tunnel syndrome
④ Diabetic polyneuropathy
⑤ Plantar fasciitis

17. 65세 남성이 양쪽 상하지 근력저하로 내원하였다. 10일 전 예방접종 이력이 있다. 이후 감기 증상으로 감기약 복용 중이다. 증상은 하지에서 시작해서 상지로 올라오는 느낌일 때, 진단에 도움 되는 검사는?

① 뇌척수액검사
② 반복신경자극검사
③ Ice cube test
④ 뇌자기공명영상
⑤ Tensilon test

18. XX세 남성이 신체진찰 상 여성형 유방을 주소로 내원하였다. 이 질환을 유발하는 원인 유전자로 올바른 것은? (복기 미흡)
① 헌팅턴 유전자
② 안드로겐 수용체 유전자(AR)
③ 아탁신1 유전자(ATXN1)

19. XX세 환자가 1년 전부터 가끔 피부에 벌레 기어가는 느낌이 들어 내원하였다. 통증은 없었다. 환자의 positive motor symptom으로 맞는 것은?

- 피부가 연속적이고 비교적 리듬이 있게 움직이는 것으로 보임
- 신경학적 검진 상 구음장애 있고, 사지 근력이 전체적으로 저하되어 MRC G5-로 나타남
- 신체검진 상 가슴이 여성처럼 발달함
- 3년 전 당뇨 진단받았고, 1-2년 전부터 성 기능에 이상이 생겼음
- 환자의 외삼촌, 형도 같은 증상 있다고 함

① Fasciculation
② Myotonia
③ Myokymia
④ Spasm
⑤ Cramp

20. 55세 여자가 1주일부터 잠을 잘 못자는 것으로 내원하였다. 말이 어눌해졌고, 침을 흘렸으며 근강직과 떨림을 보였다. 1개월 전부터 metoclopramide를 복용하였다. 가장 가능성 높은 진단은?

① 파킨슨증후군
② 정좌불능
③ 지연성운동장애
④ 급성근긴장이상증
⑤ 신경이완제 악성증후군


21. 40세 남성이 최근 발생한 한쪽 눈 주위 통증을 주소로 내원하였다. 통증이 있는 쪽 눈에서 눈물, 콧물이 있고 눈 통증 및 Horner syndrome 증상이 있었다. 환자에게 가장 가능성 높은 진단은?

① 군발두통
② 편두통
③ 긴장성두통

22. 동맥내 주입술 또는 기계적 제거술 중에서 가장 자주 쓰는 치료는?
① 동맥내 주입술
② 기계적 혈전제거술
③ 스텐트
④ 항혈소판제

23. 60대 여성이 1시간 전에 산책 나갔다가, 쓰러져서 응급실에 왔다. 왼쪽 팔 움직임이 오른쪽보다 덜하고 왼쪽으로 눈이 돌아가 있다. CT, DWI 상에서는 문제 없었다. 다음으로 시행할 처치는?
① DSA 시행
② tPA
③ 경과관찰

24. 10대 여아가 반복적인 편측 반마비로 내원하였다. 증상은 뜨거운 음식을 먹을 때, 울 때 심해지는 양상을 보인다. 혈관조영술에서 다음과 같은 소견을 보였다. 적절한 진단은?



① 모야모야병

25. 60대 남성이 내원하였다. 담배를 많이 피우며, 20년 전 고혈압을 진단받았다. 국소적인 경색이 영상에서 발견되었고 조음장애, 경미한 운동마비가 있었다. 병태생리로 올바른 것은?
① Lipohyalinosis of the small artery
② Cardioembolism
③ AVM
④ Atherosclerosis of the large vessels

26. 60대 남자가 갑자기 발생한 구음장애, 근력 저하를 주소로 내원하였다. mMRC grade 3으로 측정되었으며, 8시간 전 잘 때는 증상 없다가 약 1시간 전 증상 발생하여 내원. 치료는? (+pons 경색 MRI 영상 주어짐)
① 항혈소판제
② rtPA

27. XX세 환자가 1시간 전에 갑자기 밥 먹다가 숟가락 떨어뜨리고 말하는 것, 걷는 것도 이상해졌다. CT에서는 이상한 부분 보이지 않는다. 치료는?
① 항혈소판제

28. angiography 상에서 ACA 영역 근처 혈류 모자라보이는 사진. 문제있는 유전자는? (복기 미흡)
① APOE
② VHL

29. 다음의 MRI 소견에서 나타날만한 소견으로 옳은것은? (MRI 4장, ACA, MCA area 전반적 enhancement 있었음. Midbrain, pons, medulla에는 enhancement 하나도 없었음)
① 꼬집었을때 팔다리를 뻣뻣하게 편다. (Decerebrate posture)
② 호흡이 빨라지다가 느려지는 형태 (Cheyne-stokes pattern breathing)
③ 동공이 왼쪽에는 3mm 오른쪽에는 6mm 확장되어있다.
④ Caloric test에서 정상이다.

30. 54세 남성, 화장실에서 경련 중에 발견되어 응급실로 내원하였다. 10분 이상 경련 중이었으며, 현재는 경련이 멈춘 상태이다. 혈액 검사상 glucose 15, Na 112일때 환자에 대한 설명과 해야 할 조치에 대해 올바르게 설명한 것은?
① 50% dextrose를 준다.
② 저나트륨혈증은 위험하므로 생리식염수로 교정한다.
③ 저혈당 때문이므로 항경련제 안쓴다.
④ 경련 멈췄으니 경과관찰한다.
⑤ 유발성 경련이 아니기 때문에 status epilepticus는 아니다.

31. 19세 여자 환자가 팔다리를 떨며 119를 통해 응급실로 내원하였다. (19:30) 대학교 시험기간이라 잠을 못 잤다고 하였다. 시험 본 후 친구들과 식사하던 중에 한 곳을 응시하며 옷을 잡아당기는 행위를 반복적으로 하다가 팔다리 뻣뻣하게 굳은 후 떨며 쓰러졌으며 응급실 내원 당시에도 떨고 있었다. (증상 시작 19:05) 가장 우선적으로 해야 할 처치는?
① 뇌 영상(CT/MRI) 검사
② Lorazepam 투여
③ 뇌파 검사
④ 약물 복용력 알기 위해 therapeutic drug monitoring 시작
⑤ Clonazepam 투여

32. 65세 남성이 9시에 응급실로 내원하였다. 8시에 화장실에 들어가서 30분이 되어도 나오지 않자 가족들이 확인해보니 쓰러져서 경련을 일으키고 있었다. 병원으로 이송하는 도중 하지가 떨리고 있었다. 응급실에서 검사한 결과, 통증 자극은 좌측 상하지가 더 반응이 좋았고, 눈이 오른쪽으로 치우쳐 있었다. 고혈압, 당뇨, 뇌경색, 경련 경력이 있었다. 최근 몇 년간 경련이 없어서 약을 감량했다. 이때, 환자에게 취해야 할 조치로 옳은 것을 고르시오.

① Therapeutic drug monitoring을 시행해야 한다.
② IV lorazepam을 투여한다.
③ 수액을 투여하여 뇌로 혈류가 충분히 흐르게 한다.
④ Brain CT를 촬영한다.
⑤ 의식이 없으나, 발작 증세가 멈추었으니 절대안정 한다.

33. 16세 남자, 2년 전부터 늦게까지 공부할 때 그 다음날 아침 컵을 집으려 할 때 갑작스러운 팔에 경련이 발생하여 컵을 깼다. EEG를 찍을 때 광자극을 가했을 때 양측 팔이 움찔거리는 양상을 보였다. 치료는?

① valproate
② carbamazepine
③ phenytoin
④ phenobarbital

34. 25세 남성이 반복되는 의식 소실 및 경련으로 내원하였다. 속에서부터 차오르는 뜨거운 느낌이 있었다고 하며, 멍하게 한 곳을 응시하면서 입맛을 다시는 등의 증상이 있었다고 한다. 최근 들어서는 전신경련으로 나타나는 경우가 있었다. 다음 중 필요한 약물은?

① valproate
② carbamazepine
③ phenytoin
④ phenobarbital

35. 60세 남자가 인지 기능저하, 환시, 파킨슨병의 운동 증상 등을 주소로 내원하였다. 이와 같은 증상들이 질병 초기에 나타나는 질환은 무엇인가?

① 혈관성 치매
② 전두측두엽 치매
③ 레비소체 치매
④ 알츠하이머 치매
⑤ 정상압수두증

36. 73세 남자가 약 10개월 전부터 갑자기 말수가 적어지고 기억력이 저하된다고 보호자와 병원에 왔다. 20년 전 고혈압으로 진단받고 약물치료 중이었고, 10년 전 뇌출혈과 1년 전 뇌경색 진단을 받고 약물치료 중이다. 기억력 저하와 함께 시간과 장소를 엉뚱하게 말하기도 하고, 한 달 전부터는 갑자기 더 나빠져서 독립적인 일상생활이 힘들어졌다고 보호자가 말하였다. 혈압 140/85mmHg, 맥박 수 75회/분, 호흡 수 18회/분, 체온 36.5도였다. 신경학적 검사에서 오른쪽 팔과 다리의 근력이 저하되어 있었고, MRC grade IV/IV, 깊은 힘줄 반사는 증가되어 있었으며 오른쪽 다리에서 바빈스키 징후가 관찰되었다. 발음할 때 조음장애가 관찰되었다. 가장 적절한 진단명은?

① 혈관성 치매
② 전두측두엽 치매
③ 레비소체 치매
④ 알츠하이머 치매
⑤ 정상압수두증

37. 65세 남성이 수개월 전 시작된 인지저하로 내원하였다. 본인은 기억력 감소가 조금 있다고 했으나, 아내가 더 심하다고 걱정하였다. 일상생활은 정상적으로 가능하다고 한다. 간이정신상태검사에서 기억력 저하 이외에 다른 것은 정상이었다. 뇌자기공명검사에 이상 소견 없었다. 진단은?

① 혈관성 치매
② 전두측두엽 치매
③ 레비소체 치매
④ 알츠하이머 치매
⑤ 경도인지장애

38. 73세 여성이 약 1년 전부터 발생한 인지 능력이 저하를 주소로 병원에 왔다. 기억력 감퇴는 서서히 진행되었다. 기저질환 고혈압 외에 알고 있는 것 없으며 복용 중인 약물 없다. 집에서 검은색 형체가 지나다닌다고 하였다. 안과 진료에서 눈에 이상 없다고 하였다. 집에 뱀이 지나간다고 하고 가족이 돈을 안 갚는다고 가족과 다투기도 하였다. 가장 적절한 진단은?

① 혈관성 치매
② 알콜성 치매
③ 레비소체 치매
④ 알츠하이머 치매
⑤ 조현병

39. 환자가 언젠가부터 성격이 변했고, 사소한 일에도 쉽게 화를 내기 시작했으며, 최근에는 손주를 보고 이름을 까먹는 일이 일어났다. 해당 환자 치료는?
① levodopa
② donepezil
③ phenytoin
④ phenobarbital

40. 89세 여성이 의식저하를 주소로 내원하였다. 8시경 거실에서 가족들과 TV를 보다가 방에 들어갔고, 8시 20분경 방에서 갑자기 "으으악악" 소리가 들려 가족들이 가보니 환자가 기절해 있었다. Drug toxin test에서 Benzodiazepine이 양성이 나왔을 때 먼저 투여해야 할 약물로 가장 적절한 것은?
① Glucose
② Thiamine
③ Methylphenidate
④ Lorazepam
⑤ Flumazenil

41. 52세 여자가 10일전부터 시작된 설사, 복통, 몸살, 운동마비를 주소로 내원하였다. 양쪽 다리에서 양쪽팔로 진행하는 양상으로 운동마비, 허리통증이 발생하였고 의식은 명료하였으며 감각신경은 정상이었다. 대소변 기능에는 이상이 없었다. 가장 의심되는 질환은?
① 급성횡단척수염
② 신경매독
③ 중증근무력증
④ 피부근염
⑤ 길랑바레증후군

42. 65세 남성이 화장실에 17:00에 들어가서 17:15에 나오지 않아서 발견되었다. BP 170/110, Glucose 115였다. 우측에 비해 좌측 팔의 근력이 감소해있었고, 안구는 좌측을 보고 있었다. CT angiography 상 Chronic한 atherosclerosis 소견이 있었다. 이 환자에게 시행해야 할 가장 적절한 처치는?
① 수액을 주고 경과관찰한다.
② 혈압을 낮춘다.
③ Perfusion image를 찍고 Lorazepam 고려한다.
④ Chronic sclerosis의 징후가 있으므로 응급 DSA를 고려한다.

43. 45세 여자가 갑작스러운 편마비로 응급실로 내원했다. 내원 당시 신체 진찰 결과, 여전히 왼쪽 팔을 잘 움직이지 못했다. 근력검사 상 Grade 3/3이었으며 CT, DWI상 모두 이상이 없었다. 진단으로 가장 적절한 것은?
① Todd's paralysis

44. 24세 여자가 자주 쓰러짐을 주소로 내원하였다. 어릴 때부터 스트레스를 많이 받아 가위가 자주 눌렸다. 평소 잠이 부족한지 근무시간에 계속 졸아서 부모님이 걱정했다. 얼마 전 컴플레인을 상대하는 고객을 상대하다가 갑자기 다리에 힘이 빠져 쓰러졌다. 이 환자에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.
① 주간수면은 야간수면을 줄인다.
② 평균수면잠복기 7분, 잠들자마자 SOREM 3회
③ 불면에는 Clonazepam 쓴다.
④ 탈력발작 CNS stimulant
⑤ Melatonin부족에 의해서 발생함

45. 60세 여성, 좌측 중뇌동맥 경색으로 인해 병원에 입원하여 치료 중이다. 입원 3일 후 갑작스럽게 의식저하가 발생하였다. 신경학적 진찰 결과 좌측 동공이 확대되었으며 그와 함께 호흡의 양상도 변화한 모습이 관찰되었다. 환자에게 나타날 수 있는 호흡의 양상을 고르시오.
① 호흡의 깊이가 점진적으로 커졌다가 작아진다.
② 매우 깊고 빠른 호흡이 쉴 새 없이 이어진다.
③ 숨을 끝까지 들이마신 상태에서 한참을 멈췄다가 아주 짧게 '툭' 내뱉는 비정상적인 흡기 지연 양상이다
④ 불규칙한 호흡들이 서너 번 무리를 지어 나타나다가 갑자기 멈추기를 반복하는 무질서한 형태이다
⑤ 호흡의 깊이와 리듬이 완전히 제각각인 양상이다.

46. 59세 남자환자가 급성 심근경색으로 치료 중 심정지가 발생하였다. 약 30분간 심폐소생술을 받고 정상박동으로 회복되었으나, 이후 의식이 돌아오지 않고 혼수상태가 유지되었다. 환자의 호흡은 잘 유지되고, 뇌줄기 반사 및 자율 신경 반사는 정상이고, 환자의 수면-각성 주기가 유지되는 상태라고 할 때, 진단은?
① 뇌사
② 식물인간 상태
③ 무동무언증
④ 가성혼수
⑤ 최소 의식상태

47. 51세 비만인 남자 환자가 자꾸 일과 중에 운전하다가 졸아서 이를 해결하기 위해 내원하였다. 환자 AHI〈50, 환자 가족이 봤을 때 잠버릇이 많이 안 좋았다고 하고 이미 이에 대해서 금주, 비만 치료 등을 진행하고 있는데 현재 상황에 대한 급성기 치료로 옳은 것은?

① CPAP

② Ativan

③ Flumazenil

④ O2

⑤ Phenobarbital

48. 64세 남자가 일과 중에 졸리는 상황이 지속되어서 아내와 함께 방문하였다. 20년 전부터 졸음이 오는 양상은 지속되었고, 잠을 자는 도중에 꿈을 꾸는 행동이 자는 중에 나타나 아내가 다치는 일도 있었다. 10년 동안 졸음 운전으로 사고를 낼 뻔한 적이 세 번 있었다. 해당 상황에 대한 치료로 적절한 것은?

① CPAP

49. 응급실로 온 환자가 불렀을 때 반응 없고, 통증 자극에도 반응 없는 상태이다. 이 환자의 의식 상태는?

① 명료

② 기면

③ 혼미

④ 혼수

⑤ 섬망

50. 20대 남성이 농구를 하다가 상대 선수에게 오른쪽 어깨를 부딪힌 후에 왼쪽 팔 감각이 잠깐 소실되었다가 돌아왔다. 우측 턱 하부에서 경동맥 잡음이 들렸다. 오른쪽 동공이 좌측에 비해 축동되어 있고, 오른쪽 눈꺼풀이 처져있었다. 원인으로 적절한 것은?

① 경동맥 박리

② 두개강내 출혈

③ 전두엽 경색

④ 후교통동맥 동맥류

51. 20세 여성이 Dizziness, Palpitation, Blurred vision, Faintness를 증상으로 내원하였다. Schellong test 진행하였다. Schellong test란 누워서 5분 이상 경과하고 혈압, 맥박 측정한 뒤 일어서서 1분, 3분 후 각각 혈압, 맥박 측정하는 검사를 말하며, 누워서 5분 경과했을 때 BP 130/80, HR 70, 일어서서 3분 후 BP 110/60, HR 80이었다. 진단은?

① Orthostatic hypotension

② Postural tachycardia

③ Neuromyotonia

④ Vasovagal syncope

⑤ Drug-induced autonomic failure

52. 38세 남성이 최근에 시야가 불편하다는 주소로 상담을 받으러 신경과에 왔다. 계단을 내려갈 때 발을 헛딛는 경우가 많았고, 한 물체를 볼 때 두 개로 보인다고 호소했다. 상담 중 눈을 마주치기 위해 머리가 살짝 왼쪽으로 기울어져 있었고, 아래를 볼수록 복시 심해진다고 하였다. 어떤 신경의 이상인가?

① Right trochlear nerve

② Right oculomotor nerve

③ Left trigeminal nerve

④ Left vestibulocochlear nerve

⑤ Right vagus nerve

53. 교감신경 활성화의 예로 옳은 것은?

① 땀분비

② 침샘분비

③ 축동