# 2021학년도 본3 학년말고사 **<외과>**

총 20문제 중 20문제 복원
학년말 기출 뿐만 아니라 실습 pretest에서도 많이 출제되었습니다.

1. 유방초음파가 유방촬영술(mammography)에 비해 갖는 장점으로 옳지 않은 것은?
① 유방촬영술로 애매한 병변에 도움이 될 수 있다.
② 낭종을 확인하는 데 유용하다.
③ 미세석회화를 보는 데 유용하다.
④ 방사선 노출이 없다.
⑤ 임산부에게 안전하다.

2. 47세 여자 환자가 건강검진 상 시행한 유방촬영술에서 좌측 유방 10시 방향, 유두에서 2cm 떨어진 곳에 크기 1.5 cm, BIRADS 4a 병변이 확인되었고, 이후 실시한 핵침조직검사상 비정형세포증식증이 확인되었다. 다음 처치로 올바른 것은? (답논란)
① 광범위 부분 절제술
② 맘모톰 유방 절제술
③ 경과관찰
④ 유방 MRI
⑤ 유방 CT
*kmle 문제는 절제생검이 답. 광범위 유방절제술이 답이라는 의견도 있었음.

50세 여자가 오른쪽 유방에 덩이가 만져져서 왔다. 덩이는 2주 전 처음 만져졌다고 하며 크기는 2cm였고, 겨드랑이 림프절은 커져 있지 않았다. 유방촬영술에서 치밀유방 소견을 보였다. 중심바늘생검에서 비정형 유관증식증(atypical ductal hyperplasia)으로 진단되었다. 조치는?

1) 추적관찰
2) 절제생검
3) 유방절제술
4) 유방방사선치료
5) 감시림프절생검술


3. 해당 수술의 적응증이 아닌 것은?



① CNB로 확인한 광범위한 DCIS
② 3cm IDC
③ 다발성 유방암
④ 염증성 유방암
⑤ 임신 3기 유방암

4. 47세 여자 환자가 우측 갑상선에 1.5cm 및 좌측 갑상선에 1.0cm 크기의 유두암으로 갑상선 전절제술 및 경부 6구역 림프절 절제술을 시행받았다. 수술 후 병리 조직검사에서 갑상선 외 침범 소견이 보였으며, 림프절 10개 중 3개가 전이되었다. 다음에 시행해야 할 치료로 적절한 것은?
① 항암화학요법
② 방사성요오드치료
③ 경부 방사선치료
④ 경부 2,3,4 구역 림프절 예방적 절제술
⑤ 경부 2,3,4 구역 림프절 예방적 절제술 + 방사성요오드치료

5. 갑상선 전절제술을 받은 환자. 수술 다음날 온몸이 저리고 손발끝이 수축하는 양상이 나타났다. 옳은 조치는?




① IV 칼슘 투여 후 칼슘 농도를 측정한다.
② 일시적인 현상으로 환자 안심시킨다
③ 수술 과정 중 잘못된 자세로 신경이 눌려 생긴 현상이다.
④ EMG를 실시한다.
⑤ 갑상선 호르몬을 측정하여 얼마나 저하되어 있는지 파악한다.

6. 위암으로 위원위부절제술을 받은 환자이다. 다음은 무엇인가?



① 췌장액 유출
② 유미성 복수
③ 장 내용물
④ 혈액
⑤ 농양

7. 71세 여자 환자가 6시간 전 갑자기 발생한 복통으로 응급실 을 방문하였다. 6년 전 조기위암으로 복강경 원위부 위 절제술 (R-Y) 시행 후 최근 추적관찰에서 재발이나 특이사항은 없었다고 한다. 통증은 갑자기 생겼으며, 등 쪽으로 뻗치는 통증이었다. 치료는?



① 입원 후 경과관찰
② 항암치료
③ 진단적 개복술
④ 항생제
⑤ 방사선치료

8. 70 세 여자 환자가 혈변과 뒤무직으로 외래에 내원하였고 직장수지검사에서 항문연 4cm 위로 단단하고 뒤로 밀리지 않는 덩어리가 만져졌다. 대장내시경 검사결과 선암으로 진단되었고 그 외에 용종은 발견되지 않았다.CT상에서 직장주변에 림프절 커진 소견만 있고 MRI 상으로 직장벽을 침범하지 않은 소견을 나타내고 그 외에는 없었다. CCRT 후 초저위전방절제술을 할 계획인데 수술 때 반드시 같이 해야 하는 것은?

① 일시적 장루형성술
② 충수돌기절제술
③ J 형 낭형성술
④ 측부 골반림프절제거술
⑤ 전 직장간막 절제술

9. 65세 여자가 건강검진상 우연히 발견된 충수돌기 증상으로 절제술 시행한 후 다음과 같은 결과가 나왔다. 향후 치료로 올바른 것은?

| |
|---|
| ✓ adenocarcinoma, moderately differentiated, tubular with mucinous secretion |
| ✓ invades soft tissue |
| ✓ no lymphovascular invasion |
| ✓ margin negative |
| ✓ size: 2.3cm X1.8cm |

① 경과관찰
② 우측 대장 절제술
③ 항암치료
④ 방사선치료
⑤ 항암+방사선치료

10. 50 세 남자 환자가 1 주일 전부터 하루에 10 회 이상 피가 섞인 설사로 내원하였다. 대장내시경 결과 대장 전체에 미란성 궤양이 발견되었고, 직장 점막 전체에 병변이 있었다. 3 개월 전부터 혈변과 증상악화 있었고, 10 년 전부터 약 먹고 있었으나 잘 조절되지 않았다. 치료는? (답논란)



① 전대장절제술과 회장루조설술
② 결장절제술과 회장 직장 문합술
③ 저위전방절제술
④ 복회음절제술
⑤ 하트만수술

11. 젊은 여성 환자가 계단에서 구른 이후로 우상복부에 통증을 호소하였다. 복부에 압통은 있었으나 반발압통은 없었다. 혈압 100/80 mg, 헤모글로빈 11.2 g/dL였다. 어떤 처치를 해야 하는가?



① 경과관찰
② 진단적 복강세척
③ 진단적 개복
④ 배액관 삽입
⑤ 혈관조영술

12. GB empyema 및 perforation으로 담낭 절제술을 받은 환자의 배액이 담즙색으로 변하였다. Vital sign은 안정할때 1순위로 해야할 처치는?


① 경피경간담즙배액술 (PTBD)
② 응급 수술
③ 고주파열치료 (Radiofrequency ablation)
④ 내시경역행췌담관조영술 (ERCP)

*12번 거의 같은 문제였는데, KMLE 답은 내시경적 배액술이었음. (실제 문제 선지에서는 ERCP라고 되어있었음). 21야마에는 PTBD라고 답 체크되어있음. PTBD가 답일 것 같음,,

56세 남자로 3일 전 empyema로 복강경 쓸개 절제술을 받았으며 배액관으로 쓸개즙이 200mL 배액 중이다. 다음 중 치료는?

1) 경과관찰
2) 내시경적 배액
3) PTBD
4) 온쓸개관샘창자연결
5) 온쓸개관빈창자연결

13. Right upper quadrant pain 및 tenderness 를 주소로 내원한 56세 여성 환자의 CT이다. Murphy sign 설명. 환자의 치료는?



| |
|---|
| WBC: 15000, Hb: 14.7, segment neutrophil: 87%<br>total bilirubin:1.1, AST: 62, ALT: 74, CRP: 4.2 |

① IV fluid hydration
② IV antibiotics
③ Percutaneous transhepatic gallbladder drainage (PTGBD)
④ Percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD)
⑤ Laparoscopic cholecystectomy

14. 교통사고 후 CT 에서 비장 파열이 확인되었다. 주변 장기나 혈관 외 유출이 없는 것으로 확인되었고 압통이 있었다. (반발압통 여부는언급 X) BP 110/70 mmHg, Hb 11.5 g/dL 였을 때 적절한 치료는?




① 경과관찰
② 동맥색전술
③ 비장 부분절제
④ 비장 전체절제

15. 췌장 두부암 환자의 복강경 췌장-십이지장 절제술 수술 후 경과 관찰 도중 췌장과 jejunum 연결한 부위에서 문합부 누출 토혈이 있었다. 손상 받았을 가능성이 가장 높은 혈관은?

① superior pancreaticoduodenal artery
② gastroduodenal artery
③ left gastric artery
④ right gastric artery
⑤ common hepatic artery

16. 다음과 같은 수술을 시행하였을때, 합병증 중 morbidity와 mortality가 가장 높은 것은?




① postoperative pancreatic fistula
② postoperative pancreatitis
③ endocrine insufficiency
④ pleural effusion
⑤ delayed gastric emptying

17. 4개월 된 아이가 복부 팽만을 주소로 내원하였다. 대변을 잘 보지 못했고 관장을 했을 때 변과 가스가 많이 나왔다. 바륨 조영술 사진은 다음과 같다. 확진을 위한 검사는?




① 복부 MRI
② 복부 초음파
③ 직장 생검
④ 직장 압력측정

18. 좌측 서혜부 종물로 복강경 탈장수술 (TAPP)을 시행하였다. 수술 중촬영한 사진은 다음과 같다. 진단은?



① direct inguinal hernia
② indirect inguinal hernia
③ obturator hernia
④ femoral hernia

19. 평소 고혈압이 있던 76 세 남자 환자가 내원 한 시간 전 갑자기 발생한 back pain, abdominal pain 으로 응급실을 방문하였다. 신체 검사 상 복부 중앙에서 종물이 만져졌으며 혈압은 80/50mmHg 이었다. CT 소견이 다음과 같을 때 가장 가능성 있는 질환은?



① aortic aneurysm
② mesenteric infarction
③ sigmoid volvulus
④ colon cancer obstruction
⑤ ischemic colitis

20. 66 세 남자 환자가 3 차례의 흑색변과 기력 없음을 주소로 응급실로 내원하였다. 기저질환 없는 자로 내원시 BP 75/40 mmHg, HR 126 회/분 으로 측정되었으며 혈액 검사에서 Hb 6.7 g/dl, Hct 19.9%, PT 85.4%, INR 1.07, Glucose 101mg/dl, Na/K 143/4.4 mEq/L 의 결과를 보였다. 아래는 환자의 복부 컴퓨터 단층촬영소견이다. 가장 가능성 높은 진단과 합당한 치료로 알맞게 짝지어진 것은?



① angiodysplasia - arterial embolization
② Crohn's disease - arterial embolization
③ GIST - small bowel segmental resection
④ angiodysplasia - small bowel segmental resection
⑤ Meckel's diverticulum - small bowel segmental resection